

Sm 4872  
F 80

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ  
ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ  
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.

Часть XV. N. 1.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1830 года.

Изъ Библіотеки для чтенія А. Смирдина

№ 1872

За годъ . . 10 рубл. сер.

За полгода 6 » »

За 3 мѣсяца 4 » »

За мѣсяць 2 » »

За чтеніе книгъ съ жур-  
налами 20 рубл. сер.

Новыя книги держать не  
болѣе двухъ недѣль.



*Slovanská knihovna*

**SLOVANSKÁ KNIHOVNA**

3186276760



**ВОЕННОМЕДИЦИНСКІЙ**

**ЖУРНАЛЪ,**

**ИЗДАВАЕМЫЙ**

**МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ  
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.**

**ЧАСТЬ XV. N. 1.**

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:*

*Rara datur longo prudentia temporis usu.*

*Cato.*

155364

---

**САНКТПЕТЕРБУРГЪ,**

**ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА**

**МИНИСТЕРСТВА-ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.**

**1830 ГОДА.**





# СОДЕРЖАНІЕ.

---

	Стран.
I. Замѣчанія о чумѣ Англійскаго Врача Маддена . . . . .	3.
II. О горячкахъ вообще . . . . .	40.
III. О жизненныхъ припасахъ въ Медико - Полицейскомъ отношеніи. (Продолженіе) . . . . .	97.
IV. Перевязаніе подвздошной артеріи. . . . .	122.
V. Счастливо излѣченное сведеніе шеи и нижнихъ конечностей вперёдъ . . . . .	134.
VI. Скипидаръ противъ нервной боли, особливо сѣдалищной . . . . .	141.
VII. СМѢСЬ.	
1. Шпанскія мушки при кори . . . . .	146.
2. Перевязка повязаніи геморроидальныхъ шишекъ . . . . .	147.
3. Иодиновое кали противъ застарѣлыхъ язвъ языка и глотки. . . . .	148.
4. Лѣченіе перелойнаго воспаленія глазъ . . . . .	— —
5. Бромъ противъ зоба и золотухи. . . . .	150.
VIII. Офиціальныя извѣстія съ 1-го Генваря по 1-е Марта 1830 г. . . . .	152.
IX. Подписка на книгу путешествіе Д. Ниберга . . . . .	161.

---



1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

# I.

## Замѣчанія о чумѣ Англійскаго Врача Маддена.

---

*Сообщено Главнымъ по Арміи Медицинскимъ Инспек-  
торомъ Барнетомъ Вилліе.*

Изъ всѣхъ болѣзней поражающихъ человѣка, чума по всей справедливости есть самая ужасная. Она ужасна по своей чрезвычайной прилипчивости и заразительности, по своему, большому числу, смертельному исходу и потому, что мы еще не имѣемъ, не говорю вѣрныхъ, по крайней мѣрѣ сколько нибудь надежныхъ средствъ къ излѣченію оной. Я уже сообщилъ Россійскимъ Врачамъ важнѣйшія замѣчанія касательно ея распознаванія\*), различій \*\*) предохранительныхъ мѣръ \*\*\*) и нѣкоторыхъ, хотя съ малымъ успѣхомъ ис-

---

\*) Военно Мед. Журналъ Ч. X. N. 1.

\*\*) Тамъ же.

\*\*\*) Тамъ же и Ч. XIV. N. 5.

пытанныхъ способовъ лѣченія \*). Нижеслѣдующія замѣчанія о сей болѣзни, а особливо о ея лѣченіи, предложенныя оспроумнымъ и внимательнымъ наблюдашемъ, неоднократно видѣвшимъ чуму и разные способы лѣченія оной, я почишаю достойными особеннаго вниманія.

В.

### *Замѣтанія Маддена.*

---

Проживъ два года въ царствѣ заразы, я спарался преодолѣть безпечность, производимую во всѣхъ Европейцахъ симъ разслабляющимъ климатомъ, и теперь намѣренъ сократить мою siesta \*\*) и описать вамъ мое спрание въ землѣ порабощенія.

Къ несчастію, а можетъ быть и къ счастью, періодъ моего прибытія сюда ознаменованъ чепырьми первыми примѣрами заразы. Каждый Франкъ заперся въ карантинѣ, госпитальница заражена и нигдѣ не возможно найти приспанища. Я принужденъ былъ возвращишься на корабль. Одинъ Англіійскій купецъ былъ шакъ добръ, что нару-

---

\*) Ч. X. N. 1.

\*\*) Отдыхъ во время солнечнаго зноя — послѣ обѣда.

шилъ свой карантинъ и принималъ меня въ  
 свой домъ. Чума съ каждымъ днемъ усили-  
 валась; изъ природныхъ жилищей ежедневно  
 умирали около осьмнадцати, и рѣдко про-  
 ходилъ день безъ того, чтобы кто либо изъ  
 Европейцевъ не умеръ. При маломъ народо-  
 населеніи Александріи, простирающемся  
 до 16,000 душъ, смертность сія была уже  
 значительна. Каждый домъ былъ запертъ,  
 слугамъ вовсе не позволялось выходить,  
 деньги принимали чрезъ уксусъ, письма оку-  
 ривали, бумаги брали помощію щипцовъ; на  
 улицахъ опгоняли палками постороннихъ,  
 дабы избѣжать сообщенія съ ними; народъ  
 толпился около *Докторскихъ лавокъ*, желая  
 узнать, сколько умерло ночью; о чумѣ раз-  
 суждали при завтракѣ; во время обѣда опи-  
 сывали заразу; бубоны и карбункулы (*hogge-  
 so regeens*) были предметомъ нашего раз-  
 говора во время ужина. Въ уборныхъ комна-  
 тахъ молодыхъ дамъ судили о законахъ при-  
 липчивости: „кошка можетъ сообщить зара-  
 зу, а собака менѣе опасна; осель почищалъ  
 „ся заразительнымъ живописнымъ, а лошадь  
 „незаразительнымъ. Свѣжій хлѣбъ призна-  
 „ваемъ былъ за весьма способный къ вос-

„пріятію заразы, и противно думали о мясныхъ блюдахъ.“ Если вы взглянули на человека, по онъ шопчасъ ошупываль свой пахъ; если пожаловались на головную боль, по всѣ бѣгутъ ошъ васъ; если выходите изъ дома съ нездоровымъ лицемъ, по народъ разбѣгается во всѣ стороны; если прикоснулись къ плащю какого либо христіанина, по приводите его въ гнѣвъ; если же говорите о *Мак-Клинѣ* \*), по васъ подозрѣвають въ помѣшательствѣ ума. Сохрани васъ Богъ ошъ каранпина въ Египтѣ! Не смерть кого либо изъ сосѣдей кажется мнѣ разипельною;—я уже привыкъ къ гробамъ и могу слышать о семъ происшествіи, случившемся за ближнею дверью, не ошущая еочувственной боли подъ моими мышками: но эптошъ ужасъ возбуждаемый непрерывнымъ слухомъ о чумѣ; эптошъ спрахъ заразы написанный на лицѣ каждаго; эпто предспавленіе предъ вашими глазами и ушами чумныхъ явленій и разговоровъ, ушромъ, въ полдень и ночью,—все эпто, преждевременнымъ ужасомъ

---

\*) *Мак-Клинъ* старался доказать, что чума не заразительна. *Перев.*

смерти превращаетъ карантинный домъ въ жилище Лазаря.

Я уже потерялъ одного слугу. За два дня до его болѣзни взялъ я его съ собою въ одинъ Турецкій домъ, гдѣ, какъ сказано, былъ нѣкто пораженъ ударомъ. При осмотрѣ я нашель, что это была чума. Возвратившись домой, я переѣнилъ свое плащье, приказалъ своему мальчику (онъ былъ уроженецъ Мальтійскій) повѣсить оное на шеррабъ, и отъ сего-шо, какъ мнѣ кажется, онъ заразился. На другой день послѣ сего я замѣнилъ, что онъ шапается при хожденіи; глаза его были подобны взгляду пьянаго, лице было раздуто, однако онъ не жаловался на нездоровье. Вечеромъ я спросилъ его, не болѣнъ ли онъ? Онъ ошвѣчалъ, что чувствуетъ ознобъ; но я замѣнилъ, что онъ едва держался на ногахъ; пульсъ его былъ частый, удобосжимаемый и неполный, середина языка покрыта бѣловато-бурою корою, а края красные.

Я видѣлъ, что бѣдный мой слуга спраждаетъ чумою. Не возможно было долѣе держаъ его въ домъ, гдѣ я жилъ и гдѣ даже самъ, находясь ежедневно въ опасности заразиться,



долженъ былъ опасаться, чтобы мнѣ неопредѣлили въ кварширъ. Я взялъ его въ госпиталь; но прежде вступленія въ оный просилъ онъ позволенія повидаться съ своимъ братомъ. Я проводилъ его къ нему; онъ, не смотря на мое предостереженіе, взялъ брата за руку и далъ ему нѣкоторое порученіе къ маперу. Когда мы прибыли въ госпиталь, я увидѣлъ, что онъ дрожитъ; итушъ онъ сказалъ мнѣ: помнишь ли, сударь, какъ я говорилъ вамъ на базарѣ, что здоровье дороже всего?—Я никогда не былъ, такъ встревоженъ; мнѣ казалось, что я нѣкопорымъ образомъ былъ виною его болѣзни. Головная боль и пошнопта беспокоили его по временамъ, когда онъ легъ въ постель; онъ часно дрожалъ, но приномъ говорилъ, что чувствуетъ жженіе въ сердцѣ. Ночью показались на переднемъ плечѣ два синихъ пятна, съ багровыми краями, проспировавшіяся къ мышкамъ, гдѣ они превратились въ бубоны. Кожа его была очень суха и горяча, глаза устремлены на одинъ предметъ; когда спарались возбуждѣнъ его вниманіе, то онъ говорилъ несвязно и жаловался на распухлость языка. При захожденіи солнца пульсъ его былъ

малой, несвободный, въ минушу 118 ударовъ; лице распухло и имѣло нечисто-кармазинный цвѣтъ; но на слѣдующее утро цвѣтъ лица былъ темно-пурпуровый, какъ бы опъ накопленія крови, при воспаленномъ возвратѣ оной. Взоръ его неизмѣнно устремленъ былъ на потолокъ, и слабое, но непрерывное движеніе губъ продолжалось всю ночь. Въ четыре часа онъ спрыгнулъ съ постели, вышелъ, не будучи никѣмъ замѣченъ, за госпитальныя ворота и пробѣжалъ, полунагій, нѣсколько сажень, въ направленіи къ своему дому; но здѣсь остановили его люди, принадлежавшіе къ чумному дому; онъ шупъ же упалъ на землю, совершенно безъ силъ; ноги лишились движенія, а голова склонилась на грудь, и попомъ съ помощію двухъ Арабовъ принесенъ онъ былъ обратно въ свою шюрму (мѣсто сіе не заслуживаетъ лучшаго названія). Спусти два часа, я видѣлъ его; бубонъ имѣлъ величину малаго померанца, два синихъ пятна превратились въ обширныя карбункулы, глаза имѣли спекловатый и необыкновенно блестящій видъ, руками своими онъ непрерывно перебиралъ одѣяло; при насупленіи сумерекъ храпѣше

въ горлѣ ссѣдинилось съ корчами шейныхъ мышницъ, по окончаніи коихъ часа черезъ два онъ умеръ безъ всякаго явнаго (мѣстнаго?) спраданія.

Спрахъ заразы не позволяеть много оплакивать друзей своихъ, сраженныхъ сею ужасною болѣзнію; однакожъ судьба сего несчастнаго поразила меня болѣе, нежели какъ я могу выразить. Для меня весьма гореспна была необходимость опсправить его въ чумный госпиталь: ибо поступавшіе туда прощались съ надеждою.

Чумный домъ сей состоить изъ нѣсколькихъ небольшихъ комнатъ, съ рѣшетчатымъ окошкомъ, противоположнымъ двери и обращеннымъ на воспокъ, какъ бы для того, чтобы воспринимать ядовитый вѣспрь степи. Въ сей пюрѣмъ нѣтъ ни спюла, ни стула; вся мебель состоить изъ камышевой кровати, называемой сафазъ, мапраца и проспыни, которая послѣ служить вмѣсто савана; дверь въ сію комнату обыкновенно запирается и въ ея сидитъ служитель, Арабъ, съ птрубкою шабаку, копорый весьма рѣдко входитъ внутрь для овлaженія засохшихъ губъ спрадальца, или для уменьшенія

спраха его, возбуждаемого пустынным уединением; ежедневно одинъ разъ входилъ въ сію комнату Ипаліанскій Врачъ, прописывалъ опваръ мальвы или воду бузиновыхъ цвѣтовъ и уходилъ.

Изъ всѣхъ бѣдспивій человѣческихъ нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ видъ больныхъ, содержащихся въ семь чумномъ домѣ. Я видѣлъ, какъ шло моего несчастнаго слуги влекли за ноги, чпобы дать мѣсто другому вновь прибывшему, который черезъ 40 или 50 часовъ, вѣроятно, подвергся такой же участи. На груди и спинѣ умершаго замѣнилъ я широкія пятна, синевапаго цвѣта; не слышно было непріятнаго запаха; поверхностныя карбункуловъ была невелика; они перешли на нѣкоторые внутренніе органы; бубоны также почти вовсе исчезли.

Въ семь случаѣ спарался я убѣдить Доктора госпишала къ употребленію лѣкарствъ, найденныхъ мною полезными въ чумѣ, то есть, водки, винограднаго вина и хины; но онъ отказался, основываясь на томъ, что Докторъ *Мартиро*, славный здѣшній Еврейскій Врачъ, произвелъ разные опыты надъ употребленіемъ сильно возбуждающихъ средствъ, именно, си-

нильной. кислошы и челибухи, безуспѣшно; ибо всѣ больные умирали. Я нимало не удивился сему.

Спустя при дня послѣ смерти слуги моего Павла, братъ его, коего онъ поѣхалъ предъ вступленіемъ своимъ въ госпиталь, также заболѣлъ; онъ имѣлъ тѣже припадки и умеръ на четвертый день. Жена его, имѣвшая безпрерывное за нимъ емопрѣніе, не заразилась сею болѣзнію; но другая особа, вошедшая случайно въ сію комнату, заболѣла на другой же день и умерла черезъ при дня. Я намѣренъ объяснить сей Левантскій битъ фактами, ибо не принимаю никакихъ теорій. Въ наукѣ, какова Медицина, нѣтъ еще точныхъ всеобщихъ основаній; но болѣе всего, кто въ неправильной болѣзни, какова чума, поднимается подъ облака для раземопрѣнія летучихъ частицъ заразы, для изысканія причинъ сего начала (focus), а не для изслѣдованія дѣйствій его и для опредѣленія, что болѣзнь сія прилипчива только, или только заразительна, и сообщается только чрезъ дыханіе или только чрезъ непосредственное соприкосновеніе, для показанія своего оспроумл и учености, сосполящей въ

однихъ словахъ, для опредѣленія различія между эндемическими и эпидемическими болѣзнями,—кто при всемъ эпомъ никогда не обращаетъ вниманія на лѣченіе болѣзни, поэтъ конечно пріобрѣтаетъ себѣ важность новоспѣю и замысловапоспѣю своихъ теорій, но не сдѣлаетъ ничего къ уменьшенію смертности, причиняемой сею болѣзнію. Я не сообщилъ вамъ ничего о чумѣ, во время пребыванія моего въ Конспанпиннополѣ и на оспровѣ Кандіи, хотя она въ то время въ обоихъ сихъ мѣстахъ была весьма сильна и хотя я лѣчилъ тамъ 46 больныхъ. Причина сему та, что я непрерывно запылавался въ своихъ мнѣніяхъ и въ одинъ день почилъ чуму заразительною, въ другой прилипчивою, а въ третій ни пѣтъ, ни другіе. Одно только было всегда постоянно и несомнѣнно и конецъ всегда былъ одинаковъ: именно, всякому больному, котораго я самъ или другіе при мнѣ лѣчили въ Конспанпиннополѣ, пускали кровь, давали слабительное, рвотное, для уменьшенія воспалительной горячки, и каждый больной умиралъ въ изнеможеніи; исключеній было очень мало. Я прибылъ въ Конспанпиннополъ совершенно убѣ-

жденнымъ въ мнѣніи Доктора *Мак-Клима*; оно было правдоподобно, а доказательства, имъ представленныя, могли совершенно убѣдильны молодыхъ людей. Сперва лѣчилъ я съ Докторомъ *Перюсселли*, старымъ Французомъ, который почиталъ самого себя доказательствомъ незаразительности чумы, и въ самомъ дѣлѣ не безъ причины: ибо онъ въ шеченіи многихъ лѣтъ прикасался къ чумнымъ язвамъ безъ всякаго вреда для собственнаго здоровья; онъ всегда находился въ веселомъ расположеніи духа и рѣдко бывалъ презвъ. Весьма примѣчательно, что всѣ имѣвшіе смотрѣніе за чумными госпиталями и соспирѣвшіеся посреди чумы были пьяницы. Перваго больного чумою видѣлъ я на невольническомъ базарѣ въ Кон-стантинполѣ, куда немногимъ только Франкамъ позволено ходити; онъ лежалъ на скамѣ въ публичномъ кофейномъ домѣ, окруженный народомъ, курящимъ шабакъ и пьющимъ кофе; онъ имѣлъ открытый бубонъ на рукѣ. Къ сему - по мѣсту Докторъ прикоснулся перстами и желалъ, чтобы и я сдѣлалъ тоже; но хотя я и былъ защитникомъ незаразительности, однако мнѣ показалось благо-разумнѣе вѣришь описанію чумной опухоли,



сдѣланному Докторомъ, нежели вводять перспы во внушренность ея; я удовольствовался только, ощупываніемъ опухоли снаружи. Мы пустили кровь сему несчастному и дали слабительное, для уменьшенія горячки; на другое утро мы нашли его мертвымъ. Черезъ нѣсколько дней послѣ сего лѣчили мы женщину, спровадившую уже 23 дня чумою; она приняла слабительное и умерла на 28-й день; невольница ея, лѣченная такимъ же образомъ, умерла черезъ недѣлю послѣ сего. Короче сказать, во всѣхъ случаяхъ поступали мы такъ, какъ другіе практики: мы всегда пускали кровь, а больные всегда умирали.

Моя хозяйка сдѣлалась весьма безпокойною касательно безопасности своего дома, по причинѣ моего въ немъ пребыванія; она сказала мнѣ, что какъ я посѣщаю чумныхъ больныхъ на базарѣ, то мнѣ должно или оставить домъ ея, или подвергаться окуриванію въ небольшой комнатѣ, которая обыкновенно назначается для сего въ Турціи, и дѣлать сіе всякой разъ, возвратившись домой, перемѣняя при этомъ платье. На сіе я

согласился, и ежедневно подвергался курению, почти удушавшему меня.

Не задолго предъ отъѣздомъ моимъ изъ Кон-  
спаннинополя чума открылась у Г-жи W,  
красивой молодой женщины. Несчастной боль-  
ной, по обыкновенію, пустили кровь; не ну-  
жно упоминать, что она вскорѣ послѣ этого  
умерла. Отецъ ея не опходилъ, онъ ея по-  
сещалъ, держалъ ее на рукахъ своихъ, облет-  
чалъ ея спраданія, глошалъ воздухъ, ко-  
торый она предъ кончиною издыхала, и  
однако не заразился; но когда, чрезъ нѣ-  
сколько недѣль послѣ ея смерти, двое слугъ  
посланы были для опиворенія комнаты, ко-  
торую занимала покойница и которая съ  
того времени была заперта, и для провѣ-  
щенія поспѣли, что одинъ изъ нихъ попи-  
часъ по входѣ въ сію комнату жадовался на  
спертый воздухъ; на другой день оказалась  
у него чума, и онъ умеръ чрезъ нѣсколько  
дней; это случилось послѣ моего отъѣзда;  
Докторъ *Бельфуръ* увѣдомилъ меня о семъ.

Это одно изъ моихъ доказательствъ ка-  
сательнаго вліянія духа на сію болѣзнь. Ни  
въ какой другой болѣзни вліяніе сіе не бы-  
ваетъ такъ явственно. Человѣкъ, который

боялся заразы, прежде другихъ поражаея чумою; страхъ располагаетъ къ чумѣ; худой родъ жизни и слабость тѣла суть ближайшія причины воспріимчивости оной. Я всегда замѣчалъ, что тѣ, кои сильно беспокоились объ участи больного, на примѣръ: отецъ, мать, жена, копорые постоянно оспавались при его постели, рѣдко заражались, между тѣмъ какъ слуги и посторонніе люди, изрѣдка входившіе въ комнату, обыкновенно подвергались заразе. Я зналъ однакожъ въ Константинополь много Турецкихъ домовъ, копорые были заперты послѣ того, какъ всѣ жившіе въ нихъ вымерли.

Не прежде, какъ находясь уже на островѣ Кандіи, имѣлъ я причину перемѣнить свое мнѣніе объ ученіи Доктора *Мак-Клина*. Тамъ я совершенно увѣрился, что чума есть болѣзнь и заразительная и прилипчивая; въ одно время эпидимическая, а въ другое эндемическая. Говоря просто, зараза сія можетъ сообщаться чрезъ прикосновеніе или чрезъ дыханіе; она въ одно время ограничивается однимъ какимъ либо округомъ; а въ другое распространяется между народомъ.

Но если чума постоянно появляется въ одномъ видѣ, то она есть эндемическая.

Я пережилъ опасность вдыханія заразительной атмосферы чумныхъ комнатъ, коей подвергался, сидя у постели зараженныхъ людей и ощупывая худокачественныя язвы, какъ то я обыкновенно дѣлалъ въ Константинополѣ. На островѣ Кандіи коса смерпи слишкомъ близко висѣла надъ моею шею, чтобы мнѣ можно было спать спокойно, полагаясь на незаразительность; чумныя испаренія были слишкомъ близки къ моимъ ноздрямъ, чтобы не вывести меня изъ заблужденія касательно принятаго мною ученія.

На островѣ Кандіи провелъ я много ночей въ комнатѣ, гдѣ одинъ только войлокъ отдѣлялъ мою постель отъ человѣка, умиравшаго отъ чумы. Ни я, ниже кто либо изъ моихъ товарищей, не замѣчали его болѣзни до тѣхъ поръ, пока я не былъ приглашенъ осмотрѣть его за нѣсколько часовъ до смерпи. Однакожъ никто не заразился, и сіе чрезвычайное исключеніе могъ я приписать только тому, что значительное количество спиртныхъ напитковъ, употребленныхъ сими господами (они были Офице-

ры Ибрагима Паши) каждое утро, въ полдень и вечеромъ, приводило ихъ тѣло въ такое состояніе, которое не благопріятствовало дѣйствию чумной заразы. Я говорю изъ собственнаго опыта и опіюю не намѣренъ представлять въ семь писемъ однихъ предположеній.

Болезни, наиболѣе похожія на чуму, суть: горячки тюремныя, нервная заразительная (typhus) и гнилая. Я называю чуму typhus gravisimus. Первоначальные припадки суть: общая слабость, приливъ крови къ сердцу, не опъ воспаленія, но опъ гнилостнаго состоянія крови. Опъ гнилой горячки она отличается только продолженіемъ и сыпью. Во всякомъ періодѣ чумы природа, кажется, поминся подъ вліяніемъ ядовитой міазмы, и если больной наконецъ изнемогаетъ, то это опъ недоспавка въ организмъ силы для выгнанія сыпи наружу. Бубонъ скрывается, карбункулъ уменьшается, либо ни попъ, ни другой не появляется снаружи, а скрывается внутри на жизненныхъ органахъ, и вскрытія шруповъ показали карбункулы въ печени, легкихъ, селезенкѣ, брыжеечныхъ железахъ; кратко сказать, болѣзнь, по видимому, поражаетъ всю железистую систему. Я ви-

дѣлъ всѣ виды чумы, вычисленные *Росселлемъ* и Французскими писателями и нимало не сомнѣваюсь признавъ ихъ за измѣненіе одного и того же рода; я утверждаю также, что нужно выполнять только одно показаніе, а именно: подкрѣплять изнемогающія силы организма, дабы онъ могъ извергнуть изъ себя ядъ. Какимъ образомъ это произвестъ: рвотнымъ, слабительнымъ, кровопусканіемъ, сладкою рпушью, рпушною мазью или втираніемъ масла? Я испыталъ всѣ сіи средства, и изъ одиннадцати первыхъ больныхъ, коихъ я такимъ образомъ лѣчилъ, поперялъ девять. Я прибѣгъ къ другому способу лѣченія, не выдавъ, чтобы кто либо его употреблялъ, и хотя *Ассалини* почиталъ его соопвѣтственнымъ, однако онъ никогда не былъ употребляемъ, по крайней мѣрѣ въ такой степени, въ какой я нашелъ его весьма дѣйствительнымъ.

Я рѣшился испытать сильныя летучія и посполныя возбуждающія средства, и началъ виномъ и водкою. Въ тошъ же часъ, когда только увидѣлъ я больного, были ли глаза его налипые, щеки красныя и кожа жесткая, находился ли тихій бредъ или

нѣтъ, я давалъ ихъ такимъ образомъ: первый пріемъ состоялъ изъ спакана горячей воды съ прешъею частію водки; это иногда производило рвогу и было пошчасъ повпоряемо; впорый пріемъ обыкновенно оставался въ желудкѣ и въ печеніи двухъ часовъ производилъ испарину, даже въ шѣхъ случаяхъ, въ коихъ James's powder (сюрьмяный порошокъ) оказался недѣйствительнымъ. Черезъ два или при часа послѣ перваго пріема слѣдоваль впорый, и больные меньше чувствовали жженія въ сердцѣ. Въ печеніи дня давали поже чрезъ 4—6 часовъ, смопря по обстоапельспивамъ. Обыкновенно бубоны увеличивались и за обильнымъ попомъ часпо слѣдовали цяпина (petechiæ) на груди; это всегда служило мнѣ вѣрнымъ, хорошимъ признакомъ. На впорый день пріемъ я увеличиваль; вмѣсто прешпи спирта давалъ половину, повпоря чрезъ восемь часовъ; это не производило опьяненія, а только чрезвычайную сонливость, продолжавшуюся до выступленія поппа или появленія карбункуловъ. Если больному на прешпій день было рѣшительно лучше, то я поддерживалъ возбужденіе крѣпкимъ Кипрскимъ виномъ, по двѣ ложки каж-



дые два часа; но если опасные припадки не облегчались, то я продолжалъ водку съ горячею водою, увеличивая количество до появленія рѣшительной перемены. Рѣдко нужно было продолжать сіе дѣйствительное лѣченіе долѣе шестипи дней. Можно сказать даже, что если чумный больной прожилъ до шестого дня, то весьма вѣроятно, онъ выздоровѣетъ; но претій день есть самый опасный. Прочее лѣченіе ограничивается однимъ или двумя промывательными, ибо внушенные слабительныя не годятся,—частымъ обмываніемъ лица уксусомъ съ водою; голова безпрестанно обвернута была полотенцами, смоченными уксусомъ, а къ бубонамъ прикладывали припарки, столь горячія, что онѣ возбуждали боль, и ихъ оспавляли до произвольнаго вскрыванія.

При такомъ лѣченіи изъ спа больныхъ выздоравливало семьдесятъ пять. На островѣ Кандіи изъ девяти выздоровѣло пять, хотя нѣкоторые изъ нихъ при началѣ моего лѣченія были въ опчаянномъ положеніи. Разумѣется, что въ чумѣ все зависить отъ заблаговременнаго лѣченія; ибо весьма мало можно терять времени въ болѣзни, обыкновенно совершающей свое теченіе въ три дня.

По прибытіи въ Александрію предложилъ я Гг. *Сальту* и *Торборну*, что принимаю на себя лѣченіе чумныхъ во все продолженіе сей болѣзни въ пошъ разъ. Я просилъ, чтобы мнѣ отвѣли небольшой госпиталь въ мое распоряженіе и общалъ изъ 100 спасти 75; нашъ Консулъ общался просить правительсво по сему предмету; но вскорѣ потомъ онъ самъ заперся въ карантинъ и дѣла остановились; а въ самомъ дѣлѣ Г. *Сальтъ* былъ ко мнѣ весьма расположенъ, и полагалъ, что я берусь за дѣло, самое пагубное.

Г. *Торборнъ*, весьма ласковый и любящій ученія изслѣдованія, принялъ мое предложеніе и хотѣлъ споспѣшествовать приведенію онаго въ дѣйствіе; но когда карантинъ сдѣлался общимъ, всѣ дѣла остановились, и я не слышалъ болѣе о новомъ госпиталѣ.

Тутъ я довольствовался только ежедневнымъ посѣщеніемъ чумнаго лазарета и преодолѣлъ страхъ моего хозяина, Г-на *Казу* (*Cazeu*) до того, что онъ пошелъ со мною и обошелъ всѣ комнаты лазарета. Я сдѣлалъ это отнюдь не потому, что будто сомнѣвался еще въ заразительности чумы, — я имѣлъ предъ собою неоспоримыя доказа-

тельствва пропивнаго; но я имѣлъ также несомнѣнныя доказательства, что она не столь заразительна, какъ оспа или даже корь. Чума при обыкновенныхъ обстоятельствахъ трудно сообщается; но, подобно другимъ болѣзнямъ, она можетъ сдѣлаться весьма заразительною чрезъ скопленіе многихъ больныхъ въ малой комнатѣ, худо провѣприваемой, нечиспой и смрадной. Мнѣ кажется, что при шаковыхъ обстоятельствахъ рѣдкая болѣзнь не сдѣлается заразительною. Въ Римѣ я видѣлъ, что чахотка дѣлалась заразительною опъ запиранія комнатъ (дабы не допустить свѣжаго воздуха къ шаковымъ больнымъ) и опъ теплой, влажной атмосферы той страны. Всѣ жители Рима признають сію болѣзнь за весьма заразительную, хотя это покажется необыкновеннымъ въ Англіи. Я неоднократно видалъ, что люди, входившіе въ чумныя комнаты, коихъ окна и двери были долго заперты и нечиспога воздуха была явственна для чувства, потчасъ жаловались на сильную боль головы, возвращались домой и больше не выходили.

Я не утверждаю, что зараза раждается только въ запертыхъ, худо провѣпренныхъ

комнатѣхъ, но говорю, что она тамъ усиливается и ожесточается. Изъ сего, можетъ быть, слѣдовало бы заключить, что она сообщается только чрезъ дыханіе, а не чрезъ прикосновеніе; но изъ примѣра моего слуги видно, что она сообщалась тѣмъ и другимъ способомъ; онъ заразилъ своего брата, взявъ его за руку, а братъ заразилъ другого чело-вѣка, случайно вошедшаго въ комнату и ни къ кому не прикасавшагося. Въ запертой комнатѣ щерпяныя вещи (болѣе всего) на-пииваются заразительнымъ воздухомъ, и если бы ходящіе за больными носили плащъ кожаное, напипанное масломъ и смоченное уксусомъ, то опасность зараженія уменьшилась бы въ половину.

Словомъ, чума при всѣхъ обстоятель-ствахъ заразительна; но при нѣкоторыхъ гораздо болѣе, нежели при другихъ. Въ хд-рошо провѣприваемой комнатѣ, гдѣ поспелю перемѣняють ежедневно, моютъ полъ и без-престанно поддерживаютъ огонь (это я по-читаю самымъ лучшимъ средствомъ къ выведенію испорченнаго воздуха), почти нѣтъ опасности приближаться къ больному, толь-ко бы дыханіе его не дѣйствовало на при-

ближающагося и плащѣмъ не коснуться его постели; на чепыре фуфа опѣ больного, въ комнаѣ съ чистымъ воздухомъ, нѣтъ никакой опасности. Я утверждаю, основываясь на многихъ наблюденіяхъ (сколько невидимая причина можетъ быть предметомъ наблюдений и опытности), что міазма распространяется не далѣе какъ на нѣсколько фуфовъ опѣ своего источника, именно, менѣе чепырехъ фуфовъ опѣ постели больного, да и тогда такъ изрѣжена воздухомъ, что совсѣмъ недействительна.

Посему я никогда не входилъ въ чумный госпиталь прежде, пока двери и окна комнаты не стояли десять минутъ опкрытыми; передъ тѣмъ обыкновенно выпивалъ я двѣ рюмки Кипрскаго вина и во все пребываніе въ комнаѣ курилъ сигарку или трубку. Нѣтъ никакой надобности наклоняться надъ больнымъ, осязая бубоны и пульсъ; это не приноситъ никакой пользы. Карбункулы, имѣющіе перейти въ антроновъ огонь, для ограниченія онаго, нужно разрѣзывать крестообразно до самаго основанія. Врачъ можетъ оказать такое же пособіе своему больному, находясь опѣ него на распояніи 4-хъ

Фуповъ, какъ и сидя подлѣ него и изслѣдывая перспами чумныя язвы. Смерть многихъ неоспорожныхъ. Врачей причиною ужаса сей болѣзни и того, что теперь лѣчение чумныхъ по всему Леванту предоспавлено грубымъ и несвѣдущимъ шарлапанамъ. Недавно Докторъ *Джіордано*, здѣсь довольно славный, заразился чумою, сидя на постели умирающаго отъ оной больнаго. Онъ пережилъ седьмой день, послѣ котораго обыкновенно полагають опасность миновавшеюся; но его пріятели—Врачи его оставили; въ домъ одного изъ нихъ появилась чума, и онъ такъ испугался, что покинулъ своихъ больныхъ. Бѣдный *Джіордано* оставался только съ своею вѣрною невольницею, которая не покидала его, пока сама не заразилась. Сосѣди, осматривая по смерти его кварширу, увидѣли, что несчастный дѣйствительно умеръ отъ недосмотра; нѣкому было уполить его жажду въ минушу смерти, утѣшить его или ободрить. Бѣлье нѣсколько дней не было переиѣнено и уже завелись въ немъ насѣкомыя. Невольница умерла, 10 дней спустя послѣ смерти господина. Повѣрите ли, что теперь нѣтъ ни одного Врача въ Алек-

сандрии, который спалъ бы посѣщая чумнаго больного, не имѣя предъ глазами примѣра бѣднаго *Джіордано*, не превожась мыслію заразиться самъ и быть оспавлену всѣми, безъ помощи, безъ оспрады? Если сыщется пакой, то онъ долженъ быть либо гораздо смѣлѣе меня, либо знатъ чуму менѣе моего.

Теперь я предспавлю вамъ обзорѣе больныхъ чумою, лѣченныхъ при мнѣ здѣсь въ чумномъ лазаретѣ въ 1825 году, прося припомъ припомнишь, что сей лазаретъ назначенъ только для Европейцовъ, и преимущественно изъ низшаго сословія. Подобно другимъ чумнымъ лазаретамъ, онъ находится на худомъ мѣстѣ, худо успроенъ и весьма худо управляется. Лѣченіе ниже средспвеннаго; зацбуса (вода бузинныхъ цвѣшовъ) есть главное внупреннее лѣкарство; кровопусканіе и піявки въ обыкновеніи, слабишельныя и рвоцныя рѣдко упошребляющся, и то въ началѣ, что впрочемъ весьма правильно. Я видѣлъ только одного больного, выздоровѣвшаго послѣ обильнаго кровопусканія. Докшоръ *Грасси*, имѣвшій обыкновеніе вскрывашъ бубоны въ госпиталѣ и чрезъ то, по моему мнѣнію, безъ надобности прикасавшійся къ больнымъ, со-



общилъ заразу своей женѣ, жившей въ чистомъ госпиталѣ, близъ чумнаго лазарета; онъ пускалъ ей много крови, и въ тоже время давалъ возбуждающія и прошивусудорожныя лѣкарства, какъ то: хину, эфиръ, змѣиный корень. Я посѣщалъ ее каждый день; у нее былъ бубонъ надъ лобковыми костями, чего я допото никогда не видалъ. Кромѣ того случай сей примѣчашеленъ по хорошему успѣху кровопусканія: ибо хотя я и слышалъ, что нѣкоторыя выздоравливали послѣ кровопусканія, но это былъ первый мною видѣнный паковый случай. Хотя Г-жа *Грасси* и избавилась чумы, но не могла поправиться совершенно, и спустя нѣсколько недѣль послѣ того, заболѣла претѣдвеною лихорадкою, опѣ коптой и умерла.

Слѣдующая таблица предспавляетъ число Франковъ, лѣченныхъ опѣ чумы въ госпиталѣ въ 1825 году, припадки болѣзни при поступленіи, вторичные припадки, лѣченіе и исходъ, копторый, какъ можно видѣшь, вообще былъ несчастный на третій или четвертый день. Изъ нее можно также видѣшь, какъ смертность уменьшалась подѣ конецъ свирѣдспованія чумы.



Больные.	Первые припадки.	Вторые припадки.	Лечение.	Исходъ.
Испанскій Ка- типанъ.	4 дня боль головы.	Бубоны и карбункулы.	Rtiane.	Ум. на 3-й д.
Испанскій малпроръ.	6 дней болѣтъ, бубоны.	Карбункулы.	---	Выздоровѣлъ.
Австрійскій малпроръ.	Боль головы, пошпопа.	Часный ознобъ безъ сып.	Цизанъ.	Умеръ на 2.
Италянскій малпроръ.	--- рвота.	Карбункулы.	Слабительное.	---
---	Рвота, бубоны.	Сильный бредъ.	Rtiane, кровопусканіе.	4. --- 4.
---	Дрожь, жажда.	Посполная жажда, безъ сыпи.	Rtiane.	2. --- 2.
Австрійскій плошнѣль.	Карбункулы.	Ходилъ, не слагая въ по- спель.	Rtiane.	3. --- 5.
Италянскій госпитальнѣй служитель.	Бубоны, боль головы.	Сильный бредъ.	---	---
--- старшій.	Два бубона, пошпопа.	Карбункулы и бубоны.	Слабительное.	---
Жена Докпо- ра Грасси.	Легкая боль головы.	Большой бубонъ, безъ сильнаго бреда.	Кровопусканіе до фун- та, хина, seprentaria.	Выздоровѣла.
Испанецъ.	Бубоны, рвота.	Сильный бредъ.	Rtiane.	Умеръ на 2.

БОЛЬНЫЕ.	ПЕРВЫЕ ПРИПАДКИ.	ВТОРЫЕ ПРИПАДКИ.	ЛѢЧЕНІЕ.	ИСХОДЪ.
Мой слуга.	Боль головы, тошнота	Бубонъ, бредъ.	Слабитель., ріsane, хина.	Ум. на 3-й д.
Италянскій сапожникъ.	Тошнота, боль головы.	— — — —	Ріsane —	— — — — 4.
Мальпійскій слуга.	Очень легкая лихорадка.	Три карбункула.	— — — —	Выздоровѣлъ
Мальпійскій разнощикъ.	— — — — —	Бубонъ и карбункулы.	— — — — слабительное.	— — — —
Англійскій мапрось.	Жесточкая боль головы.	Вредъ, бубоны.	Ріsane —	Умеръ на 2.
Австрійскій мапрось.	Бубонъ, дрожь.	Тошнота, бредъ.	— — — —	— — — — 3.
Мальпійскій слуга.	— — — — рвота, боль гол.	Большой бубонъ на рукъ.	— — — —	— — — — 4.
Мальпійскій поршней.	Боль головы, тошнота.	Бубонъ.	— — — —	Выздоровѣлъ
Французскій мапрось.	Бубонъ, легкая лихор.	Легкая рвота.	— — — —	— — — —
— — — — —	Тошнота, ознобъ.	Бубонъ въ паху.	— — — —	Умеръ на 8.
Австрійскій мапрось.	Бубонъ, безъ боли гол.	Легкая лихорадка.	— — — —	Выздоровѣлъ

БОЛѢВІЕ.	ПЕРВЫЕ ПРИПАДКИ.	ВТОРЫЕ ПРИПАДКИ.	ЛѢЧЕНІЕ.	ИСХОДЪ.
Гемузскій пластиникъ	Нубага, безъ боле го- товъ.	Леткая лихорадка.	Слишкомъе дважды.	Выздоровѣлъ
	Карбункулы, въ началѣ чумы, подъ конецъ ра- ко . . . . .	Бредъ, малые бубоны, боль головы, худые при- знаки. . . . .	Леченіе вовсе неѣ- спалось. . . . .	24 умерло, 10 выздоров.
Всего 34				

Часть XV. N. 1.

Съ  
Съ

Надежишь замѣнишь, что погода во время свирѣпствованія чумы въ 1825 г. была весьма умѣренная и камзинъ (жаркій, спешный въпръ) случался рѣже, нежели въ два предшеспвованіе года. Вообще я замѣнилъ, что во дни ка- зима чума чаще обнаруживалась и смерпность была болѣе обыкновенной.

Во время пребыванія Французовъ въ Египтъ намъ не было чумы девять лѣтъ сряду, и хопя *Cirb Robertъ Вильсонъ* и другіе утверждають, что въ то время чепыре года не было сообщенія съ Турціею, однако эпо не справедливо. Сообщеніе всегда продолжалось посредственно или непосред- ственно. Спрогія ибры чиспопы, введенныя Французами, предохранили

Съ

Египетъ опъ заразы, и на долго, даже и по ихъ удаленіи и когда Турецкіе корабли приходили каждый день.

1825 года, во время свирѣпствовавшей чумы въ Александріи и Кипрѣ, лежащій между ними городъ Фуагъ (Fouah) пощаженъ ею, равно какъ и въ предшествовавшія восемь лѣтъ, хотя и имѣлъ онъ ежечасное сношеніе съ упомянутыми зараженными городами. Какъ это изъяснишь, я не знаю.

Я окончу мое письмо однимъ или двумя замѣчаніями о правильномъ появленіи и окончаніи болѣзни въ Египтѣ въ извѣстное время года.

Я не могу опредѣлить, находится ли разлитіе и спаденіе Нила въ связи съ появленіемъ и прекращеніемъ чумы, или это сущь только случайныя, современныя происшествія; но то правда, что они случаются вмѣстѣ. Чума обыкновенно начинается въ Маршѣ и прекращается при поворотѣ солнца на зиму; въ сіе время разлитіе водъ Нила бываетъ наибольшее, а во время появленія чумы земля бываетъ высохшею.

Мнѣ кажется, что зараза, производящая чуму, не рождается въ спранахъ, наводняе-

мыхъ Ниломъ, что ни наводненіе, ни спаденіе воды не имѣетъ никакого вліянія на происхожденіе оной; но что особенное состояніе атмосферы, зависящее отъ измѣненія поверхности той страны, производимое перемѣнами Нила, имѣетъ существенное вліяніе на происхожденіе и распространеніе заразы; кратко сказать, что атмосфера только проводитъ заразу, которой зарожденія надлежитъ искать въ другомъ мѣстѣ.

Зараза и malaria рождаются отъ гніенія, издающаго невидимый паръ, о присутствіи котораго можно судить только по его дѣйствию. Malaria рождается отъ разложенія развѣшительныхъ тѣлъ; *зараза тулы, по моему мнѣнію, происходитъ отъ гніенія животныхъ тѣлъ*. Происхожденіе каждой зависишь отъ особеннаго состоянія влажности и теплоты, какого не бываетъ въ другихъ странахъ.

Достопримѣчательно и припомъ мало извѣстно, что Жидовская часть города въ Римѣ менѣе другихъ подвержена вліянію malariae, а Жидовскія части во всѣхъ городахъ Леванта прежде другихъ поражаются чумою. Сіе объясняю я слѣдующимъ образомъ: Жи-

\*

довскія жилища вездѣ извѣстны своею нечистотою; вокругъ ихъ безпрестанно происходитъ гніеніе всякаго рода живописныхъ; ихъ кваршалъ во всякомъ городѣ самой худый, пѣсный и весьма непріятный, по причинѣ ихъ обыкновенія выбрасывають всякую нечистоту на пѣсныя улицы.

Міазма, происходящая отъ гніенія живописныхъ, должна быть гораздо вреднѣе, нежели отъ распѣній и, вѣроятно, одна пропихиваетъ другой, такъ что въ Римѣ хотя состояніе атмосферы не таково, какое нужно для произведенія чумы, однакожь тамъ всегда замѣчено много нервныхъ горячекъ (typhus), и въ Жидовскомъ кваршалѣ бываетъ ихъ болѣе, нежели въ другихъ. Можетъ быть, это причиною, что сія часть Рима мало подвержена *malariae*. Но во всѣхъ Турецкихъ городахъ нечистота превосходитъ всякое описаніе, и, по моему мнѣнію, преимущественное скопленіе оной въ Египтѣ и Турціи, при содѣйствіи извѣстнаго состоянія атмосферы, причиною, что чума ограивается сими землями, между тѣмъ какъ другія страны, лежація подъ тою же широтою, избавлены отъ оной. Она не встрѣчается ни въ



Индіи, ни' въ Абиссиніи, ниже въ степяхъ, смежныхъ съ Египтомъ.

Путешественники ошибаются, почитая Турковъ опрятными. Они видятъ ихъ при или чепыре раза въ день обмывающими руки и ноги, а не обращаютъ вниманія на нечистыя улицы, въ которыхъ они живутъ, опшрапительные дворы ихъ жилищъ, особенно низшаго класса, и на рѣдкую перемѣну бѣлья.

Во всѣхъ Турецкихъ и Египетскихъ городахъ улицъ никогда не чистятъ; нѣтъ никакихъ спокоевъ; мясники убиваютъ скотину на улицѣ, и, если кровь печетъ чрезъ ихъ порогъ, то они опметаютъ ее къ сосѣдамъ. Дохлыя собаки, кошки и крысы безпреспанно гніютъ на улицахъ, и въ переулкахъ Александріи я видалъ, что падшіе верблюды и ослы лежали на дорогѣ и заражали воздухъ въ окрестности.

Если можно полагать, что паковыя причины могли бы произвестъ typhum въ окрестностяхъ St. Giles и Covent—Garden (въ Лондонѣ), гдѣ болѣзнь сія случается всякое лѣто: то колыи паче можно повѣрить, что миазма, происходящая опъ гніенія животныхъ,

въ состояніи произвешъ опасный видъ typhi, чуму,—въ знойныхъ улицахъ Каира и Александріи.

Наконецъ я не сомнѣваюсь, что чума рождается отъ міазмы, образующейся при гніеніи живошныхъ; что воздухъ проводитъ міазму; что чума первоначально произошла (въроятно) въ Египтъ, что она мало заразительна при обыкновенныхъ обстоятельствевахъ, но отъ недоспапочнога освѣженія воздуха и отъ нечистоты дѣлается весьма заразительною; что чума имѣетъ одинъ только видъ, съ многоразличными припадками; что она никогда не можетъ долго существовать въ спранѣ, гдѣ соблюдается чистота и хорошій полицейскій присмотръ; что слишкомъ строгій карантинъ, запирая людей въ шѣсныхъ домахъ, весьма въроятно, поддерживаеетъ заразительность; что поспановленія, касапельно чистоты, особливо спокровъ и проч. весьма полезны и всегда должны быть исполняемы; что какъ болѣзнь съ самага начала сопровождается слабостію, зависящею отъ гнилостнаго состоянія крови и оканчиваеица смертію отъ переноса сыпи на жизненные орга-

ны: то нужно употреблять возбуждающій способ лѣченія и избѣгать всякаго испра-  
жненія.

Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Pa-  
lestina, 1824-1827. by R. R. Madden. Lon-  
don. 1829. Vol. 1.

---

## II.

### О ГОРЯЧКАХЪ ВООВЩЕ.

*Сожненіе Профессора П. Чаруковского.*

---

1. Горячки суть самыя обыкновенныя, чаще другихъ практическому Врачу встрѣчающіяся болѣзни, и это, безъ сомнѣнія, причиною, что, кажется, нѣтъ ни одного опредѣленія болѣзней, о копоромъ было бы написано сколько сочиненій, какъ о горячкахъ. Судя по симъ двумъ обстоятельствомъ, можно бы полагать, что сей предметъ практической Медицины болѣе другихъ изслѣдованъ, объясненъ и приведенъ въ порядокъ и лѣченіе сихъ болѣзней болѣе другихъ усовершенствовано и опредѣлено; однако на самомъ дѣлѣ открывается прошивное, и также едва ли не навѣрно можно сказать, что нѣтъ ни одного предмета въ Медицинѣ, о копоромъ бы Врачи сколько

до разногласили между собою, не только въ теоріи, но и на практикѣ, какъ о горячкахъ. Оставивъ древніе и средніе вѣки, бросимъ только бѣглый взоръ на нынѣшнее состояніе ученія о горячкахъ въ разныхъ странахъ, дабы увѣрились въ сказанномъ. Ближайшіе наши сосѣди, Нѣмцы, еще и теперь большею частію придерживаются въ семъ отношеніи Гуморальной Патологіи, выводятъ горячки отъ порчи соковъ \*), разныхъ оспрошъ, и лѣчатъ ихъ меподически разрѣшающими и испражняющими средствами; другіе почипають ихъ за (спасительное) пропиводействіе жизненной силы, вредными вліяніями или раздраженіями возбужденное, и главное дѣйствіе исцѣленія предоспавляютъ цѣлительной силѣ организма (*vis naturæ medicatrix*), а врачевныя пособія ограничивають тѣмъ, чптобы чрезмѣрныя пропиводействія природы умѣрять, слабыя поддерживать и удалять препятствія, пропивошоящія усиліямъ природы \*\*). Французы, *Пинелисты*, оставивъ всѣ

\*) См. Richter's Therapia. I. Bd. стр. 24 и слѣд. Kreissig Handbuch der pract. Krankheitslehre. II. Thl. стр. 520.

\*\*) См. Valent. ab Hildebrand Institutiones practico-medicae.

кое умозрѣніе о горячкахъ и о болѣзняхъ вообще, довольствуясь одною опытноспію и наблюденіемъ, и также ожидаютъ лѣченія отъ цѣлительной силы природы, коей помогаютъ преимущественно охлаждающимъ либо слизистымъ, а иногда возбуждающимъ пипьемъ (*tisane*). Другая секта Французовъ, или *Бруссисты*, во всѣхъ горячкахъ видятъ только раздраженіе или воспаленіе желудка и кишекъ, по крайней мѣрѣ какъ первоначальное спраданіе, и кромѣ піявицъ, смягчительныхъ припарокъ, слизистаго пипья и наружныхъ отвлекающихъ средствъ, другихъ не знаютъ. За Брипанскимъ Каналомъ въ Англіи при лѣченіи сихъ болѣзней рѣдко увидите что либо кромѣ испражнений крови, преимущественно общихъ, слабительныхъ, прохладной шемперапуры и шаковаго же пипья\*). Холодныя ванны и обливанія уже почти совсемъ оставлены. Испаліанцы (Конпраспи-

---

\*) По переѣздѣ изъ Вѣны въ Англію, въ 1819 году, для меня было поразительно видѣть, что здѣсь больнымъ горячками выпускали болѣе крови, нежели тамъ давали пишь *Decoct. rad. althææ cum syrupo ejusdem*, какъ главное лѣкарство.

мулисты) также имѣють свое особенное понятіе о горячках и лѣчатъ ихъ особливымъ образомъ.

2. Таковое различіе мнѣній объ одномъ и томъ же родѣ болѣзней и способовъ лѣченія оныхъ можно объяснить только двумя причинами: или что болѣзни сіи въ разныхъ спранахъ бываютъ различнаго свойства, или что Врачи онаго не поняли. Конечно никакъ не станешь отрицать, что климатъ, родъ жизни, занятія, пища, питье и проч. въ различныхъ спранахъ различное имѣють вліяніе на болѣзни, особливо оспры и измѣняютъ ихъ свойство, сообразно чему и самое лѣченіе ихъ должно быть различно. Однако происпекающее изъ сихъ обстоятельствъ различіе горячекъ не такъ велико, сколько различны вышеупомянутыя мнѣнія и способы лѣченія. Таковыя измѣненія бываютъ даже въ одной и той же спранѣ, но они мало измѣняютъ лѣченіе, если шамъ нѣтъ Врачей, слѣдующихъ различнымъ ученіямъ. Но чтобы явственнѣе видѣть, что это зависитъ не отъ различнаго свойства болѣзней, а отъ различнаго объ нихъ мнѣнія Врачей, призовите къ одному больному Врачей, учив-

шихся въ разныхъ школахъ. Французъ будещъ лѣчить его своими tisanes, пѣвками и отвлекающими, Англичанинъ пустишь кровь и дастъ порядочное слабительное. Нѣмецъ пропишетъ сложную микстуру слабодѣйствующихъ лѣкарствъ, а Италіанецъ tartaratis stibii et potassae въ значительныхъ приемахъ.

3. Не принимая на себя труда разбирать вышеприведенныя и другія мнѣнія о горячках и основанныя на нихъ способы лѣченія, я намѣренъ здѣсь представить чипашелю мои мысли о сихъ болѣзняхъ, вмѣстѣ съ способомъ лѣченія оныхъ вообще, который уже нѣсколько лѣтъ употребляю въ госпиталѣ и въ приватной практикѣ и при годѣ въ Терапевтической Клиникѣ, могу сказать, съ счастливѣйшимъ успѣхомъ.

4. Подъ словомъ горячка, febris, я разумѣю, какъ уже извѣстно чипашелямъ сего Журнала, общую оспрую болѣзнь нашего организма или скоропоспѣжно воспослѣдовавшее первоначальное, общее спраданіе онаго. Уже прежде спарался я показать, хотя кратко; но, кажется, не безъ основательности, что главное условіе скоропоспѣжно появляющихся болѣзней нашего организма, исключая ме-



ханическія и химическія поврежденія, соспоришь преимущественно въ измѣненіи его жизнедѣятельности, именно, нервовъ органической жизни; въ послѣдствіи надѣюсь представить это обстоятельство и яснѣе, а здѣсь счишаю нужнымъ изложить, по крайней мѣрѣ, главнѣйшія замѣчанія, касающіяся впрочемъ половины сказаннаго опредѣленія горячекъ.

5. Многіе изъ новѣйшихъ писателей, особливо Англійскихъ и Французскихъ, стараются доказать, что спраданіе всего организма, которое мы называемъ первоначальною горячкою, есть припадочное, возбужденное по сочувствію опъ мѣстнаго воспаленія или раздраженія. Таковое мнѣніе они вывели изъ того, что въ продолженіи всякой горячки замѣчаются признаки преимущественнаго спраданія какого либо органа и что въ шѣлахъ умершихъ послѣ горячекъ обыкновенно находятся слѣды такого спраданія.

6. Я думаю, всякъ согласится, что цѣлая системы нашего организма также могутъ спрадаться первоначально, какъ и частныя органы онаго. Также не трудно понять, что при спраданіи цѣлыхъ системъ частныя органы не могутъ правильно совершать сво-

ихъ отправленій: ибо для сего необходимо надлежащее содѣйствіе системъ. Равнымъ образомъ едва ли кто спанетъ опровергать, что при общемъ спраданіи разстройство частныхъ отправленій воспослѣдуетъ въ болѣе степеніи въ тѣхъ органахъ, которые по какой либо причинѣ болѣе другихъ были къ тому склонны, или болѣе другихъ подверглись вліянію болѣзнетворной причины.

7. Опытнось совершенно подтверждаетъ сія общія положенія. Весьма часто, особливо въ умѣренномъ климатѣ и у здоровыхъ людей, мы въ началѣ и даже въ продолженіи нѣсколькихъ первыхъ дней горячки не замѣчаемъ никакого значительнаго, преимущественнаго мѣстнаго спраданія, но только отправленія системъ и главнѣйшихъ органовъ: кожи, почекъ, кишекъ, легкихъ болѣе или менѣе измѣняются. Если же какой либо изъ сихъ или другой органъ уже прежде спрадалъ, или произведшее горячку вредное вліяніе дѣйствовало сверхъ того на другіе: тогда, вмѣстѣ съ горячкою, будетъ найдись преимущественное спраданіе шлаковаго органа. Такъ въ жаркихъ странахъ спраждаютъ преимущественно брюшныя органы, а

въ холодныхъ легкія; шакъ спрдавшіе желчными горячками на Югѣ подвергающія имъ и въ С. Пепербургѣ, гдѣ болѣзни сія между коренными жителями весьма рѣдко вспрѣчается \*). Пропривоположныя наблюденія шакже служатъ доказательствомъ того, что горячки могутъ быть сами по себѣ, независимо отъ мѣстнаго спрдаванія, а именно: сколько разъ видимъ мы довольно жестока мѣстныя воспаленія, по крайней мѣрѣ въ первые дни, несопровождая значительными припадками спрдаванія всего организма? Кшо изъ внимательныхъ и умѣющихъ наблюдать Врачей не замѣтилъ, что нерѣдко жестокое воспаленіе легкихъ или кишекъ не сопровождается такимъ жаромъ тѣла, сухостию кожи и языка, жаждою и чувствомъ усталости, какіе находяшяся при умѣренной воспалительной или нервно-воспа-

---

\*) 1828 и 1829 года мы два раза, осенью и зимою, пользовали въ Клиникѣ молодого, недавно здѣсь поселившагося Грека. Оба раза спрдавалъ онъ сильною желчно-нервною горячкою (*typhus biliosa gravior*), а изъ прочихъ болѣзныхъ ниодинъ не представлялъ намъ болѣзни сего свойства.

липельной горячкѣ. Но сказанные припадки, оплечающіе то болѣзненное состояніе организма, которое мы называемъ горячкою, должны находиться въ шаковыхъ случаяхъ, если бы оное состояніе зависѣло отъ мѣснаго воспаленія.

8. Тѣмъ менѣе справедливо ученіе тѣхъ, которые выводять горячки отъ спраданія одного какого либо органа, какъ *Клоттербокъ* отъ спраданія мозга, а *Бруссе* отъ воспаленія желудка-кишечнаго. Спраданіе общаго чувстввилица не только въ началѣ, но и во все продолженіе многихъ горячекъ бываетъ такъ маловажно, что опіюнь не лзя выводить изъ онаго общихъ припадковъ, а иногда не бываетъ никакихъ признаковъ, показывающихъ шаковое спраданіе; и на оборотъ, не совсѣмъ рѣдко случается, что жестокое спраданіе мозга, даже острое воспаление онаго, въ нѣсколько дней оканчивающееся выпотѣніемъ сыворотки въ полосняхъ онаго, не сопровождается значительными лихорадочными припадками, каковыя примѣры видѣлъ я неоднократно.

9. Признаки разспроеннаго пищеваренія находятяся не во всякой горячкѣ, и на обо-

ролъ, оппвление сіе часпо и значительпо  
разспроивается безъ припадковъ горячки. Въ  
горячкахъ случающееся разспроисво пице-  
варительныхъ органовъ, если оно не зависить  
опъ особеннаго вліянія на сіи органы случайной  
причины и если сіи органы до того времени  
не были повреждены, еспъ необходимое слѣд-  
ствие болѣзни. При всякомъ значительномъ  
общемъ разспроисвѣ въ организмъ частныя  
органы его органической жизни (опдѣлений)  
не могутъ надлежаще совершать своихъ оп-  
пвлений: ибо для сего попребно правильное  
содѣйствие главныхъ его системъ: нервно-  
органической (syst. gangliosum) и кровно-  
ной, изъ коихъ послѣдняя даетъ матеріаль  
для опдѣленія, а первая управляетъ процес-  
сомъ опдѣленія. Посему въ горячкахъ измѣ-  
няется не только опдѣленіе пищеваритель-  
ныхъ органовъ, но и всякое другое, а особ-  
ливо кожи и почекъ, и послѣднія еще пре-  
жде перваго. Но мы болѣе обращаемъ вни-  
манія на опдѣленія первыхъ пушей и печени,  
потому что признаки, ими представляемые,  
для насъ явственнѣе, примѣлнѣе и болѣе  
понятны. Впрочемъ измѣненное опдѣленіе  
еще не показывается воспаления.

Часть XV. N. 1.

4

10. Что во всякой, или почти во всякой значительной общей оспрой болѣзни желудка спраждеть примѣшнѣе и, можетъ быть, болѣе другихъ органовъ;—сему есть особливая причина: онъ ближе другихъ къ полулунному узелку и упробному сплетенію нервовъ—центру нервовъ органической жизни. Но выводить всѣ горячки отъ первоначальнаго спраданія желудка и кишекъ можетъ только поверхностный наблюдатель, неимѣющий основательныхъ физиологическихъ и патологическихъ свѣденій. Не всегда находимое нами въ организмѣ измѣненіе есть первоначальное и главное спраданіе, но часто оно есть только слѣдствіе; такъ изліяніе сыворотки или крови въ полостяхъ мозга есть слѣдствіе предшествовавшаго воспаленія или сильнаго припеченія крови; такъ помершвѣніе ущемленной грыжи есть слѣдствіе ущемленія, и проч.

Послѣ сего, кажется, не неумѣстнаго опустенія возвратимся къ нашему предмету.

11. Наблюденіе показываетъ, что не во всѣхъ горячкахъ и не вдругъ равномѣрно поражаются всѣ системы и органы нашего тѣла, но нѣкоторыя системы спраждутъ

во всѣхъ, а другія только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, нѣкоторыя съ самаго начала болѣзни, а другія только въ продолженіи оной. Физиологія и Патологія должны намъ это объяснить, дабы мы изъ того могли вывести основательнѣйшія правила касательно леченія.

12. Физиологическій законъ сказаннаго различія есть общій законъ жизни: ибо и горячка есть форма (видъ) жизни.

13. Жизнь, въ какомъ бы видѣ она намъ ни представлялась, не вдругъ достигаетъ своего совершенства, но постепенно, переходя низшія степени. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ она останавливается на какой нибудь изъ низшихъ степеней, не достигая высшей; въ другихъ она переходитъ всѣ степени, въ большемъ или меньшемъ совершенствѣ. Равнымъ образомъ и измѣненіе жизнедѣятельности нашего организма не вдругъ проспиритуется на всѣ его системы, но или останавливается на какой нибудь изъ низшихъ, или же восходитъ и до высшей, но только въ продолженіи нѣкотораго времени. Это составляетъ естественные періоды горячекъ,

такъ какъ періоды жизни нашего организма зависятъ отъ развитія его системъ.

14. Но развитіе организма до высочайшей степени его совершенства есть только одна половина его жизни (evolutio); по достиженіи сей степени организмъ клонится къ своему разрушенію, и также постепенно, хотя съ менѣе явственными періодами (revolutio). Горячка, какъ жизненный процессъ, слѣдуетъ тому же закону. Достигнувъ высочайшей степени своего развитія (аспе), она начинается постепенно разрѣшаться, клониться къ выздоровленію. Вторая половина жизни нашего организма короче первой, и періоды ея не такъ явственны, какъ періоды первой. Тоже обыкновенно видимъ и въ горячкахъ. И сему есть Физиологическая причина, но я ее ясно еще не понялъ.

15. Теченіе жизни организма, касательно ея продолженія, совершенства, содержанія одного періода къ другому и проч., многообразно измѣняется разными обстоятельствомъ. Таковыя же обстоятельства, и еще удобнѣе, измѣняютъ теченіе горячки, такъ что въ нынѣшнее время, когда люди, особливо въ большихъ городахъ, по необходимо-



спи либо по произволу болѣе или менѣе уклоняюся отъ естественнаго образа жизни, горячки рѣдко совершаютъ правильно свое печеніе, и посему предсказанія *Гипократа* въ наше время такъ рѣдко сбываются.

16, Главныхъ системъ въ нашемъ организмѣ, опредѣляющихъ періоды горячки, только три: плодотворная, кровеносная и нервная; посему и естественныхъ періодовъ горячки можетъ быть только шесть: при періода развитія болѣзни и столько же выздоровленія.

17. Въ первомъ періодѣ спраждаетъ первоначальная система нашего организма, общая всѣмъ его частямъ, служащая его матеріальному бытію, его органической жизни, такъ сказать, непосредственно. Прочія системы въ семъ періодѣ спраждаютъ только по сочувствію, какъ части спраждающаго жива цѣлаго.

18. Случайныя вліянія, производяція горячки, вообще сперва поражаютъ нервы органической жизни, какъ органы, управляющіе ея дѣйствіями. Но всякое необыкновенное вліяніе, дѣйствующее на какой либо жизненный процессъ, ограничиваетъ, уменьшаетъ

его дѣятельность \*). Посему первые признаки горячки показываютъ уменьшеніе органической дѣятельности нашего тѣла \*\*). Признаки сіи извѣсны у писателей подъ неправильнымъ названіемъ предшесствующихъ (з. prodroma) и состоятъ:

\*) Въ организмѣ мы не можемъ видѣть сего состоянія нервной системы непосредственно; но мы можемъ наблюдать тоже самое въ другомъ видѣ. Всякое необыкновенное, нѣсколько значительное, внезапное впечатлѣніе на нашъ умъ прерываетъ теченіе нашихъ мыслей, приводитъ насъ въ изумленіе, продолжающееся болѣе или менѣе, послѣ котораго мысли опять воспринимаютъ ходъ, иногда новый, болѣе дѣятельный, а иногда прежній. Равнымъ образомъ при полученіи важнаго нечаяннаго извѣстія, касающагося до благосостоянія цѣлаго общества, члены оного превожатся, оспадляютъ другія свои дѣла и обращаютъ все свое вниманіе къ сему новому предмету, а потомъ либо предпринимаютъ новыя намѣренія, или обращаются къ обыкновеннымъ своимъ должностямъ.

\*\*) Я не буду разсматривать отношенія каждаго признака въ особенности къ его патологическому условію; это старался я показать въ моей Семіотикѣ.

а). Въ уменьшеніи естественныхъ побужденій и другихъ опправленій нашего пѣла, опредѣляемыхъ общимъ чувствомъ и служащихъ его органической жизни. Позывъ на пищу вообще и даже къ вещамъ, приносящимъ особенное удовольствіе (кофе, табаку и проч.), уменьшается, вкусъ измѣняется или преряется, больной чувствуетъ легкій ознобъ и дрожь, начинающіеся со спины и проходящіе вверхъ до головы и внизъ къ ногамъ, нерѣдко перемѣняющіеся съ бѣглымъ жаромъ; непостоянная боль.

б). Въ уменьшеніи дѣйствія кровеносной системы и зависящихъ отъ него процессовъ. Пульсъ по большей части рѣдкій, вообще сжатый, сравнительно слабый, дыханіе малое, слабое, тяжестъ въ груди, температура пѣла ниже естественной, опдѣленія и испраженія уменьшены или прекращены, кожа сухая, блѣдная, моча жидкая, водянистая; гной въ язвахъ уменьшается и дѣлается жидкимъ; у кормилицъ молоко опдѣляется въ мѣньшемъ количествѣ, водянистое. Подобную перемѣну претерпѣваетъ мѣсячное и послѣродовое очищеніе и другія опдѣленія.

с). Дѣятельность высшей части нервной системы, по связи ея съ органическою жизнью, находится въ подобномъ состояніи; отъ того тяжестъ головы, тупостъ чувствъ, склонность къ уединенію, невеселостъ, забывчивостъ, неохота къ умственнымъ и тѣлеснымъ занятіямъ, тяжестъ членовъ, усталостъ.

19. Періодъ сей проходитъ всякая горячка; только признаки онаго бываютъ различны вразсужденіи силы и продолженія, что зависитъ наипаче отъ тѣлосложенія больного, жестокости случайнаго вліянія, силы, съ какою оно дѣйствовало и способа лѣченія. У слабыхъ, малочувствительныхъ людей и при слабо, но продолжительно дѣйствующихъ вліяніяхъ періодъ сей обнаруживается исподоводъ и бываетъ продолжителенъ; послѣ сильного и внезапнаго впечатлѣнія появляется вдругъ и бываетъ кратковременный. Такъ и сильные и необыкновенныя моральныя впечатлѣнія, какія бы они ни были, потрясаютъ нашъ духъ, а менѣе необыкновенныя оказываютъ на него только слабое впечатлѣніе.

20. Нерѣдко симъ періодомъ и оканчивается первая половина болѣзни, а особливо при употребленіи противовоспалительныхъ ей средствъ.

21. Какъ въ семъ періодѣ спораждаетъ общая система нашего организма, служащая основаніемъ другимъ системамъ и органамъ, по посему и горячки въ началѣ сходны между собою, также какъ и первоначальные зародыши животнохъ бывають болѣе или менѣе сходны между собою. Но иногда уже въ семъ періодѣ можно видѣть особенное свойство горячки, т. е., если жизнь какой либо системы или какого органа уже напередъ того была повреждена, либо случайное вліяніе дѣйствовало преимущественно на какую либо систему или органъ. Такъ иногда уже въ семъ періодѣ появляются гастрическіе или нервные припадки.

22. Впечатлѣніе случайнаго вліянія на организмъ и произведенное имъ необыкновенное состояніе органической дѣятельности составляютъ для нервной системы раздраженіе, въ слѣдствіе котораго она сильнѣе обыкновеннаго возбуждаетъ жизнедѣятельность другихъ органовъ, а особливо кровообразованія \*),

\*) Сіе возвышеніе жизнедѣятельности обыкновенно

и это составляет переходъ горячки во второй періодъ, наступленіе котораго обнаруживается болѣе или менѣе сильнымъ ознобомъ (frigus, horror). Во время озноба органическая дѣятельность бываетъ въ шомъ случаѣ самая мѣньшая, опъ чего объемъ тѣла примѣпно уменьшается, кожа сморщивается, дѣлается жесткою (cutis anserina), еще болѣе блѣдною, губы и ногти синѣютъ, пульсъ еще болѣе сжимается, но бываетъ частый. Появленію озноба предшествуетъ попятіе и зѣвота, которыя также зависятъ опъ недѣятельности высшей части нервной системы.

23. Существенныя явленія и припадки второго періода горячки суть тѣ, кои за-

---

венно приписываютъ цѣлительной силѣ природы, которая противодействуетъ болѣзнетворной причинѣ, — представленіе весьма неопредѣленное и подающее поводъ къ неправильному лѣченію. Правильнѣе сказать: возвышеніе жизнедѣятельности есть необходимое слѣдствіе раздраженія, произведеннаго случайнымъ вліяніемъ; мышца не можетъ не сокращаться, нервъ не можетъ не чувствовать боли, когда ихъ раздражаютъ.

висяпть онъ возвышенной дѣятельности  
 кровеносной системы, а именно: пульсъ  
 постепенно возвышается, дѣлается пол-  
 нымъ, крѣпкимъ, оставаясь частымъ; ды-  
 ханіе болѣе, крѣпче, выдыхаемый воздухъ  
 болѣе или менѣе горячій, сухой; температура  
 тѣла также постепенно увеличивается,  
 а съ тѣмъ вмѣстѣ и объемъ тѣла; лице  
 полное, красное, глаза блестящи, сухи, су-  
 хость во рту, особливо языка, жажда, же-  
 ланіе кислѣватого, прохлаждающаго пипья,  
 отвращеніе отъ пищи, особливо животной;  
 моча темноцвѣтная, въ маломъ количествѣ,  
 безъ осадка (ur. cruda); запоръ на низъ; боль  
 и тяжесть головы, глаза къ свѣту чув-  
 ствительны, шумъ и звонъ въ ушахъ, без-  
 покойство больного, непріятное чувство подъ  
 ложечкою, тяжесть членовъ меньше, но  
 нѣтъ охоты къ движенію. Пущенная въ  
 семь періодъ изъ вены кровь бываетъ гу-  
 стая, темноцвѣтная, скоро свѣрживается  
 и образуетъ большой, но некрѣпкій свер-  
 тлокъ (placenta sanguinis), съ малымъ ко-  
 личествомъ сыворотки; въ теплоѣ скоро  
 загнивается.

24. Въ семь періодъ болѣзнь принимаецѣ болѣе особенный видъ, опредѣляемый преимущественнымъ спраданиемъ особливаго какого либо органа, и къ исчисленнымъ общимъ припадкамъ присоединяются особенные, зависящіе отъ такого преимущественнаго спраданиа, на прим: головы, груди, брюшныхъ органовъ, кожи.

25. Степень жестокости и время продолженія припадковъ сего періода бывають различны и большею частію находятся въ обратномъ содержаніи, ш. е., чѣмъ сильнѣе припадки, шѣмъ скорѣе они измѣняются, и на оборотъ. Различіе сіе зависитъ отъ нѣхъ же обстоятельствъ, о которыхъ мы упомянули при первомъ періодѣ. Въ лихорадкахъ періодъ сей оканчивается въ нѣсколько часовъ; въ воспалительной горячкѣ (згносна) онъ продолжается 4 - 7 дней.

26. Симъ періодомъ можетъ окончиться первая половина горячки, и въ такомъ случаѣ появляются увеличенныя испражненія поща, мочи или кровопеченіе, какъ такіа, чрезъ кои преимущественно выводятся изъ шѣла произведеніе усиленнаго кровопворенія (азотъ). Если же болѣзненная дѣятельность



не ограничивается сими системами нашего организма, но простирается далѣе, по наконецъ появляющіяся признаки спаданія высшей сферы нервной системы, служащей наружнымъ чувствамъ и душевнымъ способностямъ, что составляетъ претѣмъ естественный періодъ горячки, или нервный (stad. nervosum).

Я не буду подробно и обстоятельно описывать всѣхъ сихъ припадковъ, но кратко вычислю только главнѣйшіе изъ оныхъ, считая это достаточнымъ для моего намеренія: показать сущность патологическаго состоянія въ семь періодъ горячки.

27. Съ приближеніемъ сего періода признаки общаго воспалительнаго состоянія постепенно уменьшаются, температура всего тѣла понижается, но кожа остается сухою, а голова горячею; объемъ тѣла уменьшается, дыханіе совершается рѣже, тише, со вздохами; пульсъ нѣсколько теряетъ свою крѣпость, оставаясь иногда полнымъ, иногда сжатымъ, но обыкновенно частымъ; моча теряетъ признаки, показывающіе воспалительное состояніе, дѣлается безцвѣтною, непостоянно мутною; испражненіе низомъ, особ-

ливо въ дальнѣйшемъ продолженіи сего періода, бываетъ также неправильное, пониженіе, но запоръ на низъ. Особливо частіи головы, какъ получающія свой нервъ отъ нервовъ мозговыхъ, представляютъ важныя и разительныя признаки: поелику въ сіе время болѣзненная дѣятельность сосредоточивается въ мозгъ и его угнетается. Всѣ черты лица больного выражаютъ равнодушіе; глаза сухи, пучки, къ свѣту весьма чувствительны, слухъ тупой, языкъ и губы очень сухія, но больной по причинѣ нечувствительности не жалуется на жажду; больной забывчивъ, склоненъ ко сну, но крѣпко не засыпаетъ, а во время сна безпрестанно грызетъ (*delirium mite*), или шевелитъ руками (*carptio flocculorum, crocidismus*). Въ дальнѣйшемъ продолженіи сего періода дѣятельность въ прочихъ системахъ еще болѣе упадаетъ, пульсъ дѣлается слабымъ, неправильнымъ, конечности холодны, появляется подергиваніе сухихъ жилъ, икота, но больной какъ будто приходитъ въ чувство, понимаетъ все вокругъ его происходящее, отвѣчаетъ на вопросы, если не глухъ, хочетъ встать съ постели, говоритъ, что онъ здоровъ (som-

ambulismus), или впадаетъ въ глубокий, безпробудный сонъ, безъ бреда (сорор).

28. Теперь болѣзненная дѣятельность прошла уже весь организмъ, опъ перепончатыхъ органовъ до мякотнаго существа мозга, и какъ уже нѣтъ болѣе никакой системы, на которую она еще могла бы распространиться, то болѣзнь или оканчивается смертію, или переходить во вторую половину своего теченія,—начинается выздоровленіе.

29. Во второй половинѣ своего теченія болѣзнь проходитъ тѣже періоды, только обратнымъ порядкомъ, не такъ явственно и скоро.

30. Въ четвертомъ періодѣ обыкновенно сперва уменьшаются нервныя припадки, больной приходитъ въ себя, какъ будто изъ глубокаго сна или опьяненія, дѣлается внимательнымъ къ своему состоянію и къ окружающимъ его предметамъ, жалуется на разные боли, беспокоится о своей болѣзни; бредъ прекращается иногда вдругъ, а иногда постепенно. Вообще въ то же время появляются признаки выздоровленія и въ другихъ системахъ (особливо полость рта и носа по вышеупомянутой причинѣ начинаютъ увлажняться);

большую частью однако они бываютъ не постоянны, малозначительны и нередко можно бываетъ различить еще слѣдующіе два періода.

31. Пятый періодъ противоположенъ второму; здѣсь уничтожаются болѣзненные признаки кровотоверенія. Пульсъ дѣлается свободнымъ, мягкимъ, ровнымъ, хотя бываетъ слабый и по причинѣ возвышенной чувствительности частый; температура тела приходитъ въ естественное состояніе; дыханіе совершается тихо, свободно, полость рта и носа болѣе и болѣе увлажняется, жажда прекращается, кожа мягкая, моча испражняется болѣе мутная, съ осадками.

32. Въ шестомъ періодѣ уничтожаются болѣзненные признаки органовъ пищеваренія и отдѣленій. Языкъ очищается и дѣлается постоянно влажнымъ, болѣе или менѣе обильное испражненіе низомъ слѣдуетъ само собою, испарина кожи возстановляется, позывъ на ѣду увеличивается до степени голода. Наконецъ общее чувство приходитъ въ естественное состояніе, только бываетъ возвышенно; умственные способности не тревожатся болѣзненными ощущеніями, и чело-

вѣкъ чувствуетъ себя какъ бы перерожденнымъ какъ въ физическомъ, такъ и психическомъ отношеніи.

33. Причины горячекъ можно найти болѣе или менѣе обстоятельно вычисленными во всякомъ сочиненіи о семъ предметѣ; посему я не буду ихъ разсмапривать подробно, а только представлю нѣкоторыя общія объ нихъ замѣчанія, служащія къ подтвержденію и объясненію предложеннаго понятія о главномъ патологическомъ условіи горячекъ.

34. Всѣ причины (случайныя) горячекъ можно раздѣлить на: 1. механико-химическія: раны, ушибы, ѣдкія вещества, обремененіе желудка пищею и проч.; 2. динамическія: холодъ, жаръ, движенія духа и плѣла, спиртные напитки и другія возбуждающія вещества; 3. космо-органическія: повѣтрія (*miasmata*), состояніе воздуха (*constitutio aeris*), заразы (*contagia*) и животныя яды (*venena animalium*).

35. Многія изъ сихъ причинъ, на прим.: холодъ, жаръ, движенія духа и плѣла, простыя раненія, дѣйствуютъ очевидно однимъ впечатлѣніемъ на нервы: поелику при нихъ нѣтъ ничего такого, что могло бы дѣйство-

Часть XV. N. 1.

5

вашь другимъ способомъ, на прим.: войши въ организмъ или иначе измѣнить качество влаги организма или плотныхъ частей онаго. Мышнѣ, что „жаръ и холодъ дѣйствуютъ, сгущая или расширяя влаги нашего тѣла, сжимая или растягивая плотныя его части“, не споимъ опроверженія. Организмъ не глина; пока жизнедѣятельность его не повреждена, онъ удерживаетъ свою температуру, и даже вышняя температура (даже  $+ 30^{\circ}$  Реом. и болѣе), только при другихъ обстоятельствахъ (преимущественно опредѣляющихъ состояніе его чувствительности), для него безвредна.

36. Также не трудно понять, что и нѣкоторыя другія причины горячекъ дѣйствуютъ такимъ же образомъ, т. е., вліяніемъ на нервную систему, на прим.: пища, спиртные напитки, дѣлущія, наркотическія вещества: поелику даже пища, или тоже количество оной, не только для другаго человека (имѣющаго другое состояніе чувствительности нервовъ), но и для того же самаго человека, только при другихъ обстоятельствахъ (при другомъ состояніи его нервовъ) безвредна. Известно, что къ спир-

нымъ напиткамъ, наркотическимъ и другимъ на непривыкшаго вредно дѣйствующимъ веществамъ поспешенно можно привыкнуть до значительной степени. А главное, если не единственное условіе, привычка, безъ сомнѣнія, состоить въ нервахъ.

37. Вдкія вещества возбуждаютъ горячку чрезъ мѣстное раздраженіе. И къ нимъ можно поспешенно привыкнуть до значительной степени, какъ это извѣстно о мышьякѣ, сулемѣ (охум. hydrarg.).

38. Не только древніе Гуморальные Патологи, но и новѣйшіе Эклектики полагаютъ, что въ заразахъ, повѣтріяхъ и рѣшительныхъ испражненіяхъ они имѣютъ несомнѣнное доказательство матеріальной причины по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ горячекъ. *Крейсигъ* говоритъ, что „въ горячкахъ съ сынами мы явственнѣе замѣчаемъ присущіе болѣзнетворнаго начала въ шлѣ; что въ сихъ горячкахъ инородное вещество умножается въ шлѣ почти предъ нашими глазами и наконецъ при сильныхъ припадкахъ часто извергается“ \*); и нѣсколько далѣе, „еще явственнѣе видимъ мы связь между го-

\*) Прив. соч. стр. 377.

раткою и неправильнымъ смѣщеніемъ крови въ пѣхъ случаяхъ, въ коихъ послѣ крипическаго переноса или послѣ скоро воспослѣдовавшаго нагноенія горячка потчасъ прекращается“ \*). Кромѣ того, что мнѣніе сіе не подтверждается никакими доспапчными наблюденіями и не основывается ни на какомъ фізіологическомъ законѣ, матеріальное дѣйствіе заразъ въ произведеніи горячки опровергается наипаче слѣдующими обстоятельствомъ. 1. Если бы зараза всасывалась, то болѣзнь прежде всего должна бы обнаружиться на мѣстѣ всасыванія или во всасывающихъ сосудахъ, чего въ отношеніи къ заразительнымъ горячкамъ (оспа, корь, скарлатина, чума, typhus), сколько мнѣ извѣстно, наблюденіе не подтверждаетъ. 2. Дѣйствіе заразы иногда обнаруживается такъ скоро, что никакъ не лѣзя полагать, чтобы она могла въ столь короткое время пройди всасывающіе сосуды и, смѣшавшись съ кровію, разнеслись по всему тѣлу. 3. Кровь спраждающихъ заразительною болѣзнію незара-

---

\*) Тамъ же. Также см. Richter's specielle Therapie. 1. Bd. стр. 51. Dictionnaire des sciences medicales. T. 6. стр. 308.



зисшельна. 4. Зараза и повѣтріе поражають не всякаго и не во всякое время, но перебу- ють, какъ говорятъ, расположенія къ вос- пріятію оной; условіе же сего расположенія, по всей вѣроятности, состоишь преимуще- ственно въ чувствительности \*). 5. Труд- но повѣрить, чтобы малѣйшее количество заразы, приставшее къ тѣлу при самомъ легкомъ прикосновеніи къ зараженному тѣ- лу, могло распроспраниться на всю массу нашего тѣла и проникнуть во всѣ его жид- кія и плотныя части. Но такая малѣй- шая, для чувствъ нашихъ непримѣтная ча- стица заразительнаго вещества можетъ за- разить весьма большое число людей. Такой дѣлимости матеріи даже вообразить не- лзя. 6. Заразительныя горячки, даже са- мая чума, въ началѣ своемъ могутъ быть прерваны средствами, неимѣющими никакой прошивузаразительной силы, чему ниже при- ведемъ доказательства. Изъ сихъ же самыхъ обстоятельствъ мнѣ кажется весьма вѣ- роятнымъ, что заразы и повѣтрія дѣйству- ютъ, подобно другимъ причинамъ, производя-

---

\*) См. В. М. Ж. Ч. XIV. стр. 207.

щимъ горячки, однимъ впечатлѣніемъ на нервы. Мнѣніе сіе согласно съ фізіологическимъ закономъ, что *всѣ дѣйствія организма управляются вліяніемъ нервовъ и не могутъ измѣниться безъ измѣненія сего вліянія* \*).

39. Отъ чего зависить особенное дѣйствіе разныхъ повѣспрій и заразъ на разныя системы и органы, еще неизвѣстно.

40. Касательно значенія шакъ называемыхъ рѣшипельныхъ испражнений я и пе-

\*) Можно сказать, что нервная система и доселѣ еще надлежаще не уважена въ Физіологіи и Патологіи и въ особенности не опредѣлено вліяніе разныхъ частей оной на разныя оппразвленія нашего тѣла. Нервы даютъ жизнь, дѣятельность всему организму и каждой его части; другія органическія шкани: волокна, перепонки, сосуды, суть только орудія, приводимыя нервами въ дѣятельность. Подробное опредѣленіе нервовъ, служащихъ каждому оппразвленію и ихъ отношенія къ разнымъ вліяніямъ много послужило бы къ усовершенствованію теоретической и практической Медицины. Новѣйшія изслѣдованія нѣкоторыхъ Французскихъ и Англійскихъ Физіологовъ (см. В. М. Ж. Ч. XII. стр. 207.) въ семъ отношеніи весьма важны и достойны подражанія.

перь почтишаю справедливымъ сказанное мною о томъ въ Семіотикѣ \*).

41. Такимъ образомъ, сколько я судить могу, не только изъ явленій, но и изъ причинъ горячекъ слѣдуетъ заключить, что первоначальное и главное условіе сихъ болѣзней должно состоять въ измѣненіи дѣятельности нервовъ органической жизни и что всѣ прочія перемѣны, происходящія при томъ въ организмѣ, все разстройство общихъ и частныхъ оппавленій оной есть слѣдствіе сего измѣненія. А посему предложенное мною понятіе о сущности горячекъ не только согласно съ теоріею, но и подтверждается опытносшію. Остаеися разсмотръѣть, согласно ли сіе понятіе съ практическими наблюденіями и руководствуеиъ ли оно къ правильнѣйшему лѣченію сихъ болѣзней.

42. Удивительно, что многіе писатели, говоря о горячкахъ вообще, описываютъ ихъ періоды (которыя опредѣляютъ, впрочемъ безъ всякаго основанія, по гипотетическому понятію), а при изложеніи лѣченія

\*) Общая Патологическая Семіотика П. Чаруковскаго. С. Петербургъ. 1825. стр. 29. и слѣд.

оспавляють сей порядокъ, и изъ многихъ лежащихъ предо мною Часпныхъ Терапій \*) шолько въ сочиненіи *Рихтера* \*\*) нахожу я замѣчанія о лѣченіи перваго періода горячекъ. Вошъ главное его правило. „Въ семь періодъ наспояще (eigentlich) не должно ничего предпринимать; но какъ больной желяетъ имѣть лѣкарство, то ему можно прописать что нибудь пригодное на всякій случай.“ Правилу сему слѣдуетъ большая часть пракпиковъ, особливо почитающихъ *autocratiam naturæ*, и чрезъ шо упускаетъ единспвенное время, въ копорое можно прервать болѣзнь. Но послѣ присовокупляетъ: „безъ сомнѣнія сюда (къ средспвамъ пригоднымъ на всякій случай!) принадлежатъ и рвошныя, не для испражненія нечиспощъ, но по причинѣ ихъ дѣйствія на

---

\*) Burserius, *Institutiones Medicine practicæ*. Lipsiæ. 1787.

Hecker, *Kunst die Krankheiten der Menschen zu heilen*. Erfurt. 1809.

Reil, *über die Erkenntniss und Cur der Fieber*. Halle. 1804.

Hildebrand, *Institutiones Medicæ*, Viennæ Austriæ. 1816.

Berends, *Vorlesungen über practische Arzneiwissenschaft*. Berlin. 1827.

\*\*) Richter, *specielle Therapie*. Wien. 1817.

всѣ отдѣленія и испражненія.“ Далѣе (спр. 83) говоритъ, что хина и опій при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ (коихъ почти не опредѣляетъ) могутъ прервать горячку; что (спр. 85) сильными попогонными можно прекратить дѣйствіе заразы на организмъ по воспріятіи оной. *Прингелъ* часто видѣлъ, что рвотныя прерывали гнилую заразительную горячку \*), а *Грегори* утверждаетъ, что рвотнымъ и вскорѣ за тѣмъ принятымъ опіемъ съ камфорою можно прервать заразительную горячку послѣ появленія первыхъ признаковъ оной \*\*). *Ведекиндъ* \*\*\*)) и *Роумаръ* \*\*\*\*)) похваляютъ опій для прерванія горячекъ. *Самойловичъ* полагаетъ, что преніе льдомъ можетъ прервать самую чуму. Въ ч. X. спр. 28 В. М. Журнала приводятся примѣры, что сія ужасная болѣзнь была прервана холодною росой и купаньемъ въ морской водѣ; а одинъ Врачъ въ началѣ сей же болѣзни съ успѣхомъ употреблялъ рвотныя, наперсочную праву и синильную кислоту въ

---

\*) Pringle, Feldkrankheiten. стр. 220.

\*\*) Richter. пр. соч.

\*\*\*)) Тамъ же.

\*\*\*\*)) Тамъ же.

большихъ приемахъ \*). *Фрелихъ* много приводилъ примѣровъ нервной заразной лихорадки и скарлатины, въ началѣ прерванныхъ обливаніями холодною водою \*\*). Примѣры лихорадокъ и горячекъ, въ самомъ началѣ прерванныхъ испугомъ, внезапнымъ обливаніемъ холодною водою, значительнымъ приемомъ спиртной какой нибудь жидкости, извѣсны и простому народу. Даже суевѣрные средства (*amuleta*), вѣроятно, иногда оказывались дѣйствительными; иначе они не вошли бы въ употребленіе. О лихорадкахъ извѣстно кромѣ того, что онѣ прерываются перевязываніемъ членовъ, кровопусканіемъ, моксою, испанскою мушкою и тому подобными скоро и сильно дѣйствующими средствами.

43. Можно ли думать, чтобы споль различныхъ средствъ прерывали горячки особенными силами, чтобы они производили сіе дѣйствіе уничтожая въ тѣлѣ заразу или

\*) *Magazin d. ausl. Litteratur d. gesammt. Heilkunde.* 1829. Juli, August.

\*\*) *Abhandlung über die kräftige, sichere und schnelle Wirkung der Uebergießungen oder Bäder von kaltem oder lauwarmen Wasser* и проч. Von A. Frölich. Wien. 1820.

другую болѣзнетворную матерію? Многія изъ нихъ даже не проникають въ организмъ, на прим: холодная вода, испугъ, рвотное; другія не имѣють никакой особенной силы, а только возбуждають или успокаивають нервную систему, на прим: опій, спиртные напитки. Всѣ сіи средства сходны между собою только въ томъ, что всѣ они производятъ сильное впечатлѣніе на нервную систему и тѣмъ уничтожаютъ впечатлѣніе, произведенное на нихъ случайною причиною болѣзни. Такъ волненіе мыслей скоро прерывается какимъ либо необыкновеннымъ впечатлѣніемъ на умъ; такъ волненіе народа можно скоро успокоить, обративъ его вниманіе на какойнибудь разительный предметъ. Это не риторическое сравненіе, но тоже, только въ другомъ видѣ.

44. Мой способъ лѣченія горячекъ въ семь періодъ состоить въ слѣдующемъ. Я совѣтую больному побольше напиться горячаго чаю или бузиннаго цвѣта, прибавляя на чашку или стаканъ по ложкѣ и по двѣ мадеры, рому или другой спиртной жидкости, покрывшись тепло нѣсколькими одеялами или шубами (съ головою) и лежа въ постель до тѣхъ поръ,

пока дыханіе сдѣлается труднымъ, причемъ обыкновенно начинается выпуканіе потъ. Въ сіе время, для облегченія дыханія, больной опкрываетъ голову, а прочее тѣло остается покрытымъ по прежнему, пока выступитъ повсеместивенный обильный потъ. Послѣ сего больной перемѣняетъ бѣлье и покрывается умѣренно.

— 45. Способъ сей испыталъ я неоднократно надъ собою и надъ другими въ премногихъ случаяхъ, и не помню ниодного, гдѣ оный бы не оказался успѣшнымъ, если только больной имѣлъ шерпѣніе подолѣе ослапаться покрытымъ съ головою. Тягоспѣ дыханія и тоска присемъ, кажется, также имѣющъ вліяніе на прерваніе болѣзни. Людямъ, совсѣмъ немогущимъ употреблять спиртныхъ напишковъ, вмѣсто вина или рому прописывалъ я унцію или двѣ *acetat. ammon. liquidі* съ нѣсколькими каплями *vinі ammon.* принимаешь такимъ же образомъ. Ножная ванна предъ чаемъ еще болѣе ускоряетъ и усиливаетъ его дѣйствіе.

46. Гдѣ есть признаки желудочныхъ нечиспотъ, тамъ сперва нужно дать рвошное, а спустя нѣсколько часовъ (4—8), употре-



битьъ вышеказанный способъ. При несвободномъ испражненіи низомъ также сперва нужно очистиить кишки проноснымъ, на прим: изъ *submur. hydrarg.* и *pulv. rad. c. jalappæ*, либо *infuso sennæ salino*, и потомъ поступить какъ послѣ рвотнаго. При жидкомъ испражненіи низомъ послѣ спакана чаю, безъ спиртной жидкости, унцію или двѣ, смотря по тѣлосложенію и темпераменту больного, *haustus sudoriferi*, Ph. *Castr. Ruth.* кажется полезнѣе, равно какъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сперва нужно бываетъ дать рвотное или слабительное.

47. Нѣкоторые Врачи лѣченіе всякой горячки, даже въ дальнѣйшемъ періодѣ, начинаютъ рвотнымъ; но я и въ семъ періодѣ не употребляю его безъ особливаго къ тому показанія: поелику средства сего рода вообще непріятны для больныхъ, и описанный способъ лѣченія почти всегда соотвѣтствовалъ моему желанію, если только онъ былъ употребленъ въ надлежащее время, которое въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма кратко, а въ другихъ довольно продолжительно.

48. Кровопусканіе, говоря вообще, въ семъ періодѣ горячекъ, бесполезно, если не вред-

но \*): поелику главное патологическое условие не состоитъ въ возвышенной дѣятельности кровеносной системы,—въ усиленномъ кровообращеніи. Ослабивъ организмъ, оно конечно ослабитъ и жестокость болѣзни; но за то сдѣлаетъ ее продолжительнѣйшею: ибо для преодоленія болѣзни также нужна надлежащая крѣпость организма. У людей крѣпкихъ и полнокровныхъ оно не сдѣлаетъ значительнаго вреда, и даже полезно, а при припадкѣ крови къ особливимъ органамъ уже и теперь необходимо. Особливо надлежитъ смотрѣть на свойство эпидеміи. Быть можетъ, что спрашныя горячки жаркихъ климатовъ (чума, желтая горячка, холера) въ самомъ своемъ началѣ преобладаютъ кровоизлияніемъ. Впрочемъ извѣстно, что первый періодъ въ сихъ горячкахъ обыкновенно бываетъ весьма краткій. Сверхъ сего надобно помнить, что привычное полнокровіе (отъ кровоизлиянія) нередко возбуждаетъ припадки, подобные припадкамъ перваго періода горячекъ, но ихъ большею частію не лзя уничтожить безъ кровоизлиянія.

---

\*) См. Burserius. Прив. соч. стр. 116.

49. Испугъ и внезапное обливаніе холодною водою (соединяющее въ себѣ дѣйствіе испуга и холода) ненадежны и могутъ имѣть опасныя послѣдствія.

50. Слабительныя въ семь періодъ нужны только для возбужденія надлежащаго испражненія низомъ, т. е., въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ оно недоспапочно; употреблять ихъ для прерванія самой болѣзни не слѣдуетъ, да и съ опытностію было бы несообразно. Впечатлѣніе, ими производимое, ограничивается только однимъ кишечнымъ каналомъ, развѣ они будутъ употребляемы долго и сильныя, такъ что производятъ мѣстный недугъ кишекъ, или значительную потерю влаги. Но ни то, ни другое не можетъ имѣть полезнаго вліянія на горячку, а только сдѣлаетъ ее болѣе сложною и продолжительною.

51. Что сущность вѣселаго нами описаннаго періода горячки должна заключаться въ воспалительномъ процессѣ, въ усиленномъ кровообразованіи, сего теперъ, кажется, никто отрицать не спаетъ. Слѣдовательно лѣченіе его должно быть проливовоспалительное. Какъ ни правильно сіе заключеніе, но

многіе Врачи еще и теперъ его не признають, и нерѣдко уже въ семь періодъ употребляютъ средства возбуждающія и крѣпительныя. Это есть слѣдствіе частію гибельнаго ученія объ аспеническихъ воспаленіяхъ, частію предразсудковъ. Больной не можетъ поднять ни руки, ни ноги и нѣсколько дней уже ничего не ѣтъ; слѣдовательно онъ слабъ и надобно его подкрѣпить. Для достиженія сего намѣренія, не смотря на жгучій жаръ кожи, на крайнюю сухость губъ и языка и проч., даютъ ему горячительныя возбуждающія средства, вино, бульонъ; но вмѣсто подкрѣпленія слабость усиливается и больной изнемогаетъ. Тогда говорятъ: болѣзнь была такъ жестока, что всѣ возможныя средства остались недействительными.

52. Поелику степень воспалительнаго состоянія бываетъ весьма различна, то и употребляемые средства должны быть различны, касательно ихъ дѣйствительности. Къ слабѣйшимъ проливовоспалительнымъ средствамъ принадлежатъ, какъ извѣстно, *acetas et citras potassae* (Polio Riveri), *supertartar. potassae*, распишительныя кислоты; къ силь-

нѣйшимъ nitras potassæ, кровопусканіе, холодный воздухъ, холодныя ванны, обмыванія и обливанія холодною водою.

53. Кровопусканіе въ семь періодъ есть одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ, даже въ случаяхъ не очень жеспокихъ; оно весьма сократило бы продолженіе горячки; но вліяніе его на будущее здоровье больного еще доспашочно не опредѣлено; непочитающіе себя опасно больными неохотно оному подвергаются, и легчайшія степени горячки можно преодолѣть другими средствами. Посему употребленіе кровопусканія въ горячкахъ надлежитъ ограничить только пруднѣйшими случаями или особеннымъ эпидемическимъ ихъ свойствомъ, пребующимъ сей операціи. Многіе назначаютъ кровопусканіе въ горячкахъ только у людей крѣпкаго сложенія, при полномъ, крѣпкомъ пульсѣ, красномъ лицѣ и другихъ признакахъ большаго развитія кровеносной системы; но оно имѣетъ мѣсто и у людей слабыхъ, не только при сильныхъ воспалительныхъ припадкахъ, но и при маломъ пульсѣ, если только оный оказываетъ значительное сопротивленіе при сжиманіи, дыханіе несвободное, чувства болѣе

или менѣе попомнены и находятся другіе признаки обремененія внутреннихъ органовъ кровію, и можно сказать, что оно въ послѣднихъ случаяхъ бываетъ чаще и болѣе необходимо, нежели въ первомъ.

54. Дѣйствія обливаній холодною водою я не испыталь. Холодные ванны и обмыванія, употребленныя по совершенномъ развитіи сего періода, дѣйствовали превосходно; иногда сами больные желали повторенія оныхъ. Нужнѣйшія сюда относящіяся правила изложены въ I части (спр. 355 и слѣд.) сего Журнала. Къ головѣ, смотря по степени жара, боли или тяжести оной, прикладываютъ снѣгъ, ледъ, либо уксусъ съ водою.

55. Поелику въ семь періодъ часто обнаруживается особенное раздраженіе брюшныхъ органовъ (10) и головы, то припущеніе пиявокъ къ надбрюшной спороны и головѣ также часто бываетъ необходимо. Нѣкоторые почищаютъ дѣйствительнѣйшимъ припускамъ пиявки по споронамъ шеи. Имѣетъ ли особенную пользу припущеніе пиявокъ къ заднему проходу, столь часто употребляемое *Бруссидами*, я не знаю.

56. Прохладная, впрочемъ степени болѣзни соотвѣтствующая температура въ семь періодѣ горячекъ есть необходимое условіе лѣченія. Предубѣжденіе содержать больного тепло, дабы онъ не проспудился, сколько не основательно, сполько и вредно. Въ Англійскихъ госпиталяхъ въ комнапахъ горячечныхъ и зимою (при 8 и болѣе градусахъ холода) окна всякій день по нѣскольку часовъ (если не весь день?) оспаются опкрытыми. Конечно это вредно для пѣхъ, у коихъ горячка достигла второй половины \*); но Англичане выводящъ свои правила изъ наблюденій, и безъ сомнѣнія они нашли, что холодная температура для больныхъ сего рода вообще болѣе полезна, нежели теплая.

57. Обильное, прохлаждающее питье не сполько приноситъ больнымъ удовольствіе, но вмѣстѣ служишь и лѣкарствомъ; оно унимаетъ жаръ и вознаграждаетъ недоспа-

---

\*) Въ Единбургѣ видѣлъ я несчастный исходъ воспалительной - ревматической горячки, впоследствии, по всему вѣроятію, отъ того, что больной и по выступленіи обильного, повсемѣстнаго пота оспавался въ той же холодной комнапѣ.

шокъ жидкости въ организмъ, уничтожаемой возвышеннымъ кровошвореніемъ. Чистая вода или хорошій квасъ, вода съ прибавленіемъ какой нибудь распищельной кислоты или виннаго камня и сахару или меду едва ли не равно полезны. Температура пищи можетъ быть такая, какая нравится больному. И въ семъ отношеніи опасность проспуды неосновательна; я часто видѣлъ, что больные глотали кусочки льда, приложеннаго имъ къ головѣ, съ явною пользою.

58. Достаточное испражненіе низомъ въ семъ періодѣ необходимо; но жидкія, водянистыя испражненія вредны; они показывають болѣзненное раздраженіе кишекъ и опнимають у организма часть жидкости, въ сіе время для него столь нужной.

59. Въ претъемъ періодѣ сущность горячки состоить поже въ воспалительномъ дѣйствіи, но только болѣе сосредоточившемся въ мозгѣ, какъ это доказываютъ вскрытія умершихъ въ семъ періодѣ, представляющія выпотѣніе сыворопоточной жидкости въ желудочкахъ мозга и между его оболочками, накопленіе крови во внутреннихъ сосудахъ головы и измѣненія самаго существа мозга.



Посему и сего періода лѣченіе должно бытъ прошивувоспалительное, только измѣненное, сообразно измѣненію болѣзни.

60. Общее кровопусканіе, какъ прошивувоспалительное средство, по совершенномъ развитіи сего періода, мѣста не имѣетъ: поелику общій воспалительный процессъ тогда прекращается; но при большомъ угнетеніи мозга, не смотря на слабый, неправильный пульсъ, холодныя конечности, иногда смѣло предпринятое кровопусканіе можетъ спасти больного. Только потребна доспапточная опытность и большое вниманіе, чѣобы различить угнетенное состояніе мозга отъ изнеможенія силъ (*collapsus virium*). Въ послѣднемъ случаѣ кровопусканіе, разумѣется, ускорить погибель больного.

61. Пока продолжается бредъ или безчувствіе, голова горяча, глаза хотя нѣсколько налипы и надбрюшная сторона чувствительна, припущеніе пиявокъ къ головѣ и животу должно составлять главное врачебное пособіе, которое, смотря по обстоятельству, нужно и повторить.

62. До тѣхъ же поръ нужно продолжати и холодныя примочки къ головѣ.

63. Когда жаръ пѣла начнеть уменьшаться, по температуре комнаты надлежитъ возвышать до 14 или 15° Реом.

64. Обмыванъ больного теплою водою съ уксусомъ или спиртомъ раза два въ день и болѣе, или посадишь его въ теплую ванну, продолжая припомъ холодныя примочки къ головѣ.

65. Прикладывать горчичники къ подошвамъ, икрамъ и проч.; поставивъ испанскую мушку между лопатками. Прикладываніе мушекъ къ запялку, кажется, увеличиваетъ раздраженіе головы. Я видалъ, что прикладывали мушки къ самой головѣ, по сбришии волосъ, но не замѣшилъ отъ того пользы.

66. Слабительныя въ семь періодъ болѣе нужны, нежели въ какомъ либо другомъ, не только для испражненія нечистотъ, но и для отвлеченія влаги отъ головы, чрезъ возбужденіе болѣе дѣятельности въ брюшныхъ сосудахъ. Опасеніе, что слабительныя увеличатъ слабость, выдуманно, а не выведено изъ наблюденій. Только не надобно почитать ихъ главными либо даже единственными средствами лѣченія, какъ многіе думаютъ о способѣ лѣченія славнаго Единбург-

скаго Доктора *Гамильтона*. Полгода внимательно наблюдалъ я его лѣченіе въ пампшней больницѣ, и могу сказать, что ни въ одномъ изъ видѣнныхъ мною славнѣйшихъ городовъ Европы не видалъ я Врача, который имѣлъ бы столь вѣрный пракпическій взглядъ или лѣчилъ бы такъ счастливо какъ онъ, равно и то, что онъ лѣчитъ не одними слабительными, какъ это впрочемъ можно видѣть и изъ его сочиненія \*).

67. Изъ прочихъ внутреннихъ средствъ, въ началѣ сего періода, т. е., пока еще температура всего тѣла возвышена, пульсъ нѣсколько крѣпкій, губы и языкъ сухи, надлежитъ продолжая легкія проптивувоспалительныя; но по мѣрѣ, какъ жѣлота тѣла начнутъ уменьшаться, пульсъ-ослабѣвать, отъ проптивувоспалительныхъ лѣкарствъ нужно поспешенно переходить къ возбуждающимъ, о чемъ подробно говоримъ здѣсь почтиаю излишнимъ.

68. Въ четвертомъ и пятомъ періодѣ нужно продолжая легкія возбуждающія сред-

---

\*) Observations on the utility and administration of purgative medicines in several diseases, by F. Hamilton. 5 Edition. Edinburgh, 1815.

ства и поддерживать достаточное испраж-  
нение низомъ; оппюдь однако онаго не усили-  
вать. При большой чувствительности боль-  
наго и безсонницъ пріемъ опія окажетъ су-  
щественную пользу. Діета больного въ про-  
долженіи сихъ періодовъ должна быть легкая;  
онъ долженъ избѣгать измѣненій темпера-  
туры и нечаянныхъ движеній духа: поелику  
чувствительность, въ первой половинѣ бо-  
лѣзни угнетенная, въ сіе время вообще бы-  
ваетъ возвышена.

69. Въ шестомъ періодѣ назначаются пи-  
щательная діета и крѣпительныя средства  
(roborantia tonica), между коими хина и хо-  
рошее, мало спириту содержащее вино зани-  
мають первое мѣсто.

---

### III.

## О ЖИЗНЕННЫХЪ ПРИПАСАХЪ ВЪ МЕДИКО-ПОЛИЦЕЙСКОМЪ ОТ- НОШЕНІИ.

(Продолженіе).

---

### О СВѢСТНЫХЪ ПРИПРАВАХЪ И ВОДЯНИСТЫХЪ НАПИТКАХЪ.

Употребительнѣйшія въ нашихъ стра-  
нахъ съѣстные приправы суть: 1) соль, 2)  
сахаръ, 3) пряности, 4) медъ, 5) выжа-  
тые масла, 6) уксусъ.

#### С О Л Ъ.

*Виды порчи и поддѣсей поваренной соли.*  
Они суть: 1). смѣшеніе соли съ большимъ  
количествомъ расплывающихся солей, каковы  
суть: солекислые, горькоземъ, извѣстѣ (hy-  
drochloras magnesiaе, calcis).

2) Примѣсъ гипсу (sulphas calcis).

- 3) Сѣрноокислой соды (sulphas sodae).
- 4) Желѣзной окиси (oxydum. ferri).
- 5) Мѣдной окиси (oxydum cupri).
- 6) Свинцовой окиси (oxydum plumbi).
- 7) Песку.

*Причины порчи и подмѣсей поваренной соли.* Всѣ вышеупомянутыя вещества супъ нерѣдко естественные недоспапки соли, либо же примѣшиваются чрезъ неосторожное очищеніе, вывариваніе, выпариваніе соли, чрезъ храненіе ея въ мешаллической посудѣ, особливо мѣдной или свинцовой. Известъ и песокъ подмѣшиваются иногда нарочно для умноженія вѣса соли.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей соли.* Для сего требуется прежде всего, чтобы поваренная соль не вываривалась и не выпаривалась въ мѣдныхъ и свинцовыхъ сковородахъ. Предложенныя Г-мъ *Лампадіусомъ* \*) деревянныя кадки для варки соли въ солонварняхъ могли бы, кажется, пособить сему недоспапкѣ соли. Писатели Врачебной Полиціи совѣщаютъ не употреблять никогда мѣдныхъ приборовъ для насыпанія, вымѣрива-

\*) Lampadius's Sammlung prakt. chem. Abhandl. В. 3.

нія и храненія соли. Во Франціи, съ 1783-го года, употребляются для вымѣриванія соли желѣзные лакированные приборы \*). Весьма нужно изслѣдовать предварительно всякую соль, о мѣстѣ полученія, очищенія и храненія коей не имѣется починныхъ свѣденій. Такъ извѣстно, что при всѣхъ равныхъ обстоятельствахъ каменная соль болѣе солонa, нежели всякая другая и что посему для соленія яствъ всегда требуется меньшее количество каменной, нежели всякой другой соли. Древніе Египетскіе жрецы, желая предохранить себя отъ проказы (lepra), не употребляли морской соли, получаемой изъ водъ Средиземнаго моря \*\*).

*Распознаваніе порчи и подмѣсей соли.*

Оно располагается обыкновенно по причинамъ самой порчи и подмѣсей и состоитъ:

*Во первыхъ, въ показаніи недостатка естественныхъ качествъ, каковыя суть:*

а) Бѣлый цвѣтъ, собственный чистый вкусъ.

---

\*) Scherf's Archiv der medizinischen Polizey. В. 3. стр. 268.

\*\*) Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Т. I. стр. 112.

б) Удоборастворимосць въ кипячей водѣ, безъ примѣльного осадка.

в) Водянистый растворъ ея опъ прибавленія чистаго или углекислаго попаша, или амміака, либо щавелекислаго амміака, не производитъ никакого осадка.

г) Чистая поваренная соль не сырѣетъ на открытомъ воздухѣ и, бывъ брошена на раскаленные уголья, распадается съ прескомъ.

*Во вторыхъ, въ показаніи присутствія постороннихъ качествъ, куда относятся:*

а) Зелено - голубоватый, вообще небѣлый цвѣтъ; острый, спягивающій, несобственный вкусъ.

б) Большая или меньшая нерастворимосць въ водѣ, съ осадками. различнаго качества.

в) Соль поваренная, смѣшанная съ расплывающимися на воздухѣ солями, припгиваетъ весьма скоро влажностъ изъ воздуха. Водянистый ея растворъ опъ прибавленія чистаго попаша или амміака, либо полууглекислаго попаша или амміака, либо щавелекислаго амміака производитъ бѣлый осадокъ \*). Эбер-

---

\*) Leçons de medecine legale, par M. Orfila. T. II. Paris. 1821. стр. 457.



*майеръ* \*) расплывающуюся соль кипяпить съ напромя, опть чего чистый горькоземъ или извесць осѣдають на дно сосуда въ видѣ бѣлаго порошка, удобораспворимаго въ кислотахъ.

г) Гипсъ и песокъ, смѣшанные съ поваренною солью, опкрываются чрезъ прибавленіе холодной воды, копорая распворитъ соль, а гипсъ и песокъ осѣдуть на дно, и узнаются такъ же, какъ и въ мукѣ (см. спашью о расшительной пищѣ).

Если бы случайно гипсъ соспавлялъ часть солянаго распвора, то таковый, распворъ опть прибавленія щавелекислаго амміака или солянокислаго барита производить бѣлый осадокъ. Первый осадокъ удобораспворимъ въ селишреной кислотѣ, а послѣдній не распворяется въ оной.

д) Примѣсъ сѣрнокислой соды узнается тѣмъ, что распворъ соли опть прибавленія солянокислаго барита дѣдаетъ бѣлый осадокъ. Сверхъ того, если распворъ сей вы-

---

\*\*) Tabellarische Uebersicht der Kennzeichen der Aechtheit und Güte der sämtlicher Arzneymittel,—v. J. Chr. Ebermayer. 4-te Aufl. Leipzig. 1820. Fol. стр. 108.

парить и остальную послѣ выпариванія довольно крѣпкую жидкость оставить въ по-  
коѣ, то прежде всего кристаллизуется  
сѣрноокислая сода.

е) Примѣсь желѣзной окиси узнается тѣмъ,  
что водяной растворъ соли будетъ слегка  
окрашенъ и отъ прибавленія насройки чер-  
нильныхъ орѣшковъ въ немъ происходитъ  
черный, а отъ прибавленія синильнокислаго  
попаша голубой осадокъ.

ж) Смѣшанная съ мѣдною окисью соль имѣ-  
етъ иногда зеленоватый цвѣтъ; водяной ея  
растворъ отъ прибавленія амміака получаетъ  
голубой цвѣтъ, а прибавленіе синильнокисла-  
го кали производитъ въ немъ осадокъ темно-  
каштановаго цвѣта.

з) Примѣсь свинцовой окиси узнается  
тѣмъ, что въ водяномъ растворѣ соли отъ  
прибавленія сѣрной кислоты происходитъ  
бѣлый осадокъ, а отъ прибавленія хроміе-  
кислаго попаша желтый осадокъ, наконецъ  
отъ прибавленія раствора сѣроводородныхъ  
соединеній (hydrosulphuretum) черный оса-  
докъ.

## САХАРЪ.

*Виды порти и подмѣсей сахара.* Сюда относятся:

1. Примѣсь извести (*terra calcarea*), иногда съ остатками бычачьей крови;
2. Примѣсь желѣзнаго купороса (*sulphas ferri*).
3. Свинцовой окиси \*).

*Притины порти и подмѣсей сахара.* Сюда относится, большею частію, неоспорожное или небрежное приготовление, очищеніе и храненіе сахара.

*Предотвращеніе порти и подмѣсей сахара.* Для сего требуется конечно тщательный надзоръ надъ сахарными заводами. Особливо чужестранный сахаръ, прежде нежели оный поступитъ въ продажу, не бесполезно освидѣтельствовать, а для приготвленія сахара не употреблять худовылуженной мепаллической, или худовымуравленной глиняной по-

---

\*) О подмѣси сей упоминается in *Transactions of medical Society of London*. Vol. I. стр. 1. (London. 1810). Также *Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneykunde*. B. VI. стр. 242. 1815.

судѣ. Въ Голландіи запрещено очищеніе сахарнаго сиропа бычачьею кровью \*).

*Распознаваніе порчи и подмѣсей сахара.*  
Оно основывается:

*Во первыхъ, на показаніи недостатка естественныхъ качествъ.* Чистый же сахаръ имѣеть слѣдующія качества:

- а) Бѣлый цвѣтъ, чистый, сладкій вкусъ.
- б) Сухость, плотность, звонкость, полупрозрачный и тонкозернистый составъ.
- в) Совершенная растворимость въ чистой водѣ, безъ осадка.
- г) Водяной растворъ сей долженъ быть прозраченъ, отъ вкапливанія сѣрной кислоты не мутится и не производитъ осадка.

*Во вторыхъ, на показаніи присутствія постороннихъ качествъ.* Поддѣланный сахаръ имѣеть:

- а) Болѣе или менѣ темный цвѣтъ, посторонній вкусъ;
- б) Влажность, совершенную непрозрачность, рыхлый составъ;
- в) Неудоборасстворимость въ чистой водѣ, съ осадкомъ.

---

\*) Niemann's Handbuch der Staatsarzneiwissenschaft T. 2. стр. 418.

г) Примѣсь извести узнается чрезъ раствореніе сахара въ водѣ и прибавленіе щавелевой кислоты (*acidum oxalicum*), отъ чего дѣлается бѣлый осадокъ, растворяющійся въ селищреной кислотѣ и превращающійся чрезъ накаливаніе въ живую известь. Сверхъ сего сахаръ шакой имѣетъ чрезвычайную крѣпость въ своемъ сославѣ; водяной растворъ его отъ прибавленія фіалковаго сока окрашивается зеленымъ цвѣтомъ. Если кромѣ извести и бычачья кровь, особливо несвѣжая, употребляется для очищенія сахарнаго сиропа: то сахаръ получитъ непріятный запахъ, съ красноватымъ по краямъ налетомъ; въ сахаръ шакомъ легко зараждаются черви \*).

д) Примѣсь желѣзнаго купороса узнается чрезъ прилипіе настойки чернильныхъ орѣшковъ къ водяному раствору сахара, отъ чего дѣлается черный осадокъ.

е) Примѣсь свинца узнается чрезъ прибавленіе раствора сѣроводородокислыхъ соединенийъ къ водяному раствору сахара; отъ сего дѣлается черный осадокъ.

\*) *Systemat. Handbuch der Staats-Arzneykunde*, v. J. Bernt. I. B. стр. 316. § 815.

## ИНОСТРАННЫЯ ПРЯНОСТИ.

*Виды порти и подлѣсей пряностей. Главнѣйшіе суть слѣдующіе:*

1. Миндаль прогорклый, разѣденный червями.
2. Такой же инбирь, кошорый сверхъ сего поддѣлывается мѣломъ или глиною; либо уже упошребленный инбирь продается за свѣжій.
3. Корица, собранная съ стараго дерева, лишенная своей пряности и проч.
4. Перець лежалый, подмоченный, или же поддѣланный мукою. Бѣлый перець, намазанный смѣсю крахмала и свинцовыхъ бѣлилъ. Черный перець размоченный и покрытый свинцовыми бѣлилами для представленія бѣлаго перца.
5. Гвоздика, высушенная на солнцѣ, также поддѣланная прагаганиновымъ шѣспомъ, коркою черного хлѣба, вымоченная и проч.
6. Шафранъ, смѣшанный съ цвѣтами другихъ растѣній, съ жилками варенаго мяса, выварный и проч.
7. Мушкетный орѣхъ, вымоченный въ винномъ спиртѣ; нерѣдко мушкетный порошокъ,

смѣшанный съ крупною мукою, глиняною водою и мѣломъ, выдается за настоящій мушкатный орѣхъ.

*Причины порчи и подмѣсы пряностей.*

Причины сіи весьма явственны и супъ болшею частію умысленныя, за исключеніемъ, можетъ быть, неосторожнаго храненія и подмачиванія нѣкоторыхъ пряностей. Дороговизна сихъ иностранныхъ веществъ есть конечно главѣйшій поводъ къ подмѣшиванію оныхъ.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсы пряностей.* Нужныя въ семь случаѣ мѣры, основываясь на строгомъ присмотрѣ за продажею пряностей, пребуютъ, чѣобы привозимыя вещества сіи не поступали въ продажу прежде предварительнаго обстоятельнаго осмотра. Весьма важно при семъ то, чѣобы пряности продавались цѣльныя, а не приведенныя въ порошкообразный видъ, въ которомъ порча и подмѣсъ легче скрывается и труднѣе распознается. Такъ рыбное сѣмя или лунникъ (*semina mezerberi cossuli*), приведенный въ порошокъ вмѣстѣ съ пряностями, не можетъ быть открытъ прежде, не-

\*

жели обнаружитъ ядовитое свое дѣйствіе у проглотившихъ оный особъ.

*Распознаваніе порти и подлѣсей пряностей.* Сіе производится:

Во первыхъ, чрезъ показаніе недостатка естественныхъ качествъ. Въ чистыхъ и хорошихъ пряносняхъ замѣчаются слѣдующія качества:

1. Свойственный каждому виду пряности естественный вкусъ, запахъ, цвѣтъ и видъ.

2. Надлежащая плотность внутренняго состава или существа пряности.

3. Миндаль имѣетъ наружный цвѣтъ буроватый, а внутри бѣлый. Горькій миндаль имѣетъ меньшую величину, нежели сладкій, отъ котораго отличается онъ также горькимъ вкусомъ, замѣчаемымъ особливо въ бурой кожицѣ его. Сладкій миндаль Испанскій предпочитается Прованскому и Барбадосскому.

4) Инбирь сухъ, тяжель, въ изломѣ гладкъ, смолистъ и желшобѣловатъ, имѣетъ вкусъ острый, жгучій, запахъ пріятный, пряный.

5) Корица состоитъ изъ пробочекъ сполъшпанныхъ, что оныя почти уподобляются



нистей бумагѣ, имѣють гибкость, сухость, легкость, при разломѣ получаютъ щели; цвѣтъ ихъ желтокраснобурый, вкусъ сладковато-пряный, согревающий, запахъ весьма пріятный, проникательный, бальзамическій.

6) Перець, особливо черный, представляеть зерна на ощупь крѣпкія, плотныя, чистыя, падающія на дно сосуда съ водою. Бѣлый перець имѣеть острый, нѣсколько жгучій вкусъ, однако слабѣйшій, нежели вкусъ перца черного. Длинный перець оспрошую своего вкуса превосходитъ оба первые.

7) Гвоздика тяжела, довольно велика, удобно разламывается, снаружи весьма темнобура, а внутри краснобура; если ее давятъ ногтями или царапять, то опредѣляется масляная жидкость.

8) Шафранъ представляеть нити, несущія и немокрыя, шпигучія, гибкія, на ощупь мягкія и нѣсколько жирныя, трудно приводимыя въ порошокъ. Цвѣтъ сихъ нитей темнокрасный, или красноватый съ опблескомъ; но на обоихъ концахъ нити цвѣтъ поспоянно бѣложелтый; вкусъ горьковатый, бальзамическій, нѣсколько острый. При жеваніи шафрана слюна окрашивается темножелто-

краснымъ цвѣтомъ; шже примѣчается при распираніи шафрана между пальцами.

9) Мушкатный орѣхъ тяжель и жирноватъ; будучи проколошъ горячею иглою, опдѣляется желтоватое масло; при разрѣзываніи не крошится; разрѣзанный представляеть поверхность швердую, плотную, блестящую, имѣющую видъ мрамора и нѣсколько масляную. Вкусъ его горьковатый, пряный, жирноватый; запахъ проникательный, пріятный, ароматическій.

*Во вторыхъ, чрезъ показаніе постороннихъ качествъ.* Худыя же качества приносятся сущи:

1) Миндаль получаетъ отвратительный вкусъ, ввиду своего состава желшья пшана, дѣлается весьма сухимъ, или клейкимъ, либо мягкимъ, подобно воску.

2) Имбирь не имѣетъ никакого почти запаха и вкуса. Чрезъ размачиваніе въ водѣ опкрывается подмѣсъ мѣла или глины.

3) Корица имѣетъ весьма слабый, либо посторонній вкусъ и запахъ; шрубочки ея несоразмѣрно шодсты, цвѣтъ блѣднѣе. Впрочемъ худая корица, положенная въ хорошую, получаетъ отъ сей послѣдней нѣсколько вку-

са и запаха. Посему важнѣе всего толщина пробочекъ.

4) Перець черный болѣе гладокъ, нежели морщиноватъ, плаваешь на поверхности воды, между пальцами легко раздавливается, имѣеть слабый или посторонний запахъ. Перець бѣлый, поддѣланный смѣсью изъ крахмала и свинцовыхъ бѣлилъ, представляешь зерна, болѣе жесткія, которыя опть прибавленія Ганнемановой пробы (*aqua hydrosulphurata acidula*, Ph. C. Ruth.) чернѣютъ. Такимъ образомъ опкрывается черный перецъ, покрытый свинцовыми бѣлилами и выдаваемый за бѣлый. Чрезъ погруженіе въ воду опкрывается подмѣсь муки.

5) Гвоздика имѣеть слабый вкусъ и запахъ, блѣдный цвѣтъ, при давленіи ногтемъ не опдѣляетъ масла; легка, мягка, не имѣеть свойственнаго вида. Чрезъ намоченіе гвоздики въ водѣ опкрывается подмѣсь хлѣбной корки и слизи прагаганшиной.

6) Шафранъ, подмѣшанный цвѣтами другихъ распѣній, имѣеть нити бѣлыя, свѣшложенныя или красножелтыя; на концахъ верхней не замѣчается бѣложелтаго цвѣта. Чрезъ размачиваніе шафрана въ водѣ дѣлается

явспвеннымъ видъ примѣшанныхъ цвѣшовъ. Шафранъ, смѣшанный съ варенымъ и сухимъ мясомъ, имѣетъ черновашій цвѣтъ и на раскаленныхъ угольяхъ издаетъ вонючій запахъ, свойственный сожигаемому рогу. Вываренный шафранъ имѣетъ блѣдный цвѣтъ, слабый запахъ и вкусъ и водѣ сообщаетъ блѣдножелто-золотистый цвѣтъ.

7) Мушкатные орѣхи, ломкіе, внутри полые, съ слабымъ запахомъ и вкусомъ, имѣющіе наружный и внутренній цвѣтъ бурый, сушь лежалые или вымоченные. Мукою, глиною и мѣломъ подмѣшанные мушкатные орѣхи не имѣютъ запаха и вкуса, при разрѣзываніи рассыпаются, а въ водѣ расплываются.

### М Е Д Ъ.

*Виды порги и подмѣсей меда.* Сюда принадлежатъ:

1. Медъ, въ копоромъ замѣчается броженіе.
2. Примѣсь воды.
3. Примѣсь къ худому меду ароматическихъ травъ, или сладкихъ растительныхъ соковъ (*succus dauci carotæ etc.*).

4. Примѣсь муки, особливо бобовой, крахмалу.

5. Примѣсь песку \*).

*Притины порти и подмѣсей меда.* Небрежное храненіе меда даетъ поводъ къ естественной онаго порчѣ, копорую продавцы стараются загладить прибавленіемъ ароматическихъ нравъ. Мука, крахмалъ и песокъ примѣшиваются для доставленія меду болѣе густоты и тяжести, а вода для болѣе большого количества. Если пчелы собираютъ медъ съ вонючихъ цвѣтловъ (*allium ursinum* etc.), то онъ также не имѣетъ здоровыхъ качествъ.

*Предотвращеніе порти и подмѣсей меда.* Для сего требуется тщательный надзоръ надъ продажею сего вещества.

*Распознаваніе порти и подмѣсей меда.*  
Сіе производится:

\*) Что подмѣси меда небезызвѣстны были древнимъ, доказываютъ слѣдующія слова: „*Mel malum, inquit Apicius, bonum facies ad vendendum, si unam partem mali et duas boni simul miscueris. Valer. Martialis Epigram. Lib. I. Epigram. 17. Nota I. (Ed. Lugd. 1656).*“

*Во первыхъ, чрезъ показаніе недостатка естественныхъ качествъ, каковыя сущь:*

а) Цвѣтъ бѣловатый, желтый, вообще свѣтлый; вкусъ собственный сладкій, составъ зернистый, густоватый, липкій; тянется въ видѣ нитей.

б) Совершенная растворимость въ холодной водѣ и алкоголь, безъ осадка.

*Во вторыхъ, чрезъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ, каковыя сущь:*

1. Темный цвѣтъ, запахъ и вкусъ непріятный, несовершенная растворимость въ водѣ, недоспашокъ пѣтушеспи.

2. Пѣнистый видъ, кислый запахъ и вкусъ означаютъ начавшееся броженіе меда.

3. Медъ, подмѣшанный водою, узнается по необычайной жидкости его состава.

4. Примѣсь ароматическихъ правъ иногда открывається изъ самаго присутствія частицъ сихъ правъ въ медовой массѣ. Цвѣтъ сего меда темный; запахъ и вкусъ особенный, непріятный; на днѣ сосуда, въ коемъ содержишься медъ, бываетъ осадокъ; составъ меда не растягивається въ видѣ нитей.

5. Примѣсь муки или крахмалу открывається чрезъ раствореніе меда въ кипячей

водѣ и охлажденіе распвора, опть чего мука или крахмалъ осѣдаетъ на дно сосуда. Осадокъ сей, варимый съ весьма малымъ количествомъ воды, превращается въ густое клейкое вещество, подобное спудени.

6. Песокъ опкрываепся пакже чрезъ распвореніе меда въ кипячей водѣ и охлажденіе, причеиъ происходитъ на днѣ сосуда оспапнокъ, состоящій изъ песку.

### *ВЫЖАТЫЯ МАСЛА.*

*Виды порти и подмѣсей выжатыхъ маслъ.*

Обыкновеннѣйшіе сушь:

1. Прогорклость масла.
2. Подмѣсь дорогаго масла дешевымъ.
3. Примѣсь жиру или сала,
4. ————— мѣдной окиси,
5. ————— свинцовой окиси.

*Причины порти и подмѣсей выжатыхъ маслъ.* Причины сіи сами собою явспвуютъ. Долговременнохранимое масло, особливо въ тепломъ мѣспѣ, горкнепть. Жиръ и дешевѣйшія масла подмѣшиваюпся къ лучшимъ для большаго вѣсу и густюшы. Въ мѣдной или свинцовой посудѣ сберегаемое масло по-

лучаесть примѣсь окиси сихъ металловъ. Особенно мѣдные краны масляныхъ бочекъ нерѣдко подають поводъ къ мѣдной примѣси. Въ Испаніи, говорятъ *Гофманиъ* \*), Прованское масло содержитъ часпо въ свинцовой посудѣ для того, чтобы оно лучше очищалось; посему Испанское масло сіе чаще содержитъ въ себѣ свинецъ, нежели Италіанское и Французское. Сверхъ того прогорклыя масла иногда подслащиваются свинцевою окисью.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей выжатыхъ маслъ.* Для сего пребываются мѣры, часпію общія, т. е., присмотръ за продажею выжатыхъ маслъ, часпію же особенныя, къ каковымъ относится прежде всего храненіе сихъ маслъ въ холодномъ мѣстѣ и въ безвредной посудѣ. Посему выжатые масла нужно хранить въ деревянной посудѣ или бочкахъ, запираемыхъ деревянными же кранами, равно и мѣрять оныя деревянными или стеклянными приборами. *Тромсдорфъ* \*\*) почиша-

---

\*) Der Getränke — Prüfer—v. C. A. F. Hoffmann. Quedlinburg u. Leipzig. 1826. стр. 117—118.

\*\*) Reichsanzeiger. 1799. N 165.



елѣ безвреднымъ храненіе и мѣрѣніе сихъ маселъ въ свинцовыхъ приборахъ; однакожъ сіе можно только допустить касательно совершенно чистаго и припомъ свѣжаго масла, а не касательно стараго, имѣющаго менѣе прогорклости, гдѣ уже образовалась кислота (*acidum sebacicum*). Весьма нужно, чтобы при самомъ заготовленіи выжатыхъ маселъ употреблялись вѣрные способы къ предупрежденію прогорклости. Для сего совѣтуютъ смѣшивать чрезъ продолжительное болтаніе равныя части свѣжевыжатого масла и теплой воды; чрезъ сіе послѣ нѣсколькихъ дней очистившееся масло отдѣлится отъ мутной и слизистой воды и будетъ плавать на поверхности ея. Еще лучше способъ Г-на *Тенара* \*), состоящій въ смѣшеніи масла съ сѣрною кислотою. Прогорклое масло конечно можно очистить чрезъ смѣшеніе съ угольнымъ порошкомъ и отдѣленіе онаго процѣживаніемъ, равно также чрезъ опнытіе отъ масла кислоты помощію углекислаго поппаша или извести; однако въ большемъ видѣ сіе производство затруднительно и дорого. Посему предотвращеніе порчи масла всегда

\*) *Annales de Chimie*. Г. XXXVIII. стр. 297.

останется важным и необходимымъ. Очищеніе масла отъ прогорклыхъ частей чрезъ свинецъ и другія ядовитыя вещества есть весьма вредный и неопозволительный способъ.

*Распознаваніе порчи и подмѣсей выжатыхъ маслъ.* Сіе распознаваніе производится обыкновенно:

*Во первыхъ, трѣзъ показаніе недостатка естественныхъ качествъ, каковыми почищаются:*

- 1) Вкусъ мягкій, нѣжный, собственнй, цвѣтъ свѣплый, запахъ большею частію слабый, либо и вовсе неощущаемый.
- 2) Составъ густожидакій, маркій; совершенная нераспворимость въ водѣ.
- 3) Совершенное распвореніе масла въ эфирахъ, безъ мупности.

*Во вторыхъ, трѣзъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ.* Худыя качества выжатыхъ маслъ суть:

- 1) Вкусъ оспрый или горькій, пропивный запахъ, измѣненный цвѣтъ.
- 2) Прогорклое масло опличается съ перваго взгляду опврапительнымъ запахомъ и вкусомъ.
- 3) Лучшее масло, подмѣшанное худшимъ,

имѣетъ вкусъ и запахъ послѣдняго. Прованское масло, подмѣшанное маковымъ, рѣпнымъ, льнянымъ, орѣховымъ, узнается шѣмъ, что въ холодномъ мѣсягѣ весьма медленно превращается въ бѣлую зернистую массу (свойство чистаго Прованскаго масла), при горѣніи не даетъ чистаго, свѣтлаго пламени и при болшани образуетъ много пузырей. Доска деревянная, намазанная чистымъ Прованскимъ масломъ, оспаится равномерно жирною, а намазанная смѣсью изъ Прованскаго и маковаго масла скоро высыхаетъ или покрывается кожицею \*). Миндальное масло, подмѣшанное маковымъ или орѣховымъ, получаетъ вкусъ сихъ послѣднихъ, а на открытомъ воздухѣ покрывается клейкою кожицею.

4) Примѣсъ сала или жира узнается чрезъ прибавленіе сѣрнаго эѳира, отъ чего шаковое масло мушится и получаетъ молочный цвѣтъ.

5) Для узнанія примѣси мѣди одна часть масла болшается съ двумя частями перегнаннаго уксуса; потомъ уксусъ отдѣляется отъ масла и насыщается растворомъ амміа-

---

\*) Hoffmann. прив. соч. стр. 117.

ка, отъ чего жидкость получаетъ голубой цвѣтъ и осадокъ.

6) Примѣсъ свинца узнается чрезъ прилиптіе къ маслу раствора сѣроводородныхъ соединений или Ганнемановой пробы (*aqua hydrosulphurata acidula*, Ph. C. R.), отъ чего происходишь черный цвѣтъ и осадокъ. Либо къ маслу прибавляють перегнаннѣй уксусъ и нѣсколько капель селифреной кислоты, болпають и дають отсѣпояться; попомъ уксусъ сливается и испытывается, какъ выше сказано, Ганнемановою пробою.

### У К С У С Ъ.

*Виды порти и подмѣсей уксуса. Сюда принадлежатъ:*

1) Подмѣсъ винограднаго уксуса фруктовымъ.

2) Продажа фруктоваго уксуса вмѣсто винограднаго.

3) Примѣсъ къ уксусу острыхъ растительныхъ веществъ (горчица, имбирь, калганъ, райское сѣмя, *cortex daphnes mezerei, gridii, laureoli, semina capsici annui, radix pyrestri, ari maculati etc*).

4) Примѣсь минеральныхъ кислотъ, именно: сѣрной, селищреной, соляной.

5) Примѣсь сѣрнокислой мѣди или шако-го же цинка (sulphas cupri, vel zinci).

6) Примѣсь свинцовыхъ составовъ, лапунъ или желшой мѣди.

7) Заплѣсневѣлость въ уксусѣ.

*Причины порчи и подмѣсей уксуса.* При-чины сія очевидны. Примѣсь худаго уксуса къ лучшему дѣлается для умноженія количества; расщипельныя оспрыя вещества примѣшиваются для крѣпости, а минеральныя кислоты для увеличенія кислаго вкуса. Сѣрнокислая мѣдь и шакой же цинкъ попадаюшь въ уксусъ попому, что иногда употреб-ляются они для освѣплѣнія сей жидкости. Наконецъ свинцовые составы и лапунъ са-ми попадаюшь въ уксусъ, хранимый въ сосу-дахъ изъ сихъ металловъ. Заплѣсневѣлость уксуса зависить отъ небрежнаго храненія сей жидкости въ шепломъ мѣстѣ.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей уксу-са.* Сіе достигается спрогимъ присмотромъ за шѣмъ, чшобы продажный уксусъ хранил-ся въ прохладномъ мѣстѣ, но не въ погре-бѣ. Если же по необходимости уксусъ

стоятъ въ погребѣ, (по нужно оный спавить въ удаленіи отъ другихъ напишковъ. У древнихъ Римлянъ уксусъ былъ необходимъ для арміи, и попому каждый воинъ долженъ былъ имѣть при себѣ бутылку съ уксусомъ. Смѣшеніе воды съ уксусомъ называлось у нихъ розса. Основываясь на семъ, *Эргартъ* \*) предлагаетъ для армій уксусный порошокъ. Порошокъ сей пригопавливается изъ грубо-исполченнаго виннаго камня, погруженнаго на 8-10 дней въ крѣпкій уксусъ и попомъ высушеннаго. Сіе дѣйствіе надлежитъ три раза повторить. Однакожъ по причинѣ находящагося въ семъ порошокѣ виннаго камня можетъ быть онъ и не совсѣмъ безвреденъ для кишечнаго канала особъ, употребляющихъ оный. Въ Парижѣ, въ 1809 году, запрещено уксусодѣлателямъ прибавлять минеральныя кислоты къ уксусу \*\*). Посему всякій уксусъ, поступающій въ продажу, нужно предварительно изслѣдовать. Мѣдные и изъ желтой мѣди краны въ уксусныхъ бочкахъ, какъ весьма

\*) G. v. Ehrhart's Entwurf eines physikalisch-medizinischen Gesetzbuches u. eines gerichtlichen Medicinal-Codex, 2-ter B. (s. a.). Augsburg. S. 404.

\*\*) Hartleben's allg. Deutsche Just. u. Poliz. Fama. 1810. May. S. 192.

вредные, лучше всего могутъ быть замѣнены деревянными или стекляными кранами. Уксусъ, очищенный отъ осадка и хранимый въ закупоренныхъ сосудахъ, нелегко плѣсневѣетъ. Въ маломъ видѣ порча сія опирается чрезъ подвариваніе уксуса въ каменной посудѣ и храненіе въ закупоренныхъ бутылкахъ.

*Распознаваніе порчи и подлѣсей уксуса.*

Оно состоитъ вообще:

*Во первыхъ, въ показаніи недостатка естественныхъ качествъ.* Хорошія качества уксуса суть:

1) Цвѣтъ свѣтлый, болѣе или менѣе желтоватый, либо красноватый, какъ по замѣчается въ уксусѣ, пригопшвленномъ изъ краснаго вина; запахъ пріятный, собственный; вкусъ чисто-кислый. Чрезъ распыраніе между ладонями малой части уксуса свойственный ему запахъ не измѣняется.

2) Составъ чисто-жидкій, безъ липкости и мушности.

3) Будучи сберегаемъ нѣсколько дней, уксусъ сей оспаеется безъ всякой перемѣны.

4) Будучи вываренъ до половины, получаетъ послѣ охлажденія вкусъ кислѣе прежняго.

5) Одна унція уксуса насыщаєть 28—30 грань углекислаго кали.

*Во вторыхъ, чрезъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ. Худыя же качества уксуса сущь:*

1) Вкусъ и запахъ непріятный, нерѣдко острый, гнилый.

2) Соспавъ мушный съ охлопками; при выливаніи таково уксуса замѣчается въ немъ тягучесть и липкость.

3) Уксусъ виноградный, подмѣшанный фруктовымъ или пивнымъ, будучи налитъ въ спаканъ, болѣе пѣнится и опдѣляется болѣе пузырей, нежели чистый виноградный уксусъ. Если таково уксусъ выпарить до сухости и ошатоко сжечь, то получается малое количество кали, ш. е., сколько, сколько было винограднаго уксуса въ цѣлой смѣси \*). Кали сіе узнается чрезъ прибавленіе сѣрной или другой кислоты, опъ чего дѣлается шипѣніе. Сверхъ сего пивной уксусъ

---

\*) Виноградный уксусъ содержитъ въ себѣ винный камень, а фруктовый и пивной уксусъ хотя можетъ содержать въ себѣ яблочную или виннокаменную кислоту, но никогда не содержитъ виннаго камня.



узнается изъ того, что онъ содержитъ въ себѣ фосфорную кислоту. Чтобы увѣриться въ сѣмъ, нужно прибавлять къ уксусу растворъ свинцоваго сахара до тѣхъ поръ, пока сдѣлается осадокъ, который вымывается и накаливается въ тиглѣ, чрезъ что получается стекловатая масса (phosphas plumbi).

4) Дабы открыть фруктовый или пивный уксусъ, продаваемый подъ видомъ винограднаго, для сего нужно уксусъ такой выпарить до сухости и остатокъ сжечь; если послѣ сожженія не будетъ въ остаткѣ кали, то уксусъ не есть виноградный, но фруктовый или пивный.

5) Примѣсь оспрыхъ распительныхъ веществъ узнается тѣмъ, что, по замѣчанію *Вайзе* \*), мухи не собираются около тако-го уксуса, выпавленнаго на воздухъ. Если одну губу намочить чистымъ уксусомъ, а другую подозрительнымъ, то на послѣдней долго ощущается жженіе. Если подозрительный уксусъ выпарить до того, что онъ получитъ видъ экстракта, то выпяжка сія будетъ имѣть жгучій вкусъ.

---

\*) J. Weise's vollkommener Essigbrauer. Erfurt.  
1804.

6) Что принадлежит до примѣси минеральныхъ кислотъ, то для открытія въ уксусѣ сѣрной кислоты свободной, нарочно примѣшанной \*), должно прибавить къ уксусу столько ѣдкой или углекислой извести, сколько потребно для насыщенья сказанной свободной сѣрной кислоты. Черезъ сіе происходитъ *acetaz calcis*,— соль удоборастворимая и *sulphas calcis*,— соль почти нерастворимая. Посему происшедшій такимъ образомъ осадокъ (*sulphas calcis*) вымывается на цѣдилкѣ и раздѣляется на двѣ части. Одна часть растворяется чрезъ варенье въ перегнанной водѣ и потомъ прибавляется къ ней солянокислый баритъ, отъ чего дѣлается бѣлый осадокъ, нерастворяющійся въ водѣ, ниже въ селитреной кислотѣ (*sulphas barytae*). Другую часть осадка можно высушить и, смѣшавъ

\*) Во всякомъ виноградномъ уксусѣ, говоритъ *Орfila* (прив. соч. Т. II. стр. 484), находятся сѣрнокислыя известъ и кали (*sulphas calcis et sulphas potassæ*); посему солянокислый баритъ всегда производитъ въ уксусѣ бѣлый осадокъ (*sulphas barytae*) и очевидно, средство сіе недостаточно само по себѣ для открытія сѣрной кислоты, умышленно примѣшанной къ уксусу.

съ 6-ю часпями (по вѣсу) тонкаго угольнаго порошка, накаливать чрезъ два часа въ пиглѣ; чрезъ сіе получится *sulphuretum calcis*, узнаваемое по тому, что опъ прибавленія нѣсколькихъ капель воды и селипреной кислоты испускаетъ запахъ гнилыхъ яицъ.

Для отккрытія въ уксусѣ селипреной кислоты надлежитъ насыпить оный чистѣйшимъ кали и выпарить до густоты сиропа густовапаго; потомъ въ сію густую смѣсь (*acetat potassæ et nitrat potassæ*) прибавитъ крѣпкаго алкоголя, который растворитъ *acetatem potassæ* и нѣкоторыя другія составныя часпи уксуса, а *nitrat potassæ*, какъ нерасстворимое въ алкоголь, останеся въ осадкѣ и отдѣляется процѣживаніемъ жидкости. Дабы точнѣе увѣриться, что осадокъ сей естъ дѣйствительно селипра, то для сего одна часпъ онаго бросается на раскаленные уголья, причемъ происходитъ прескъ и огонь увеличивается; другая часпъ смѣшивается съ крѣпкою сѣрною кислотою, причемъ отдѣляются пары оранжевые или бѣдые, смотря, ш. е., по тому, одна ли селипреная кислота или же вмѣстѣ и соляная (изъ находящихся въ уксусѣ солянокислыхъ

солей) отдѣляется, пакъ чпо здѣсь, говоритъ Орфила \*), образуется хлоръ и селипротая кислота (chlore et acide nitreux jaune orangé).

Для отккрытія соляной кислоты должно укусъ нагрѣвать въ ретортѣ, съ коею соединенъ шаръ, наполненный небольшимъ количествомъ перегнанной воды \*\*). Жидкость, переходящая сюда при нагрѣваніи, состоитъ изъ укуса и соляной кислоты; почему, прибавивъ къ оной водяной растворъ селипрокислаго серебра, получимъ бѣлый осадокъ охлопковатый (chloruretum argenti), пѣжелый, нерасстворяющійся ни въ водѣ, ни въ селипротой кислотѣ, а только въ амміакѣ.

7. Примѣсъ мѣди узнается чрезъ вкапливаніе въ укусъ ѣдкаго нашатырнаго спирта, опъ чего укусъ получаетъ мутность, сафиро-голубой цвѣтъ, и при большемъ количествѣ примѣси сей пакого же цвѣта оса-

---

\*) Пр. соч. Т. II. стр. 486.

\*\*) Всякій продажный укусъ содержитъ въ себѣ солянокислыя соли, и потому для отккрытія умышленно прибавленной соляной кислоты, помощію селипрокислаго серебра, необходимо нужна предварительная перегонка укуса (Orfila. Пр. соч. стр. 485—486).

докъ. Лезвее ножа, погруженное въ шакой уксусъ, получаетъ чрезъ 12 часовъ мѣдный цвѣтъ.

8. Примѣсъ свинца узнается вкапливаніемъ въ уксусъ Ганнемановой пробы, отъ чего уксусная жидкость мушится, получаетъ чернобурый цвѣтъ и шакой же осадокъ. Прощенный и вымытый на цѣдилкѣ осадокъ сей высушивается, смѣшивается съ равнымъ (по вѣсу) количествомъ пошаша и накаливается въ пиглѣ; чрезъ сіе образуется сѣрная печень (*sulphuretum potassæ*) и свинецъ возстановляется въ металлическій видъ; по сему охлажденная масса сія погружается въ воду, которая растворитъ сѣрную печень, а чистый свинецъ осядетъ на дно сосуда.

9. Примѣсъ сѣрнокислаго цинка узнается чрезъ прибавленіе къ уксусу чистаго амміака, отъ чего дѣлается осадокъ бѣло-зеленоватый, который, бывъ высушенъ и накаливается съ углемъ, превращается въ чистый цинкъ (*regulus zinci*). Синильнокислый пошашъ производитъ въ шакомъ уксусѣ темноголубой осадокъ.

10. Заплѣсневѣлый уксусъ узнается съ перваго взгляда.

*(Будетъ продолженіе).*

#### IV.

### **ПЕРЕВЯЗАНИЕ НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ И СООБЩЕННОЕ ГЛАВНЫМЪ ДОКТОРОМЪ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЪ МОСКВѢ, А. ПОЛЕМЪ.**

---

*Степанъ Григорьевъ*, крестьянинъ Графа Шереметева, извозникъ, отъ роду 25-ти лѣтъ, шѣлосложенія худощаваго, принявъ въ Московскую Екаптерининскую больницу Маія 2-го 1829 года. За два мѣсяца передъ шѣмъ, отъ неизвѣстной причины, почувствовалъ онъ ступую боль въ лѣвомъ колѣнѣ, которая послѣ употребленія мазей прошла; но въ то же время начала образоваться на верхней и передней части бедра біющая, цвѣтомъ отъ окружающей кожи неоплечающаяся опухоль. Для излѣченія сего недуга просилъ онъ совѣща у одного лавошника, торгующаго московскими поварами, который, принявъ опухоль за венерическій бубонъ, послѣ щептна-

го употребленія разныхъ мазей, пластырей и припарокъ сдѣлалъ малый разрѣзь въ оной. Спременяющаяся, хопя изъ малѣйшаго опверстія, кровь испугала его до того, что онъ, перевязавъ кое-какъ рану, самъ опказался опть дальнѣйшаго врачеванія. Призванный на помощь Медикъ совѣпował немедленно опправипсья въ Екаперининскую больницу, гдѣ болѣзнь его представилась въ слѣдующемъ видѣ: опухоль находилась въ лѣвомъ паху, плотно прилежала къ Пупарціевой связкѣ и занимала болѣе половины верхней часпи бедра. Распроспраняясь въ лѣвую и въ правую сторону, она соспавляла значительное возвышеніе, подобное головѣ десятипльпняго дипяпи. Покровы на передней часпи опухоли въцвѣпѣнѣсколькo измѣнены, и въ помѣспѣ, гдѣ сдѣланъ былъ разрѣзь и въ окружности онаго сказалось поверхностное нагноеніе. Спекшаяся кровь покрывала кромѣ того сію часпѣ и жидкая кровь, похожая на сукровицу, въ весьма маломъ количеспвѣ сочилась изъ оной. По причинѣ спекшейся въ самой опухоли крови біенія, при наложеніи руки на оную, не ощущалось, а замѣчалось только тогда, когда смотрѣли на опухоль со спо-

роны (en profil). Не смотря на сильное растяжение чашей, боль въ опухоли и въ окололежащихъ чашяхъ была весьма умѣренная; но опъ прижатія ею лимфатическихъ сосудовъ вся лѣвая нижняя конечность ниже опухоли значительно отекала. Общее состояніе больного было довольно хорошее, силы не истощены, позывъ на пищу естественный; лихорадочныхъ движеній вовсе не замѣчено. Сии весьма благопріятныя обстоятельства заславили меня, не смотря на чрезвычайную величину опухоли, надѣясь въ успѣхъ операціи, п. е., перевязанія наружной подвздошной артеріи. Рѣшившись произвести оную безъ оплагательства, я не почелъ препятствиемъ небольшой кашель, обнаружившійся за день передъ тѣмъ и происшедшій, вѣроятно, опъ легкой простуды при употребленіи холодныхъ примочекъ на самую опухоль.

Размышляя о разныхъ инструментахъ, рекомендованныхъ мнѣ для удобнѣйшаго производства сей операціи, а наипаче тѣхъ, коныя служатъ для подведенія лигатуры подъ артерію, мнѣ показалась для операціи надъ худощавыми всего удобнѣе простая серебря-



ная пружочка, на одномъ концѣ нѣсколько сплюснутая, согнутая въ крючокъ и пропускающая тонкую эластическую пружину, а для пучныхъ \*) попъ же самой инструмента съ прикрѣпленною къ оному спальной рукояшкою. Конецъ крючка долженъ быть косвенно отпиленъ внутрь или кнаружи, чѣмъ самымъ онъ дѣйствуетъ въ родѣ тупаго острья. Коль скоро крючокъ сей будетъ подведенъ подъ артерію и конецъ его не покрывается клѣшчатною плевою, въ чемъ руководствуется простое осязаніе дѣйствующаго пальца, то помощникъ подвигаетъ впередъ скрытую въ оной пружину, которая на заднемъ концѣ посредствомъ ушка снабжена лигашурою. Передній припущенный конецъ сей пружины по направленію пальца поднимается, захватывается двумя пальцами и посредствомъ оныхъ пружина вовсе выпягивается; за нею свободно слѣдуетъ лигашура, и когда половина оной уже вышла, то крючокъ вынимается изъ—подъ артерію

---

\*) Каковъ былъ больной, рабочаго баталіона Фельд-фебель, *Степанъ Дерюгинъ*, которому сдѣлана сія операція въ Московскомъ военномъ госпиталѣ 12-го Іюля 1829 года.

и изъ самой раны, пропускается чрезъ оный остальная часть лигатуры, которая уже теперь находилась подъ самою артерією. Предложенныя Г-мъ Адъюнктъ-Профессоромъ (что нынѣ Экстраординарный Профессоръ) *Буальскили* лопаточки для придерживанія и раздвиганія частей весьма удобны, особливо при тупомъ и тѣлосложеніи больного: ибо, дѣйствуя въ семь случаевъ какъ пальцы помощника, онѣ занимаютъ гораздо меньше пространства.

Маія 12-го была произведена мною операція, въ присутствіи Профессора *Высотскаго*, который по просьбѣ моей былъ помощникомъ, Маринской больницы для бѣдныхъ Главнаго Доктора *Оппеля*, Медицины и Хирургіи Доктора *Алфонскаго*, Московской Медицинской Конторы Инспектора *Добронравова* и нѣкоторыхъ другихъ Медиковъ. Отступя на одинъ дюймъ а *spina anterior superior ilii*, наружный разрѣзъ продолжался косвенно внизъ и внутрь. По причинѣ весьма большой опухоли, переходившей опчасти *ligamentum Poupartii* и препятствовавшей нѣсколько свободному дѣйствію при производствѣ операціи, направленіе сіе не могло слѣдовать направленію волоконъ наруж-

мой брюшной мышцы, но приближалось болѣе къ горизонтальному наклоненію. Наружная рана, коея нижній уголъ оканчивался непосредственно надъ самою опухолью, имѣла пять поперечныхъ персповъ длины. Разрѣзавъ наружную косую мышцу, я съ осторожностію прорѣзалъ внутреннюю. Имѣя передъ собою сухожильное распряженіе поперечной брюшной мышцы, опдѣлилъ оное умѣреннымъ давленіемъ пальцевъ отъ прикрѣпленія ея и потомъ опдѣлилъ также брюшину отъ клѣпчатого соединенія оной по самое по мѣсто артеріи, гдѣ имѣла бытъ наложена лигатура. Пропустивъ упомянутый крючокъ безъ особеннаго затрудненія подъ артерію, я наложилъ лигатуру около середины всей длины подвздошной наружной артеріи и завязалъ оную съ должною осторожностію. Не смотря на сіе, при осязаніи почувствовалъ я ниже лигатуры самое малое, едва ощутительное біеніе; а посему для предосторожности наложилъ еще другую лигатуру подъ первую, непосредственно возлѣ оной, тѣмъ болѣе, что и Г. Профессоръ *Высотскій*, осязавъ артерію ниже ли-

гапуры, почувствовалъ также самое малое бѣненіе.

Окончивъ операцію и перевязавши больного, положили его на кровать, ногу покрыли теплымъ сукномъ и прописали ему, для уничтоженія кашля, *Decum altheae cum extracto hyosciami* и *species pectorales* вмѣстѣ чаю.

Послѣ операціи больной чувствовалъ себя весьма хорошо; но по прошествіи часа появился ознобъ, нѣсколько минутъ продолжавшійся, сдѣлалась боль и умножилась стемпература всей лѣвой ноги, пульсъ ускоренъ, кашель сухой и небольшая боля подъ ложечкою, которая на второй день опять исчезла. Пульсъ менѣе ускоренъ, ночь нѣсколько безпокойна, позывъ на пищу малый, боль, въ колѣнѣ и пяткѣ появившаяся вчера, продолжается и въ послѣдней столь значительна, что больной только тогда чувствовалъ нѣкоторое облегченіе, когда ему пятку поддерживали рукою. Вечеромъ чувствительность сія нѣсколько уменьшилась. Опекишую ногу обвили бинтомъ, намоченнымъ камфорнымъ спиртомъ; на аневризматическую опухоль Гулардова вода.

3-й день. Пульсъ почти натуральный, позывъ на пищу какъ до операціи; боль въ колѣнѣ и пяткѣ уменьшается; кашель сильнѣе и во время онаго боль въ глубинѣ раны. На грудь *emplastrum diaphoreticum Mynsichti*.

4-й день. Тоже самое.

5-й день. Язва на поверхности аневризматической опухоли увеличивается и наполнена спекшеюся, весьма вонючею кровью; кашель не уменьшается; посему, кромѣ упомянутыхъ средствъ, прописаны 2-хъгранные пилюли *ex massa pilular. de cynaglossa*, коихъ онъ на ночь принималъ по двѣ.

7, 11-й день. Кашель, оптекъ ноги и боль въ оной уменьшается, температура ноги естественная; изъ раны, операціею произведенной, отдѣляется умеренное количество гноя.

12-й день. Вышла верхняя лигатура.

14-й день. Вышла нижняя лигатура.

15-й день. Язва аневризматической опухоли увеличивается; вынуто изъ подоспи оной значительное количество спекшейся весьма вонючей крови. Перевязка вечеромъ возобновляется. Изъ операціонной раны отдѣленіе гноя уменьшилось.

Часть XV. N. 1.

16-й день. Дабы совершенно очистиить полость опухоли отъ спекшейся крови, опперстіе, язвою произведенное, расширено на два дюйма посредствомъ разрѣза сверху внизъ и вынуто пальцами около прехъ чайныхъ чашекъ спекшейся крови; внутренняя полость имѣла въ длину около 6-ти вершковъ и простиралась вверхъ до самой Пупарціевой связки. Операционная рана заживаетъ. Общее состояніе больного по сіе время благопріятное; но кашель еще не совершенно проходитъ.

17-й день. Появленіе лихорадки; головная боль, нѣкопторая сухость языка, пульсъ мягкій, нѣсколько ускоренный; изъ полости опухоли отдѣляются вонючая сукровица, куски аневризматическаго мѣшка, бедреннаго влагалища, куски полипообразные и какъ бы изъ сгущенной лимфы состоящіе. Желая способствовать образованію хорошаго и цѣлебнаго нагноенія, дабы чрезъ то отдѣлились испорченныя части, въ полости находившіяся, впрыскивали въ оную Infusum chamomillae и наполнили порошкомъ, изъ равныхъ частей хины и угля составленнымъ.

18, 21-й день. Хотя головная боль еще не совершенно исчезла, но лихорадочныхъ дви-

женій не замѣчается и позывъ на пищу восстановляется; отдѣленіе изъ опухоли въ такомъ же родѣ и въ такомъ же количествѣ продолжается; настоящего гноя немного на краяхъ раны, которые мало помалу очищаются.

22, 25-й день. Полость опухоли дѣлается чище и пріемлетъ исподоволь видъ поверхности доброкачественной раны; отдѣляемая жидкость теряетъ непріятный запахъ и уподобляется уже большею частію хорошему гною.

26-й день. Рана операціонная совершенно закрылась; кашель еще не прошелъ; но не смотря на то, по причинѣ запора на низъ, оставлены пилюли *ex synoglosso*; головная боль прекратилась.

27, 32-й день. По причинѣ довольно значительнаго количества гноя перевязка еще ежедневно перемѣняется два раза; но рана мало помалу наполняется и по краямъ оной образуется дикое мясо, которое черезъ день прижигается; для перевязки употребляется одна сухая корпия.

33-й день. Въ верхнемъ углу, *ad ligamentum Poupardii*, сдѣланъ разрѣзъ кожи, кото-

\*

рая въ семь мѣспѣ, по причинѣ глубины раны, соспавляла особенное обширное мѣспилище.

35-й день. Таковой же разрѣзь сдѣланъ внизъ; но какъ, не смотря на то, кожа не опускалась на дно раны и припомъ гной накоплялся какъ бы въ особенной пазухѣ, то сдѣланъ еще поперечный разрѣзь къ внутренней споронѣ лядвей.

36-й день. Больной находится вообще въ хорошемъ соспояніи, но чувствуетъ нѣкоторую слабость и припомъ опъ кашля еще не освобождается. *Dctum Altheae* прописано cum cortice cinchonae et rad. liquiritiae.

41-й день. Чувствуя себя по сіе время хорошо, больной сегодня, опъ неизвѣстной причины, спрадаетъ болью въ лѣвомъ боку, копорая однакожь прошла на слѣдующій день; рана исподоволь выполняется.

48-й день. Изъ-подъ спрупа, образовавшагося надъ операціонною раню, появился гной, копорый происходилъ изъ свища, проспиравшагося въ глубину. Полагая, что на днѣ онаго имѣется нарывъ, положена въ наружное оптверстіе *spongia segeta*; но какъ въ слѣдующій день изъ сего расширеннаго оптверстія гноя выходило весьма малое количе-



ство, по оную перевязывали просто кор-  
пиею, и въ

51-й день изъ свища, беспокоившаго нѣ-  
сколько неожиданнымъ своимъ появленіемъ,  
гною уже болѣе не опдѣляется и дно она-  
го выполняется.

52-79-й день. Свищъ совершенно закрыл-  
ся; въ 68-й день кашель совсѣмъ прошелъ.  
*Dctum Altheae cum cortice* оставлено; опекъ  
значительно уменьшился; больной началъ уже  
прохаживаться и находился въ весьма хоро-  
шемъ состояніи, когда снова послѣ предше-  
ствовавшаго воспаления въ 80-й день въ ниж-  
немъ углу раны образовался свищъ, пребо-  
вавшій разрѣза; послѣ чего рана залягивалась;  
больной уже приготавливался на выписку, но  
подвергнувшись вліянію сквознаго вѣтра, про-  
спудился и въ

95-й день сдѣлался кровавый поносъ, ко-  
торый однакожъ послѣ употребленія *Dcti*  
*Altheae cum tinctura opii* и малыхъ приѣмовъ  
*pulveris Doveri* чрезъ нѣсколько дней пре-  
кратился. Рана совершенно зажила, опекъ  
уничтожился и больной наконецъ въ

101-й день послѣ операціи, т. е., 30-го  
Августа выписанъ изъ больницы.

---

V.

**СЧАСТЛИВО ИЗЛЪЧЕННОЕ СВЕДЕНІЕ  
ШЕИ И НИЖНИХЪ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ВПЕРЕДЪ.**

*Сообщено Исправляющимъ должность Гражданскаго  
Генераль - Штабъ - Доктора Г-мъ Д. С. С. Громо-  
вымъ.*

1829 года Марта 10-го арестантъ *Иванъ Михайловъ* поступилъ въ больницу пюремнаго замка, одержимъ будучи ревматическою горячкою. Жестокія боли поясницы и груди, съ коими онъ боролся чрезъ цѣлую ночь, пульсъ твердый и полный, тѣлосложеніе крѣпкое и мужесквенный возрастъ содѣлывали необходимымъ какъ общее, такъ и мѣспное кровопусканіе. Первое немедленно учинено и фунтъ крови, выпущенной при ономъ, вскорѣ доставилъ примѣтное облегченіе больному; на впорое спраждащій не согласился и мѣспо онаго заспустилъ нарывный пла-

спырь; изъ внутреннихъ средствъ прохлаждающія и послабляющія соли съ легкими попогонительными составляли продолженіе проптивувоспалительнаго метода лѣченія, соопвѣтственнаго качеству и силѣ болѣзни, который дополъ не измѣнялся, пока появившіеся припадки спраданія нервной системы и значительная степень ослабленія цѣлаго организма не указали на другой совсѣмъ проливный прежнему способъ лѣченія, помощію котораго больной, послѣ жестокой двадцатидневной борьбы съ горячкою, наконецъ освободился опъ оной и примѣпно началъ день опо дня укрѣпляться въ силахъ своихъ. До 15-го Апрѣля поправленіе его шло обыкновеннымъ порядкомъ; но съ сего времени вдругъ послѣдовала внезапная перемѣна. Онъ началъ жаловаться на сильныя боли поясицы, шеи и груди; ему упобребили пронцапельныя спиршныя пренія и испарину производящія средства, опъ чего боли, по видимому, уменьшились; но мѣсто оныхъ заспунило другое спраданіе, гораздо тяжчайшее для больного. Оно состояло въ томъ, что голову и ноги его начало поепенно сводить впередъ, такъ что по ис-

печеніи немногихъ сушокъ подбородокъ (sternum) совершенно приблизился къ передней и верхней части грудной кости, колѣна обѣихъ ногъ дошли до пупка, а плѣшки оныхъ висѣли надъ ягодицами (glutæi); всѣ опсправленія, жизненныя, еспешственныя и животныя, при столь жалосптномъ положеніи означеннаго ареспанпа совершались безспрепятспвенно, кромѣ тяжелаго дыханія, не весьма удобнаго глотанія пищи и движенія плѣснаго. Подозрѣвая ревматическую причину въ произведеніи таковаго болѣзненнаго соспоянія, сптарались пропсводѣйсповать оной всѣми приличными какъ внупренними, такъ и наружными средспвами; но когда спшкомъ два мѣсяца упоспреблено было на сіе пропсвуревматическое лѣченіе безъ всякой пользы, то Врачъ, не находя возможности и средспвъ болѣе пользо-  
вать таковаго паціентпа въ не совсѣмъ успро-  
енномъ лазаретѣ пюремнаго замка, предспавилъ объ опсправленіи его для дальнѣйшаго по-  
собія въ градскую больницу, куда онъ, съ доз-  
воленія Гражданскаго мѣспнаго Начальства и перемѣщенъ былъ 2-го Іюня. Принявъ въ раз-  
сужденіе испытанныя прежде сего лѣкарспва безъ всякаго успѣха и оспнося уопспсво бо-

лѣзни паралипическому подобному состоянію сведенныхъ частей, венерическимъ худосочи-емъ поддерживаемому, предписанъ былъ на первой разъ спиртный экстрактъ чилибухи (extr. nuc. vomicæ) въ растворѣ селипрокислаго ртутнаго состава, вмѣстѣ съ наружными средствами, состоявшими изъ лепучекамфорно-меркуріальной мази. Постоянное четырехънедѣльное употребленіе сего способа лѣченія произвело малое слюноотеченіе, но не доставило никакого облегченія. Послѣ того въ печеніи прехъ мѣсяцовъ испытаны были разныя другія возбуждающія средства, но также безъ успѣха. Въ семъ безнадежномъ для больного и скучномъ для Врача состояніи ничего болѣе не оставалось послѣднему, какъ искасть пособія въ эмпирическихъ средствахъ. Фоншпатели, по способу *Потта*, производимыя близъ хребетныхъ позвонковъ, представлялись къ тому весьма способными и для нихъ избрано то мѣсто, которое, по словамъ больного, за нѣсколько предъ тѣмъ лѣтъ подверглось сильному ушибу. Это были шея и поясница; почему съ боковъ послѣдняго шейнаго и по спонамъ перваго поясничнаго позвонка сдѣлано было по фоншпатели посредствомъ ѣдкаго камня

(lapidis caustici), произведенные коимъ спрусья чрезъ смягчительныя припарки и мази въ нѣсколько супокъ опдѣлившись, оставили послѣ себя язвы, изъ которыхъ каждая могла свободно вмѣщать въ себѣ опъ чепырехъ до пяти горошинъ. Ихъ вкладывали ежедневно и всячески старались поддерживать нагноеніе, желая получить опъ онаго предполагаемую пользу. Нѣсколько супокъ прошло въ щепныхъ ожиданіяхъ, и больной, казалось, испощивъ все свое терпѣніе, терялъ совершенно надежду на выздороленіе. Въ семъ опчаянномъ положеніи попребовали его для свидѣтельства въ Ярославское Губернское Правленіе, вмѣстѣ съ Членами Врачебной Управы. Послѣдніе должны были рѣшить, можетъ ли онъ получить прежнее свое здорově. Никто изъ Медиковъ не смѣлъ положительно утверждать сего; но всѣ согласны были въ томъ, чпобъ продолжитъ нѣкопое время лѣченіе его по прежнему въ градской больницѣ, и буде уже не окажется и за симъ никакой надежды къ выздороленію, то оставитъ его какъ неизлѣчимаго въ особенномъ покоѣ тюремнаго замка, по силѣ Указа Правительствующаго Сенапа опъ 9 Октября 1829

года. Въ слѣдствіе сего препровожденъ онъ былъ обратно въ градскую больницу, съ тако-  
вымъ припомъ подтвержденіемъ, чѣмъ для  
исцѣленія его предпринимаемы были всѣ возмож-  
ныя мѣры; но какъ, по тщетномъ испытаніи  
многихъ изъ паковыхъ, сдѣланныя боль-  
ному фонпанели въ вышеозначенныхъ мѣ-  
стахъ подавали нѣкоторую надежду къ по-  
му, то по возвращеніи его въ больницу на-  
чали снова поддерживать въ нихъ нагное-  
ніе, которое помощію осадочной красной  
ршупи (*mercurius præcipitatus ruber*) и по-  
рошка Донскаго можжевельника (*Juniperus za-  
bina*) не преспавали усиливать дополь, пока въ  
сведенныхъ частяхъ примѣльны спали нѣко-  
торая гибкость и мягкость. Пользуясь сею пе-  
ремѣною, сдѣлана была попытка развести сіи  
части, копорыя съ малымъ усиліемъ и были  
выправлены, хотя съ немалою болью для па-  
ціента. Увѣрившись изъ сего опыта въ ви-  
димой пользѣ искусственныхъ язвъ, ничего не  
было оспавлено безъ вниманія, чѣмъ могло  
производить въ оныхъ каждодневное обильное  
гноеніе, а между тѣмъ больному внушено  
дѣлать съ своей стороны возможное усиліе  
къ приведенію сведенныхъ членовъ въ напу-

ральное положеніе, каковому совѣту послѣ-  
дуя, онъ чрезъ нѣсколько дней сполько ока-  
заль успѣховъ, что нижнія конечности безъ  
всякаго непріятнаго для себя чувства могъ  
самъ приводить въ надлежащій видъ, а шею  
державъ прямо. Вскорѣ попомъ, съ пособіемъ  
двухъ коспылей, въ состояніи былъ онъ проха-  
живаться по комнашѣ, а въ половинѣ Декаб-  
ря мѣсяца началъ свободно спускаться ногами,  
безъ всякой поддержки или коспылей. Не до-  
скавало въ колѣнахъ гибкости и мягкости  
въ мускулахъ, чѣмъ двигать ногами по про-  
изволу; но нѣсколько простыхъ теплова-  
лыхъ ваннъ, смягчительныхъ мазей и припа-  
рокъ скоро уничтожили и сіе препятствіе,  
шакъ что онъ нынѣ имѣетъ свободное дви-  
женіе въ ногахъ и держитъ шею споль же  
прямо, какъ и до болѣзни.

---



## VI.

### СКИПИДАРЪ ПРОТИВЪ НЕРВНОЙ БО- ЛИ, ОСОБЛИВО СЪДАЛИЩНОЙ (ischias).

---

Скипидаръ упошребляли для лѣченія нерв-  
ныхъ болѣзней въ самыя древнія времена.  
*Галенъ* и *Мих. Дориней* приготавливали изъ  
него пластырь; *Скультетъ* съ пользою упо-  
шреблялъ его при поволошпой ранѣ нерва;  
*Боннетъ* вылѣчилъ нервную боль заключаю-  
щимся въ перпеншинѣ эфирнымъ масломъ;  
*Артибальдъ* первый обратилъ вниманіе Врачей  
на лѣченіе нервно-сѣдалищной боли симъ сред-  
ствомъ, сообщивъ *Чейне* слѣдствія своихъ  
наблюденій, а сей посовѣтовалъ его *Голие*,  
копорый послѣ представилъ въ своихъ ехре-  
riments, faits и проч. семь наблюденій о семъ  
предметѣ. Въ Германіи одобряли сіе сред-  
ство *Тилениусъ* и *Лектинъ*, во Франціи *Ра-*  
*камье*, *де Ларокъ*, *Дюфуръ*, *Гюссонъ* и мно-  
гіе другіе.

Внутреннее употребленіе скипидара заслуживаетъ преимущество предъ другими способами, только въ малыхъ приемахъ (по драхмѣ въ супки приема на три), такъ чтобы всасываніе его происходило медленно; въ такомъ случаѣ онъ не испражняется низомъ. Въ приемахъ по скрупулу, съ медомъ, камедью, сиропомъ, а еще лучше съ пережженою магнезією, которая скрываетъ его острый вкусъ, средство сіе возбуждаетъ чувствительную теплошу въ желудкѣ и кишкахъ и таковое же болѣе или менѣе сильное ощущеніе въ больномъ нервѣ и членѣ; иногда выпустаетъ повсемественный потъ. У нѣкоторыхъ людей перпеншинъ производитъ легкую колику или небольшой поносъ, а въ рѣдкихъ случаяхъ нѣсколько увеличенное или прудное испражненіе мочи. Если приемы будутъ увеличены до дражмы, то опъ того можетъ произойти сильная рѣзь въ животѣ, поносъ, напужное испражненіе мочи (stranguria) и даже рвота; однако сіи припадки непродолжительны и по прекращеніи употребленія лѣкарства сами исчезаютъ. При большой чувствительности пищеварительныхъ органовъ небольшой приемъ опія, или употребленіе

скипидара въ видѣ каши уменьшаютъ его впечатлѣніе на слизистую оболочку желудка (которая у Французскихъ Физиологическихъ Врачей пакъ важна въ патологическомъ отношеніи. П. Ч.)

Такимъ способомъ употребленный скипидаръ оказывается полезнымъ пропивъ сѣдалищной нервной боли, можетъ быть потому, что она наичаще вспрѣчается; впрочемъ и въ другихъ боляхъ онъ дѣйствуетъ весьма хорошо.

Снаружи лучше употребляя перпендинъ въ видѣ втираній; они возбуждаютъ красноту кожи, безъ жара, по направленію нерва. Сильный, проникаемый запахъ лѣкарства часто причиняетъ припомъ боль головы.

Скипидаръ полезенъ при нервной боли простой, т. е., независимой отъ органическаго измѣненія нерва, его воспаленія или прижатія близлежащею опухолью. При равныхъ впрочемъ обстоятельствевахъ тѣмъ больше бываетъ надежды къ выздоровленію, чѣмъ сильнѣе боль, чѣмъ больше она проспирается по направленію нерва и чѣмъ упорнѣе болѣзнь. Только нужно, чтобы желудокъ былъ совершенно здоровъ, дабы послѣ не было надобности оставить употребленіе лѣкарства.

Болезнь на нижних конечностяхъ большею частію излѣчивается въ 12 дней, часто въ 4—6. Употреблять средство долѣе было бы—безъ нужды подвергать опасности пищеварительные органы.

Изъ 70-ти, спрдавшихъ съдалищною и другими нервными болями, 58 выздоровѣло; прое опъ впираній, а всѣ прочіе опъ внушренняго употребленія. Десять, изъ коихъ двое весьма скоро прекрапили употребленіе скипидара, почувспвовали только болѣе или менѣе продолжавшееся облегченіе; а у пяти больныхъ онъ не оказалъ никакой пользы; но двое изъ нихъ спрадали болѣзнями составовъ, опъ копорыхъ, спуспя нѣсколько мѣсяцовъ, умерли.

Въ числѣ сихъ 71 случая (у одного больного было двѣ нервныя боли) 40 были острые, а 31 хроническіе. Изъ острыхъ 34 выздоровѣли, 5 облегчено, а одинъ оспался въ шакомъ же соспоянніи, въ какомъ былъ.

Изъ хроническихъ 24 выздоровѣли, 3 облегчены, а у 4-хъ не послѣдовало никакой перемѣны.

Изъ сихъ больныхъ 33 пользованы были прежде въ другомъ мѣспѣ безъ успѣха; а скипида-

ромъ изъ нихъ вылѣчено 25, облегчено 4, а 4 оспались въ томъ же состояніи.

Въ числѣ 58 совершенно выздоровѣвшихъ 34 вылѣчены меньше, нежели въ 6 дней, 22 пользованы были меньше 12-ми, а 3 опъ 28 до 45 дней.

Въ числѣ вылѣченныхъ было 48 сѣдалищныхъ (двѣ изъ нихъ вылѣчены впираніями), 3 бедренныхъ, 4 плечевыхъ и 3 личныхъ нервныхъ болей.

У 10-ти больныхъ, получившихъ только облегченіе, лѣченіе прекращено на второй день. Всѣ они спрадали сѣдалищною болью.

Наконецъ изъ пяти, не получившихъ никакого облегченія, четверо спрадали сѣдалищною и одинъ бедренною нервною болью.

Notizen von Froriep. Bd. XXIII. стр. 103.

## VII.

### С М Ъ С Ъ.

#### I. *Шпанскія мушки при кори.*

---

А. Matthews въ Челси (военно-сиротское заведение близъ Лондона) испыталъ хорошее дѣйствіе шпанскихъ мушекъ при кори болѣе, нежели во спа случаяхъ. „Шпанская мушка, приложенная на грудь по появленіи первыхъ припадковъ, какъ то: чиханія, печенія слизи изъ носа и слезъ изъ глазъ и еще прежде выступленія сыпи, дѣйствуетъ какъ бы очарованіе и большею частію отвращаетъ имѣющее воспослѣдовать спраданіе легкихъ. Еще недавно пользовалъ я троихъ дѣтей, двухъ вышесказаннымъ, а третьяго, коего родителіи не соглашались на приложеніе мушки, обыкновеннымъ, лучшими Врачами похваляемымъ способомъ. Послѣдній былъ болѣвъ шесть недѣль и теперъ только поправляется, а

первые оба чрезъ двѣ недѣли были уже совершенно здоровы. Я не спану объяснять дѣйствія сего средства; но мнѣ кажется, что изъ сдѣланныхъ мною наблюдений могу вывести слѣдующія заключенія: 1. испанская мушка сокращаетъ и облегчаетъ боль; 2. она если не отвращаетъ спраданія легкихъ, то по крайней мѣрѣ дѣлаетъ его не столь сильнымъ; 3. больные не болѣе расположены къ простудѣ и кашлю, какъ и здоровые, перенесшіе кори; 4. больные выздоравливаютъ скорѣе и надежнѣе.

Notizen von Froriep. Bd. XXIII. стр. 47.

## 2. *Перевязка по вырѣзаніи геморроидальныхъ шишекъ.*

Въ Hôtel-Dieu, въ Парижѣ, въ такомъ случаѣ употребляютъ перевязку, состоящую изъ холстиннаго мѣшечка съ проходящею сквозь него эластическою трубкою. Мѣшечикъ наполняется корпіею и укрѣпляется такъ, чтобы онъ прижималъ части вокругъ задняго прохода. Испражненіе низомъ выходитъ чрезъ трубку, безъ всякой надобности снимать перевязку.

Тамъ же. стр. 160.

### 3. *Иодиновое капи противъ застарѣлыхъ язвъ языка и глотки*

Съ пользою употреблялъ *Мажанди* внутрь, въ растворѣ, не болѣе осьми гранъ въ сушки.

Тамъ же. стр. 176.

### 4. *Лѣченіе перелойнаго воспаленія глазъ.*

1. Докторъ *Генненъ* лѣчитъ сію опасную болѣзнь обильнымъ кровопусканіемъ изъ височной артеріи, въ случаѣ надобности повпоряемымъ, теплыми примочками, чистымъ содержаніемъ глаза и сладкою ртутью, по пяти гранъ на пріемъ, съ опіемъ, внутрь, каждые четыре часа. Менѣе чѣмъ въ двое сутокъ появляется раздраженіе десенъ и болѣзнь ограничивается, какъ можно видѣшь изъ слѣдующаго примѣра.

Солдатъ, 20-ти лѣтъ, выпущенъ былъ изъ госпиталя, гдѣ онъ находился по причинѣ перелоя, и отправленъ въ Депо; причѣмъ у него было еще небольшое слезотеченіе. Дорогою обнаружилось у него воспаленіе лѣваго глаза, съ копорымъ, 14го, поступилъ въ Чапамъ въ лѣченіе Г-на *Геннена*. Глазъ былъ очень рас-



нухій; изъ него стекло много матеріи, сильное  
 chemosis, но роговая оболочка была чиста и  
 зрѣніе не повреждено. Больной жаловался на  
 сильную боль глазнаго яблока и вѣкъ и чувствительность  
 глазъ къ свѣту. Еще продолжалось небольшое печеніе  
 слизи изъ мочеиспускательнаго канала. Больной былъ очень  
 полнокровный; Arteriotomia ad  $\mathfrak{z}$  XXX; submur.  
 hydrarg. gr. V. opii gr.  $\beta$ . quarta quavis hora;  
 foveatur oculus aqua tepida.—15-го. Послѣ кровопусканія  
 облегченіе; опухоль и испеченіе изъ глазъ меньше,  
 но chemosis сильнѣе. *Продолжать лѣкарство и приложку.*  
 Вечеромъ опухоль вѣкъ и chemosis весьма увеличились;  
 большое испеченіе изъ вѣкъ густой желтой матеріи;  
 сильная боль глаза. Слизепеченіе изъ канала  
 прекратилось. Repet. arteriotomia ad  $\mathfrak{z}$  xxvjjj,  
 contin. submur. hydrarg. cum opio et lotus. 16-го.  
 Тотчасъ послѣ кровопусканія облегченіе; опухоль  
 вѣкъ меньше, но chemosis сильно; роговая оболочка  
 чиста. Опять появилось слизепеченіе изъ канала.  
 Contin. submur. hydrarg. cum opio, foveatur oculus  
 solut. sulphat. alum. gr. vj in aquae  $\mathfrak{z}$ j.—17-го.  
 Вѣка опали; chemosis и испеченіе изъ глазъ  
 продолжаются; глазъ не болятъ; зрѣніе сво-

бодное; значительное слюнопечение. *Haustus salinus purgans*. После сего воспаление постепенно уменьшалось и солдат сей выздоровѣлъ совершенно.

Тамъ же. стр. 207.

2. *Дюжюитренъ*, въ *Hôtel — Dieu*, лѣчитъ сие воспаление вдуваніемъ въ глазъ посредствомъ пера или стеклянной трубочки *subturiat. hydrarg.* и вкапливаніемъ *tincturæ opii crocatae*. Порошокъ *subturg. hydr.* вдуваютъ утромъ и вечеромъ, а капли впускаютъ только на ночь, по одной. Сие же лѣчение похваляется и въ воспаленіи глазъ у младенцовъ, только по причинѣ судорожнаго сжатія вѣкъ трудно его произвести.

*La Clinique. T. III. N 77.*

### 5. Бромъ противъ зоба и золотухи.

Докторъ *Пуриш* излѣчилъ двухъ больныхъ, лимфатическаго тѣлосложенія, отъ золотухи и зоба упомянутымъ новымъ средствомъ. Опухоли разрѣшились отъ втиранія мази *hydrobromatis potassæ* и припарокъ, смоченныхъ слабымъ растворомъ брома. Симъ же средствомъ, вмѣстѣ съ употребленіемъ брома внутрь, выдѣченъ зашарѣлый перелой и

злостная опухоль шия. Большой зобъ, въ то время, какъ сообщено сіе извѣстіе, уменьшился  $\frac{2}{3}$ . Онъ даетъ 5 - 6 капель на приемъ раствора одной части брома въ 40 частяхъ воды, увеличивая приемы. Hydrobromas potassæ готовится также какъ hydriodas potassæ; въ день 4-8 гранъ, въ пилюляхъ.

La Clinique. T. III. N. 78.

## VIII.

### ОФФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО ЯЕН- ВАРЯ ПО 1-Е МАРТА 1830 ГОДА.

---

#### 1. Опредѣленіе Медициискихъ Чиновниковъ на высшія мѣста.

*Дивизионными Докторами:* въ 10-ю пѣхотную Дивизию Штабъ-Лѣкаръ 10-й Артиллерійской Бригады Булгаковъ, въ 20-ю пѣхотную Дивизию Старшій Лѣкаръ Грузинскаго Гренадерскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Миронъ. *Старшими Лѣкарами:* въ Бѣлевскій пѣхотный полкъ Штабъ-Лѣкаръ Арзамасскаго Конно-Егерскаго полка Троспянскій, въ пѣхотный Герцога Веллингтона полкъ Младшій Лѣкаръ Могилевскаго пѣхотнаго полка Докторъ Медицины Пельхау, въ Могилевскій пѣхотный полкъ Младшій Лѣкаръ онаго полка Штабъ-Лѣкаръ Савей - Могилевичъ, въ Тульскій пѣхотный полкъ Младшій Лѣкаръ Ревельскаго пѣхотнаго

полка Медико-Херургъ Вержицкій, въ Крыловскій полугоспиталь Штабъ-Лѣкаръ Орденскаго Кирасирскаго полка Мальшинскій, въ Камчатскій пѣхотный полкъ Штабъ-Лѣкаръ Якушкаго пѣхотнаго полка Адамовъ, Лейбъ-Гвардіи въ Гренадерскій полкъ Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка Сливчанскій, въ Грузинскій Гренадерскій полкъ Штабъ-Лѣкаръ Херсонскаго Гренадерскаго полка Плетеневъ, въ Севастопольскій пѣхотный полкъ Штабъ-Лѣкаръ Козловскаго пѣхотнаго полка Спасскій, въ Тульскій Оружейный Заводъ Штабъ-Лѣкаръ онаго завода Баумгардъ, въ Эриванскій военновременный госпиталь Штабъ-Лѣкаръ Каспійскаго Морскаго баталіона Олимпіевъ, въ 10-ю Артиллерійскую Бригаду Младшій Лѣкаръ Полоцкаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій, Ассесоръ Ефеевскій и въ Ингерманландскій Гусарскій полкъ Ординаторъ Могилевско-Бѣлорусскаго военного госпиталя Штабъ-Лѣкаръ Виноградовъ.

## 2. *Вновь поступившіе въ службу:*

*Изъ Императорской Медико-Хирургической Академіи Лѣкаръ 2-го отдѣленія Федоръ Щедринъ въ Могилевско-Бѣлорусскій*

военный госпиталь Ординапоромъ. *Изъ Гражданскаго вѣдомства:* Лѣкаръ Эммануилъ Кумерау въ Сумскій Гусарскій полкъ Младшимъ Лѣкаремъ. *Изъ отставныхъ:* Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Иванъ Босядкій въ Ясскій военновременный госпиталь Ординапоромъ, Докторъ Медицины Эрнстъ Рейнфельдтъ въ Рижскій военный госпиталь Ординапоромъ, Докторъ Медицины Коллежскій Ассесоръ Семенъ Грушинскій въ Бухареспскій военновременный госпиталь Ординапоромъ. *Изъ Вольнопрактикующихъ* Лѣкари: Вилліамъ Тови въ С. Петербургскій военносухопутный госпиталь Ординапоромъ, Іосифъ Герръ во 2-ю армію сверхъ комплекта, Леонъ Жилинскій въ Лубенскій Гусарскій полкъ Младшимъ Лѣкаремъ, Викпоровъ въ 1-й Украинскій полкъ и Доктора Медицины: Василій Геппенеръ въ Ясскій военновременный госпиталь и Фридрихъ Барпельсъ въ Моздокскій военный госпиталь Ординапорами. Сослѣдующій при Московскомъ Кадетскомъ Корпусѣ Учитель Физики и Химіи Докторъ Медицины Иванъ Зацѣпинъ въ оный же Корпусъ Младшимъ Лѣкаремъ.

### 3. Увольненіє отъ службы.

Младшій Лѣкаръ Самогипскаго Гренадерскаго полка Докторъ Медицины Нагумовичъ, Ординаторъ Адрианопольскаго военновременнаго госпиталѣ иноспранный Докторъ Медицины Оппенгеймъ, Ветеринарный Лѣкаръ Малороссійскаго Кирасирскаго полка Кузнецовъ, Полковый Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка Коллежскій Ассесоръ Жезловъ, Бапталіонный Лѣкаръ онаго же полка Лѣкаръ Лейгони, Старшій Лѣкаръ Ингерманландскаго Гусарскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Княжевскій и сосполяцій во 2-й арміи сверхъ комплекта иноспранный Докторъ Медицины Распи.

### 4. Производство въ чиныя званія.

Въ Штабъ - Лѣкари Лѣкари: пѣхопнаго Принца Карла Прусскаго полка Пѣшниковъ, Ординаторъ Моздокскаго военнаго госпиталѣ Кремлевъ, сосполяціе на службѣ во 2-й арміи сверхъ комплекта Прозоровскій и Протопоповъ, пѣхопнаго Фельдмаршала Князя Кушужева-Смоленскаго полка Баневичъ, 2-го

піонернаго баталіона Розовъ, 39-го Егерскаго полка Алюмовъ, бывшаго Таманскаго Гарнизоннаго полка Озеровъ, Черноморскаго Козачьяго войска Кашкадамовъ, Конно-Артиллерійскихъ роты: Но 12-го Валицкій, Но 24-го Болховитиновъ, Оренбургскаго Козачьяго войска Но 8 и 9-го Шумовъ, 3-го резервнаго баталіона Охотскаго пѣхотнаго полка Торвицкій, Кавказскій Гренадерской Артиллерійской Бригады Горскій, Младшій Лѣкаръ 50-го Егерскаго полка Квяпковскій, Ординапоръ Олыкского военного госпиталя Герасимовичъ, Севастопольскаго пѣхотнаго полка Куршуковъ, 39-го Егерскаго полка Бѣльскій, Кавалергардскаго полка Шрептеръ, Нейшлотскаго пѣхотнаго полка Селлинень, Мингрельскаго пѣхотнаго полка Инкинъ, Черниговскаго Конно-Егерскаго полка Дмишровскій, Нѣжинскаго Конно-Егерскаго полка Максимовичъ, Московскаго Драгунскаго полка Афанасьевъ, 3-го баталіона Вишебскаго пѣхотнаго полка Вейсъ и Эриванскаго Карабинернаго полка Макаровъ. *Въ Ветеринарныя Лѣкари* Ветеринарный Помощникъ Ново-Александровскаго военно-конскаго завода Киселевъ.



5. *Награды.*

За отлично-усердную службу Всемилостивѣйше награждены *чинами*: Коллежскаго Совѣтника состоящій при Штабѣ военныхъ поселеній Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Миллеръ; Надворнаго Совѣтника Полковый Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Егерскаго полка Докторъ Медицины и Хирургіи Чаруковскій; Коллежскаго Ассесора Лейбъ-Гвардіи 2-й Артиллерійской Бригады Штабъ-Лѣкаръ Краковецкій; разжалованному изъ Штабъ-Лѣкарей въ фельдшера состоящему при Омскомъ военномъ госпиталѣ Егору Никипину возвращено званіе Лѣкаря 2-го отдѣленія. *Орденами* Св. Анны 2-й степени, *Императорскою Короною украшенными*, Корпусный Штабъ-Докторъ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса Коллежскій Совѣтникъ Ильяшенко. *Денежными награжденіями* единовременно: 600 р. Младшій Лѣкаръ Кавалергардскаго полка Лѣкаръ Шрептеръ, 500 р. Штабъ-Лѣкаръ 1-го Учебнаго Карабинернаго полка Имѣровъ, 900 р. Дивизионный Докторъ 27-й пѣхотной Дивизіи Надворный Совѣтникъ Орловъ,

400 р. Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи сводной Артиллерійской Бригады Филиповъ, *полугодовыи жалованьи* Ординапоръ Бобруйскаго военного госпиталѣ Штабъ-Лѣкаръ Финдейзенъ, 300 р. Ординапоръ онаго же госпиталѣ Лѣкаръ Мадейскій, 350 р. 13-го Егерскаго полка Докторъ Медицины Беръ, 800 р. Старшій Лѣкаръ Выборгскаго военного госпиталѣ Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Эрнъ, 500 р. Петровскаго пѣхотнаго полка Медико-Хирургъ Гриневскій, Старшій Лѣкаръ 23-й Артиллерійской Бригады Штабъ-Лѣкаръ Буповскій, Егерскихъ полковъ Штабъ-Лѣкари: 45-го Герцъ, 46-го Гаузенъ и Штабъ-Лѣкаръ Выборгскаго пѣхотнаго полка Андреевъ, 400 р. Ординапоръ Гельсингфорскаго военного госпиталѣ Еленевъ и 3,000 р. Эриванскаго Карабинернаго полка Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Силичъ. *Подарками:* Штабъ-Докторъ военныхъ поселеній Дѣйствительный Спашскій Совѣтникъ Далеръ и состоящій при С. Петербургскомъ баталіонѣ военныхъ кантонистовъ Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Семперовичъ. За выслугу лѣтъ Всемилостивѣйше пожалованъ пансіонъ Ординапору Ряжскаго военного госпиталѣ Спаш-

скому Совѣднику Корниловичу по 750 р. и  
Старшему Доктору Бобруйскаго военного  
госпиталя Штабъ-Лѣкарю Коллежскому Со-  
вѣднику Глинскому по 600 р. въ годъ.

### 6. Умершіе:

Ординапоръ С. Петербургскаго военносуд-  
опупнаго госпиталя Штабъ-Лѣкаръ Спаш-  
скій Совѣдникъ Бурмовскій, Ветеринарный  
Лѣкаръ 1-го Бугскаго Уланскаго полка Ива-  
новъ, Ординапоръ Бургасскаго военновре-  
меннаго госпиталя Прусскій Докторъ Медицины  
Донапъ, Ординапоръ Бальчикскаго военно-  
временнаго госпиталя Лѣкаръ Парвицкій,  
Старшій Докторъ Адрианопольскаго военно-  
временнаго госпиталя Спашскій Совѣдникъ  
Амонъ, Ординапоръ онаго же госпиталя Лѣ-  
каръ Александровскій, Младшій Лѣкаръ 11-го  
Егерскаго полка Никипинъ, сослужившій во  
2-й арміи сверхъ комплекта Лѣкаръ Волковъ,  
Старшій Медикъ 1-й Конно-Егерской Диви-  
зій Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣдникъ  
Чепрековскій, Старшій Лѣкаръ Севасто-  
польскаго пѣхотнаго полка Неаполитанскій,  
Штабъ-Лѣкаръ Конно-Артиллерійской № 30-го  
роты Еленевъ, Штабъ-Лѣкаръ 3-го баталіо-

на 14-го Егерьскаго полка Хамовскій, Ординапоры Адрианопольскаго военновременнаго госпиталля Лъкари: Герасимовъ, Лосевъ и Барбишъ, Иностраннѣй Докторъ Пикфордъ, Базарджикскаго военновременнаго госпиталля Лъкари Амелунгъ и Шпельцнеръ, Айдосскаго военновременнаго госпиталля Лъкаръ Брюннеръ, Одесскаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лъкаръ Феоктистовъ и Лъкаръ Лутеръ, состоявшій во 2-й арміи сверхъ комплекта Веперинарнѣй Лъкаръ Орловскій, Шпабъ-Лъкаръ Московскаго пѣхотнаго полка Миловидовъ, Ординапоръ Бальчикскаго военновременнаго госпиталля Лъкаръ Миньковскій, Ординапоръ Базарджикскаго военновременнаго госпиталля Лъкаръ Шмитъ, Ординапоръ Мангальскаго военновременнаго госпиталля Лъкаръ Никишинскій, Шпабъ-Лъкаръ Линейнаго Оренбургскаго баталіона № 2-го Коллежскій Ассесоръ Пономаревъ, Баталіоннѣй Лъкаръ Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка Шпабъ-Лъкаръ Майнзенгельдеръ, Ординапоръ Ясскаго военновременнаго госпиталля Лъкаръ Гобделасъ, Ординапоръ Базарджикскаго военновременнаго госпиталля Лъкаръ Дебрскій, Ординапоръ Анхіольскаго военновременнаго

госпиталю Лѣкаръ Марквартъ, Лѣкаръ резервной Бригады 3-й Артиллерійской Дивизіи Краковскій, Ординапоръ Мангальскаго военновременнаго госпиталя Лѣкаръ Сабининъ, Ветеринарный Лѣкаръ Кинбургскаго Драгунскаго полка Качинъ, Ветеринарный Помощникъ 1-го отдѣленія Скопинскаго военноконскаго завода Зиновьевъ, Ветеринарный Лѣкаръ Смоленскаго Уланскаго полка Ивановъ и Лѣкаръ Тенгинскаго пѣхотнаго полка Карцовъ.

#### 7. Штрафъ.

За преданіе пьянству отсчитывается отъ службы Ординапоръ Аландскаго военнаго госпиталя Лѣкаръ Николаевъ.

---


#### О подпискѣ на новую книгу.

Любители чтенія и наукъ симъ извѣщаются, что въ не продолжительномъ времени выйдетъ въ свѣтъ первая часть книги подъ заглавіемъ Путешествіе Доктора Р. Ниберга по Германіи, Италіи, Швейцаріи, Франціи, Англіи и Нидерландамъ въ 1828 и 1829 годахъ; оно содержишь въ себѣ опи-


санія главныхъ городовъ Европы, учебныхъ, богоугодныхъ и лѣчебныхъ заведеній, увеселительныхъ мѣстъ и прочихъ достопримѣчательностей. Полное сочиненіе будетъ состоять въ трехъ частяхъ. Цѣна первой части 8 руб. съ пересылкою. Подписка принимается въ Санктпетербургѣ у самаго сочинителя въ большой миллионной въ домѣ Г-на Графа Купайсова подъ N 3, и въ книжныхъ лавкахъ Коммисіонера Императорской Академіи наукъ Ивана Глазунова, состоящихъ въ госпитальномъ дворѣ по суконной линіи подъ N 9, и противъ госпитального двора зеркальной линіи въ домѣ Генераль-Маіора Балабина подъ N 27, въ Москвѣ у сына его Петра Глазунова на Никольской улицѣ въ домѣ его подлѣ Синодальной Типографіи и Ремесленной Управы подъ N 2 и противъ Казанскаго Собора подъ N 3 и 4-мъ.

Иногородные Особы благоволять адресоваться на имя Ивана Петрова Глазунова въ С. Петербургъ.

*Fig. 1.*



*Fig. 2.*











ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ  
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.

---

ЧАСТЬ XV. N.2.

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ ИВЕРСЕНА.

1850 ГОДА.



*Slovanská knihovna*

**SLOVANSKÁ KNIHOVNA**

**3188276756**



ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

# ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ  
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

155364/2

Часть XV. N. 2.

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:  
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

Cafo.

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ ИВЕРСЕНА.

1830 года.



I.

О СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЕВРОПЕЙ-  
ЦОВЪ ВЪ ЖАРКИХЪ СТРАНАХЪ.

*Замѣтанія Англійскаго Врача Маддена.*

Жалко видѣть пагубное вліяніе Восточ-  
наго климата на здоровье Европейцовъ, въ осо-  
бенности Англійскихъ путешественниковъ, и  
рѣдко проходимъ недѣля безъ того, чтобы  
не увеличилось число жертвъ несчастныхъ  
предпріятій! Бывъ въ теченіи нѣсколькихъ  
лѣтъ свидѣлемъ, сколь много Европейцовъ  
погибло отъ собственнаго неблагоразумія бо-  
лье, нежели отъ какой либо опасной болѣзни,  
я рѣшился сказать нѣсколько словъ о сохра-  
неніи здоровья путешественниковъ въ  
сихъ странахъ и представить правила, со-  
ставленныя мною изъ печальныхъ наблюденій.

Спрана, которую хотѣли бы посвятить,  
была гробомъ многихъ изъ вашихъ соотече-



спивенниковъ. Я спрашивалъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ, и меня увѣрили, что несчастный конецъ ихъ жизни надлежитъ приписать неосторожности ихъ въ отношеніи къ болѣзнямъ и неправильному леченію. Это, кажется, не очень удивительно; въ леченіи двухъ лѣтъ я видѣлъ, что въ Нижнемъ Египтѣ погибли при Врача отъ собивеннаго неблагоприятнаго леченія.

Не бывъ въ Египтѣ и Аравіи, не лзя имѣть доспаіочнаго понятія о болѣзняхъ, господствующихъ въ сихъ странахъ. Европейскій способъ леченія рѣдко можно употреблять съ пользою въ болѣзни, совершенно измѣненной климатомъ; болѣзнь, которую мы лечимъ рипуною, какъ специфическимъ средствомъ, здѣсь природные излечиваютъ безъ рипуны.

Нашуужный поносъ въ Египтѣ весьма оплиненъ отъ случающагося въ Англіи; лихорадка въ Александріи или Кипрѣ также имало не походитъ на Манкашейрскую; и если вы надѣетесь излечить одну изъ сихъ болѣзней сладкою рипуною, а другую хининомъ, въ такихъ же приемахъ, какъ и дома, то вы жестоко обманаетесь. Крапкое обзоріе сего



предмета должно быть занимательно не только для Врача, но и для других: поелику оно может служить путешественнику предостережением отъ опасностей, которыя постигли его предшественниковъ и были причиною неудачи многихъ предпріятій въ Африкѣ.

Джонсонъ въ своемъ превосходномъ сочиненіи *о болѣзняхъ жаркихъ климатовъ* (\*) говоритъ, что человекъ лучше другихъ животныхъ переноситъ разныя вліянія климата при переходѣ изъ сѣвернаго въ тропическій; однако эшимъ онъ болѣе обязанъ своему уму, нежели удобопривыкаемости своего плъма. Запасаясь одеждою сообразно температурѣ, онъ можетъ защищаться отъ холода и жара, и соображаясь въ родѣ жизни съ качествомъ климата, можетъ умѣрять его вліяніе, какъ бы различно оно ни было. Жители жаркихъ странъ еще болѣе шерстятъ въ холодномъ климатѣ, нежели мы въ жаркомъ. На оспровѣ Кандіи видѣлъ я сопки Арабовъ, погибавшихъ отъ зимней спужи, которая для меня казалась пещерою нашей весны; равнымъ образомъ въ Александріи видѣлъ я цѣлые отряды Нег-

---

(\*) См. В. М. Ж. Часть XI.

ровъ-солдапъ, въ нѣсколько дней испребленныхъ дѣйствіемъ спужу. Впрочемъ уныніе духа имѣло большое вліяніе на сію смерпность; духъ Араба нимало не придаеетъ силъ его пѣлу къ перенесенію прудносней, копорья прежде были ему совсѣмъ неизвѣстны; Негръ не имѣетъ нравспвенной силы, могущей поддержать его во время недуга, причиненнаго перемѣною климапа или морскимъ вѣп-ромъ; а между пѣмъ ничпо такъ не про-пивоудѣйспвуешъ вреднымъ вліяніамъ перемѣннаго климапа на слабое пѣло чловѣка, какъ крѣпость душевная.

Въ жаркихъ спрапахъ, по моему мнѣнію, болѣе всего необходимо укрѣплять пѣло дѣя-пельносцію нравспвенныхъ силъ; другими словами: пропивоудѣйспвовалъ ослабляющему вліянію климапа живосцію воображенія, весе-лостью и бодростью духа. Это скорѣе изба-витъ путешеспвенника опъ болѣзней, не-жели всѣ предохранительныя средства *Корри* и *Мозели*. Я видѣлъ на Европейцахъ пагубныя слѣдспвія слабосці духа и вспыльчиваго ха-рактера. Для разогнанія унынія они часто прибѣгають къ бупылкамъ и спаканамъ, какъ будпо бы крѣпость зависѣла опъ временнаго

возбужденія и раздраженія, влекущаго за собою изнеможеніе. Всѣ Англійскіе ремесленники, опредѣлившіеся къ Мегемешу-Али, сдѣлались жерпвою климаша или, лучше сказать, своей невоздержности. Я лечилъ одного изъ нихъ опть бѣлой горячки, причиненной неумѣренностію, но не могъ спасти его. Пупешесивенники не бываютъ невоздержны до пакой степени; но они вообще хопянтъ жипъ пакъ, какъ жили дома, сполько же и поже самое кушаѣтъ и пипъ; они не знаютъ, что по, что въ холодномъ климатѣ можно назваѣтъ умѣренностію, въ жаркомъ еспъ уже невоздержности; они не должны искапъ въ Индіи примѣрнаго образа жизни и обманываѣтъ себя мыслию, что currie и sangarie опмѣнно полезны для слабаго желудка; они должны помнипъ, что перецли изъ температуры 54 или 56° по Фар. въ температуру 100° и болѣе въ пѣни, а на солнцѣ превышающую теплоту ихъ крови, что единственное средство уменьшаѣтъ непомѣрный жаръ еспъ испарина, что все принятое внутрь, если оно возбуждаѣтъ кожу выше извѣстной степени, влечѣтъ за собою разслабленіе, и что всякая наружная прохлада уничтожаѣтъ дѣятельность кожи

и полагаесть основаніе болѣзнямъ, отъ коихъ изнемогають иноспранцы и коихъ природные жипели вообще не подвержены. Индійцы не спрадають недугами печени; Египтяне рѣдко подвергаются послабляющей желчной горячкѣ; напужный поносъ рѣдко случается у Арабовъ. Болѣзни, коихъ мы на Воспокѣ, болѣею частію слѣдуесть приписать нашей невоздержности. Во всѣхъ жаркихъ климахахъ пищевареніе новоприбывшихъ болѣе или менѣе распроеивается; желудокъ, равно какъ и весь организмъ, ослабѣваетъ. Напрасно будемъ мы возбуждать ихъ раздражающими средствами, либо подкрѣплять себя щипательною діеткою; желудокъ не въ состояніи ее переварить, и поному нужно уменьшать количество живошной пищи.

Но въ жаркихъ климахахъ не только пищевареніе распроеивается, да и самое качество пищи увеличиваетъ сіе распроеивство. Баранина очень худа въ Египтѣ, а говядина жеспка и пверда для слабого желудка.

Рисъ составляетъ наилучшую пищу въ жаркихъ спранахъ; въ видѣ *пиллава* онъ довольно вкусенъ и рѣдко или никогда не обременяетъ желудка. Пища, употребляемая всѣми

Восточными народами, безъ сомнѣнія для нихъ самая лучшая; природные обычаи рѣдко бываютъ безъ причины, а наши соплеменники очень склонны презирать все то, къ чему они не привыкли. Французъ старается приспособляться къ обстоятельствамъ, а Англичанинъ хочетъ, чтобы обстоятельства къ нему приспособлялись. Изъ одного приспособленія къ странѣ, которую *Джентельмены* послѣ обѣда называютъ удивленіемъ свѣта и завидною для сосѣднихъ народовъ, онъ презираетъ все не-Англійское въ нравахъ и обычаяхъ, въ религіи и климатѣ, въ одеждѣ и пищѣ. Патриотизмъ безъ Философіи есть величайшее заблужденіе.

Европеецъ можетъ наблюдать свой національный характеръ, не дѣлаясь врагомъ всѣхъ обыкновеній, несвойственныхъ его природной странѣ; для него не унижительно промѣнять свою шляпу на пюрбанъ, когда солнце стоитъ прямо надъ головою, или вмѣсто панталоновъ надѣть Турецкіе *inexpressibles* (шавары), когда нужно согнуться въ *канжи* или влѣзть на верблюда.

Восточное платье рѣшительно есть самое приличное климату; природные спра-

ведливо почищаютъ пюрбанъ и поясъ необходимымъ для здоровья: ибо они содержатъ въ шепль ить часщи, копорья Европейцы не-  
 благоразумно спараюлися содержатъ какъ можно  
 прохладнѣе. Воспочное плащье также весьма  
 полезно иноспранцу и для предоспорожноти.  
 Правда, чпо Европейцу прудно переодѣться  
 шакъ, чпобы и при внимательномъ разсма-  
 приваніи приняли его за природнаго; но во вся-  
 комъ случаѣ, на дорогѣ и въ деревняхъ, копо-  
 рья ему надлежитъ проѣзжать, онъ избежитъ  
 чрезъ шо многихъ ругательствъ, а нерѣдко и  
 самыхъ камней; онъ будетъ льститъ Ара-  
 бамъ, соображаясь съ ихъ обычаями и одеждою,  
 и если, по счасію, онъ имѣетъ длинную съ-  
 дую бороду, шо его вездѣ будутъ почищать  
 за мудраго и уважать. При встрѣчѣ съ Ара-  
 бами я неоднократно обязанъ былъ безопас-  
 ностию въ пупешествіи своей бородѣ; я слы-  
 халъ, чпо многіе клялись ею, а болѣе набож-  
 ные жалѣли, чпо она на подбородкѣ невѣрнаго.

Совѣтъ Маіора *Денгала* Европейцамъ  
 пупешествовашъ въ одеждѣ Франковъ почи-  
 паю я самымъ неблагоразумнымъ. Арабы пре-  
 зираютъ насъ болѣе за нашу одежду, нежели  
 ненавидятъ за нашу вѣру; наше узкое плащье

не только кажется имъ смѣшнымъ, но и нескромнымъ, и, по ихъ мнѣнію, одежда наша дѣлаесть насъ похожими на обезьянъ.

Въ Дамаскѣ приготавлиють для рубашекъ родъ шелкового крепу, который соотвѣтствуетъ жаркому климату лучше бумаги или холста. Путешественникъ долженъ записать сею маперією, и припомъ поминъ, что одинъ славный писатель почиаетъ чистое бѣлье и чистую совѣсть существенными потребностями путешественника - Христианина. Въ степи не достаетъ воды для мытья бѣлья; но горячій песокъ и палящее солнце помогаютъ сему недоспадку. Каждый полдень, когда караванъ отдыхаетъ, путешественникъ долженъ разослать на песку вчерашнее бѣлье и оставить оное на солнцѣ часа на два; сего времени достаточно для уничтоженія безпкойныхъ насѣкомыхъ. Ящерица, сколько мнѣ извѣстно, есть только одно животное, могущее переносить палящія лучи солнца въ пескахъ пустыни.

Многіе путешественники по окончаніи дневнаго пути потчасъ обмываютъ ноги холодною водою. Обыкновеніе сіе весьма опасно; это останавливаетъ испарину, отъ чего часто

черезъ нѣсколько часовъ обнаруживается горячка. Баня, гдѣ только можно ее имѣть, на другой день послѣ дороги не только освѣжаетъ, но и уменьшаетъ возбужденное состояніе, препятствующее успокоенію чрезъ многія ночи послѣ штигослнпаго пупи. Вообще пупешесопвенникъ долженъ избѣгать на Воспокъ холодныхъ ваннъ, а особливо при температурѣ выше 70°. Иногда, не смотря на всѣ предосторожности, чувствуютъ онъ лихорадочныя припадки во время пупи; но это нмало неопасно, только бы онъ послушалъ при семъ благоразумно. Біеніе въ вискахъ, кровью налипые глаза, красныя щеки, сухость во рту, шопнопа случающаея иногда опть усталости и продолжительнаго пребыванія на солнцѣ; но сіи припадки благоразумными мѣрами уничтожаются въ одну ночь, а опть неправильнаго леченія превращающаея въ горячку, поносъ и завалы печени.

Въ самомъ началѣ больной долженъ обмывать ноги въ горячей водѣ, въ продолженіи ночи прииять при или чепыре приема фосфорно-сюрмяной извести (*subphosphas calcariae stibiatus*, Ph. Castr), въ при грана каждый, и пить много теплаго рисоваго отвара. Поупиру



принять слабительное изъ крѣпкаго памарин-  
доваго отвара, и по крайней мѣрѣ въ эпоху дѣй-  
ствительнаго голода, воздержаться отъ плотной пищи, а животно-  
ной не употреблять, пока не исчезнутъ ли-  
хорадочные припадки. Слабительныя необхо-  
димы, пока продолжаются значительныя при-  
падки; но слабительныхъ солей рекомендовать  
я не могу: послѣдствіе кишечно-желудочнаго бы-  
тія весьма раздражительно, и, мнѣ кажется,  
нерѣдко видѣлъ я отъ нихъ вредъ.

Нѣтъ ничего вреднѣе мнѣнія нашихъ пу-  
тешественниковъ, что послѣ успалости нужна  
имъ болѣе пищи, нежели въ другое время. Ли-  
хорадочное состояніе, сопровождающее успа-  
лость, отнимаетъ у желудка силу и онъ  
тогда не въ состояніи переварить пищи. Че-  
ловѣкъ чувствуетъ себя изнемогающимъ и  
старается возбудить аппетитъ и подкрѣ-  
питья ромомъ или гакее, со вредомъ для  
своего здоровья, между тѣмъ какъ нѣсколько  
часовъ отдохновенія освѣжили бы его тѣло и  
возбудили бы естественный позывъ на ѣду.

Въ дорогѣ путешественнику нужно быть  
болѣе обыкновеннаго воздержнымъ; пища его  
должна быть самая прѣсная; оспанавливаясь  
на ночь, онъ долженъ отдохнуть часа два

прежде упопребленія пищи и умышья не прежде захожденія солнца, и припомъ ключевою водою. Онъ замѣняютъ, что Арабы рѣдко или совсѣмъ не пьютъ днемъ и нѣкоторымъ образомъ подражаютъ своимъ верблюдамъ, запасаясь водою на ночь. Подъ палящимъ солнцемъ спятъ чѣмъ больше пьешь, тѣмъ больше поминься жаждою; а это всего болѣе сопряжено съ опасностію оспановишь испарину.

Почти невѣроятно, сколь малымъ количествомъ пищи довольствуются Бедуины. Обыкновенная порція Бистарейнскаго Араба не превышаетъ 12-ти унцій чернаго хлѣба и соленаго сыру, съ немногими сухими финиками (dates), и они почти никогда не бываютъ ничѣмъ болѣе. Я не видалъ народа пертвливѣ ихъ; они гибкаго тѣлосложенія, удивительно проворны и въ ихъ черныхъ глазахъ отражается распорочность и живость. Если бы они жили въ городахъ, то бы въ вчерашеро и вчерашеро болѣе спрадали бы. *Абернетти* справедливо говоритъ, что мы ѣдимъ и пьемъ вдвое болѣе, нежели нужно; мнѣ же кажется, въпрое.

Въ пустынь путешественнику нужно переносить многія трудности, изъ коихъ ве-

личайшая состояишь въ худой, часто гнилой, соленой водѣ. Онъ долженъ поправляишь ее ромомъ или финиковою водкою; безъ шого или другаго поправляющаго средсва подвергается онъ опасности разспроишь брюшныя внушренности или препертъшь опасную горячку. Однако, водка не соспавляеишь лучшаго средсва для поправленія воды; горькая, по моимъ замѣчаніямъ, лучше поправляется сѣрною кие-лошою, а гнилая углемъ.

Если я находилъ испочникъ, издающій сѣрный запахъ, то сожигалъ всѣ спебли, какіе только могъ найши, клалъ угли въ наши мѣшки для воды, копорая на другой день вообще дѣлалась безцѣпшною, а запахъ и вкусъ ея удивишельно поправлялись. Вода Нила, кажеишь мнѣ, здоровѣе воды всѣхъ рѣкъ въ свѣтѣ; даже мушная, каковою бываетъ при его разлиши, съ осадкомъ лиши въ полипоры на днѣ сосуда, и наполненная живошными, примѣпными для глазъ, она не шерлеишь своихъ полезныхъ свойспвъ; напоишь шого своего легкослабянцего силою благопріацспвуеишь здоровью. Иноспранцы вообще бояиши пишь глакую воду; но эио вовсе неосновательио: желу-

дочный сокъ, въроятно, въ нѣсколько минутъ можетъ уничтожить живописныхъ.

Несправедливо также полагать, что спиртные жидкости нужны для поправленія воды Нила. Мнѣ кажется, что замѣчаемыя въ ней живописныя часто служащія только предлогомъ къ невоздержности. Я еще разъ оспариваю Европейцовъ о ихъ употребленіи спиртныхъ напитковъ въ степи или на берегахъ Египта. Ослабѣвшій желудокъ не въ состояніи перенести такого раздраженія, а частное поврежденіе онаго неминуемо повреждаетъ печень.

Говоря вообще, путешественникъ поспутивъ благоразумно, если спящій уважитъ мнѣніе, даже предразсудки природныхъ жителей касательно того, что полезно и что вредно. Не изслѣдывая, почему египтяне прожываютъ худое, перевареніе и поносъ, онъ хорошо поспутивъ, когда не будетъ ее ѣсть; если онъ щадитъ свою желчь, то, не разлагая Египетскихъ яицъ, пусть ихъ совсѣмъ не проглатываетъ, и не разсуждая о вліяніи луны и солнца, онъ поспутивъ осторожно, укрывая свою голову въ полдень хлопотнымъ шорбаномъ; спрашивается воспаленія глазъ и напухлаго

повоса, пусть покрываетъ онъ голову и шѣю въ пущинѣ послѣ сумерокъ: ибо роса производитъ болѣзненные припадки, которые Арабы и Левантійцы приписываютъ вліянію луны. Онъ всегда долженъ помнить, что большая часть болѣзней, погубившихъ его предшественниковъ, произошла отъ прерванной испарины. Кожа находится въ большомъ сочувствіи съ кишечнымъ каналомъ; расстройство управления одного изъ сихъ органовъ влечетъ за собою неправильное дѣйствіе другаго. Сочувствіе между печенью и кожей не менѣе явлено, и за внезапную проспудую обыкновенно слѣдуетъ неправильное отдѣленіе желчи.

Я не намѣренъ общоупотребительно разсматривать болѣзней жаркихъ климатовъ. Сочиненіе Доктора *Джонсона* таковой прудъ дѣлаетъ измѣненнымъ. Каждый путешественникъ на Востокъ долженъ имѣть его книгу и неромѣнно вѣрить его совѣщаніямъ. Всякому намѣревающемуся ѣхать въ Египетъ и Аравію советуюсь бы я приобрести нѣкоторыя общія свѣдѣнія въ Медицинѣ и познакомиться съ употребленіемъ данцева. Это можетъ спасти ему жизнь. Онъ долженъ опасаться немногихъ болѣзней; но онъ при неправильномъ леченіи вообще пагубны,

а при надлежащемъ нимаю неопасны. Онѣ суть: 1. чума, *pestis*, 2. напужный поносъ, *dysenteria*; 3. воспаление глазъ, *ophthalmia Aegyptiaca*, 4. послабляющая желчная горячка, *febris biliosa remittens*, 5. лихорадка, *febris intermittens*, 6. воспалительная горячка, *synocha*. О первой говорилъ я уже довольно обстоятельно (\*). Напужный поносъ весьма извѣстенъ мнѣ изъ опытности. Я вскрывалъ тѣла семи Англійскихъ мапросовъ, умершихъ отъ сей болѣзни въ Александрію, и почти у всѣхъ нечелъ спрадала болѣе или менѣе. *Дрѣ Шрейберъ* подтвердишь это.

Для леченія есть только два надежныя средства: заблаговременное, обильное и повпоренное кровопусканіе и большіе, часто повпоряемые приемы сладкой рпуши, пока она подѣйствуетъ на десны, а потомъ въ меньшихъ приемахъ, продолжая оныя нѣсколько дней. Последнее я предпочитаю. Въ напужномъ поносѣ сладкая рпушь по всей справедливости заслуживаетъ названіе специфическаго средства. Я рѣдко давалъ менѣе 12-ти гранъ, при разѣ въ день, а часто и по 20-ти. Коль скоро

---

(\*) См. предидущій N. сего Журнала.

она окажетъ дѣйствіе на слюнные желѣзы, что опасныя припадки пошчасъ исчезають.

Воспаленіе глазъ можетъ быть преодолено только обильными кровоиспражненіями, повпоряя оныя до тѣхъ поръ, пока исчезнуть всѣ признаки воспаленія. Теплая примочка изъ опвара малвы, съ нѣсколькими гранами укусокислаго свинца, весьма облегчаетъ и полезна во всякомъ періодѣ; а въ хроническомъ состояніи съ осторожностію надлежитъ употреблять примочку изъ квасцовъ. Болѣзнь сія болѣе другихъ пребуетъ спрогой діеты и порядочныхъ слабительныхъ.

Желчная послабляющая горячка весьма опасна; и для путешественника очень важно различать ее: ибо я знаю, что многіе Европейцы погибли отъ того, что болѣзнь сія принята была за простую лихорадку. Гдѣ только происходить разложеніе расщипельныхъ и живошпныхъ шѣлъ, много финиковыхъ деревьевъ, гдѣ находятся солончаки и расщепъ тучная права, тамъ надобно опасаться міазмы, производящей послабляющую желчную горячку. Опличительные признаки оной суть: раздражительность желудка, давленіе подъ ложечкою, скоро появляющійся

бредъ и нечислая желтизна глазъ; попомъ рвошна темноцвѣтнѣю, вязкою желчию, полноша въ правомъ боку, жеспокая боль головы, малый, частый пульсъ и весьма перѣдко поносъ.

Лечение должно бытъ дѣятельное; ибо горячка совершаетъ свое печеніе опъ прехъ до семи дней; рѣдко продолжается двадцать. Первое средство должно соспавлять кровопусканіе до 15-20 унцій, которое на другой день, если нужно, повторяется, послѣ чего дается десять гранъ солянокислой ртутни съ граномъ опія при раза въ день, въ продолженіи 4-5 дней или пока появился слюнотеченіе; при этомъ каждый вечеръ шесть гранъ фосфорно-сюрмяной извести. Рвотнаго опіюда не принимають; но каждый день нуженъ пріемъ кашнороваго масла или *extracti colocynthis*. Во время сильнаго жару, при сухой и горячей кожѣ, надлежитъ обмывать шѣло водою съ уксуомъ. Лечение сіе, какъ я замѣтилъ, рѣдко не было успѣшно; а гдѣ болѣзнь была принята за лихорадку и лечена хинѣю, шамъ съ увеличеніемъ раздражительности желудка, и завалоу печени искодъ болѣею насильно, была смертельна.



Изъ десяти путешественниковъ, посещающихъ Кипръ, Кандію, Ефесъ и Александрію, едва ли одинъ избѣжитъ лихорадки. Къ счастью, при обыкновенномъ спараніи и благо-разуміи ее легко преодолевъ sulphate chinini; но при недоспанихъ онаго послѣдствія бывающъ весьма неблагопріятны, каковыхъ случаевъ видѣлъ я чепырс. На всемъ проспранствѣ Воспока должно бояться близълежащихъ болотъ, озеръ, лѣсовъ, необработанныхъ равнинъ, рисомъ и проспникомъ засѣваемыхъ полей, какъ благопріятствующихъ происхожденію болотной міазмы, которую починающъ за причину лихорадки. До восхода и по закатѣ солнца міазма дѣйствуетъ наисильнѣе; днемъ она мало опасна, а ночью возвышенность на нѣсколько футовъ отъ земли и покровъ отъ росы обезопасивающъ отъ оной. Вредныя пары поднимающъ только на нѣсколько футовъ отъ земли, чему въ Александріи видѣлъ я довольно доказательствъ. Гдѣ оныя исходятъ во множествѣ, тамъ, если не ошибаюсь, чувствительны они для глазъ, обонянія и даже для осязанія. Въ Египтѣ, во время malagiae, на поверхности земли, предъ восходомъ солнца, можно видѣть туманъ,

имѣющій особый, ни съ чѣмъ несравнимый запахъ, производящій, особливо въ сосисахъ, непріятное ощущение холода, проникающаго до самыхъ костей.

Въ Египтѣ и Аравіи лихорадки случаются обыкновенно претъднныя, кои, оспавляя по себѣ большое расположеніе къ возвратамъ въ тоже время года, во всѣхъ хроническихъ случаяхъ производятъ завалы селезенки. Лечение должно быть совершенно опличное опъ леченія послабляющей горячки, и посему-то необходимо различать въ самомъ началѣ сіи двѣ болѣзни.

Для леченія употребляются: сперва рвотное, потомъ слабительное, а въ слѣдующіе два дни небольшіе приемы солянокислой ршупи, съ нѣсколькими гранами фосфорно-сюрмяной извести. По ослабленіи лихорадочныхъ припадковъ надлежитъ употреблять хинную соль, но только во время перемежки, а опнюдь не во время озноба или жара. Ее можно принимать въ пилюляхъ, по при грана, чешыре раза въ день, и увеличивать до 6-8 гранъ, при раза въ день, а для опвращенія возврата продолжать оную цѣлый мѣсяцъ по прекращеніи присуповъ. Если появится боль въ лѣвомъ подреберѣ, что тамъ обыкновенно

случается, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ пиявкамъ и кровососнымъ банкамъ. Арабы весьма искусно приспавляютъ банки, копорыя полезнѣе пиявокъ. Хинная соль, благотворно употребленная, дѣйствуетъ всегда вѣрно и составляетъ превосходное средство на Воспockъ, коимъ всякій путешественникъ долженъ запаснись; иначе онъ самъ будетъ причиною своей смерши отъ сей болѣзни.

Воспалительная горячка есть наспоющая супоща *Куллена*, опасная въ жаркихъ странахъ эпидемическая болѣзнь. Она часпо совершаетъ свое печеніе въ 3-9 дней. Обыкновенную причину сей горячки составляетъ дѣйствіе солнца во время путешествія. Внезапно появляется боль головы, обыкновенно въ затылкѣ, ограничивающаяся однимъ мѣстомъ, потомъ слѣдуетъ рвоша, боль въ поясницѣ, глаза наливаются кровью, лице краснѣетъ, безпокойство и бредъ. Если больной оставленъ будетъ безъ помощи два дня, то смершь приключается на 5-7-й день. Съ самаго начала нужно употребить дѣятельнѣйшее лечение: сперва пустить крови 20 унцій; если боль головы продолжается, то, спустя 6 часовъ, столько же, а въ случаѣ надобности

прибѣгнувъ къ кровопусканію и въ предній разъ; дасть полный приѣмъ extracti colosynthidis или ялапы, а послѣ его дѣйствія, если больного очень пошнипъ, рвотное, на ночь пипъ гранъ солянокислой ртутіи съ такимъ же количествомъ фосфорно-сюрмяной извести и пипъ теплую наливку памариндовъ. Тѣло часто обмываетъ водою съ уксусомъ; при сухой, жесткой кожѣ вмѣсто обмыванія часто употребляетъ я уксусъ съ водою посредствомъ суконной рукавицы, какъ въ банѣ, производя довольно сильное преніе, пока выступитъ легкая испарина. Это приносило удивительную пользу въ нѣхъ случаяхъ, въ коихъ простое обмываніе было безуспѣшно. Дѣйствіе жесткой суконной рукавицы, замѣченное мною въ Турецкой банѣ, касательно возбужденія испарины, подало мнѣ мысль употребить ее сказаннымъ способомъ. Трение сіе въ наискорѣйшемъ времени успокоиваетъ и освѣжаетъ. Солянокислую ртуть и фосфорно-сюрмяную известь нужно повторить на другой день поутру и на ночь, если припадки продолжаются. Слабительныя также слѣдуетъ продолжать; но главное средство въ сей болѣзни состоитъ въ ланцетѣ. Въ обыкновенныхъ слу-

чаяхъ, при крѣпкомъ шѣлосѣ, я рѣдко починая больного въ опасеніи, пока онъ не потерялъ 50-ти унцій крови.

Предсказанныя здѣсь краткія замѣчанія о шеспи главнѣйшихъ болѣзняхъ, коихъ путешественники должны наиболѣе опасаться на Востоцѣ, конечно недоспапчны. Я знаю, что для описанія каждой изъ нихъ нуженъ цѣлый томъ; но вѣроятно, путешественникъ никогда не рѣшится читать подобныя описанія, а сообщаемое мною краткое наспавленіе о леченіи оныхъ, если бы оно появилось нѣсколько прежде сего времени, вѣроятно, спасло бы жизнь многихъ предприимчивыхъ Европейцовъ. Выше упомянулъ я, что *Буркгардъ* и *Бельзони* погибли отъ неправильнаго леченія ихъ болѣзни. Первый изъ нихъ спарался унять свой напужный поносъ наспойкою опія, съ самаго начала болѣзни. Славный Пруссій Натуралистъ, недавно умершій на берегу Чермнаго моря отъ желчной послабляющей горячки, также учинился жертвою неправильнаго леченія. Сопровождавшій его распоронный Арабъ сказывалъ мнѣ, что онъ лечился только хиною и водкою. Я могъ бы привесить еще много несчастныхъ примѣровъ; но и сихъ

довольно уже для показанія, сколь нужно путешественнику имѣть хопя нѣкошорое понятие о болѣзняхъ, о коихъ можно говорить только изъ опытности. Къ сему я прибавлю еще нѣсколько словъ объ аптекѣ путешественника. Въ пуспынѣ затруднительно спасать съ собою большой ящикъ съ лекарствами; нижеисчисленныхъ будетъ достаточно не только для него самого, но и для пѣхъ, кои спанутъ искать у него помощи: ибо онъ увидитъ, что на Воспокѣ лекарства принимають съ бѣльшею благодарностію, нежели другой какой либо подарокъ.

*Аптека путешествующаго въ Африкѣ.*

Sulphas chinini ℥j.

Pulv. cinch. off. ℥ij.

Subphosph. calcariae stibiatae 8 пачекъ.

Submur. hydrarg. ℥jj.

Pulv. r. Rhei ℥jj.

— rad. jalappae ℥jj.

Sulphas zinci ℥j.

Sachari Saturni ℥iv.

Emplastri vesicatorii ℥vj.

Unguenti de spermaceti ℥jj.

Unguenti citrini ℥j.

Unguent. mercurialis ʒiv.

Balsami Capivae ʒiv.

Extracti colocynthides ʒjjj.

Ipecacuanha ʒj.

Pulv. opii ʒj.

Laudani liquide ʒjjj.

Acidi sulphurici diluti ʒiv.

Salis effervescentis Seidlic. въ бупылькѣ 15.

Холстъ, повязки и emplastr. adhaesivum.

Ланцетъ и нососъ для выпягиванія жидкостей  
изъ желудка.

Вѣски.

Johnson on Tropical climates.

Если путешественникъ самъ не будетъ  
имѣть надобности въ сихъ лекарствахъ, то  
онъ долженъ знать, что Турки и Арабы не  
дадутъ ему покою, прося *дова*, такъ что  
онъ не спанетъ послѣ жалбы, что взялъ ихъ  
съ собою, если бы даже починалъ, что бро-  
силъ ихъ собакамъ.

---

---

## II.

### О жизненных припасахъ въ Медико-Полицейскомъ отношеніи.

(Продолженіе).

---

#### Водянистые напитки.

Обыкновеннѣйшіе водянистые напитки суть: 1) вода, 2) пиція водяная, куда принадлежатъ: квасъ, чай, кофе, шоколадъ.

#### В о д а.

*Виды порчи и поддѣсей воды.* Чистая вода едва ли находится въ природѣ (\*). Перегнанная вода (aqua destillata) есть конечно совершенно чистая, однакожъ не совершенно способная для питья и приготовленія яствъ. Напротивъ того вода, содержащая въ себѣ чистый атмосферный воздухъ и углекислоту, есть, какъ извѣстно, самая лучшая, здоровая вода. Равно безвредною, способною для питья, признается и такая вода, которая, кромѣ воздуха и

---

(\*) A Dictionary of Chemistry, on the basis of Mr. Nicholson's by Andr. Ure. London. 1821. Art. *Water*.



углекислоты, содержишь въ себѣ значительную (п. е., весьма малую) примѣсь земляныхъ и соляныхъ частицъ, отъ чего и называется *твердою водою* (aqua dura), для отличія отъ воды, не содержащей сихъ частицъ и попому названной *легкою водою* (aqua mollis). Если же вода содержишь въ себѣ значительное количество земляныхъ и особливо соляныхъ частицъ, равно какъ и гниющихъ въ ней органическихъ нѣтъ, то дѣлается не только чрезвычайно твердою, но и горькоосоленою. Такова, между прочимъ, *вода морская* (aqua marina). По сему виды порчи и подмѣсей воды состоятъ частію въ изнѣженіи, слѣдственно вредномъ, количествѣ, частію же въ худомъ или вредномъ качествѣ постороннихъ веществъ, содержащихся въ водѣ. Таковыя виды суть:

- 1) Мутная вода (aqua turbulenta).
- 2) Гнилая вода (aqua putrida).
- 3) Значительная примѣсь углекислой извести къ водѣ (carbonas calcis).
- 4) Примѣсь гипса (sulphas calcis).
- 5) ——— селитры (nitras potassae),
- 6) ——— солянокислой извести (hydrochloras calcis).

7). Примѣсь поваренной соли (hydrochloras sodae),

8). Присущіе въ водѣ желѣза (aqua ferro impregnata).

9). ————— мѣди (aqua cupro impregnata).

10). ————— свинца (aqua plumbo impregnata).

*Причины порчи и подмѣсей воды.* Главная, ближайшая изъ сихъ причинъ есть способность воды растворять въ себѣ различные вещества, ископаемые, распирительныя и живопныя. Отдаленныя причины частію скрываются въ качествѣ источника, или въ различномъ происхожденіи воды и дальнѣйшемъ ея теченіи, частію же зависятъ отъ произвола жителей. Поелику же вода по происхожденію своему бываетъ ключевая (aqua fontana), рѣчная (a. fluviatilis), озерная (a. pelagica), снѣжная (a. nivealis), дождевая (a. pluvialis), колодезная (a. putealis): по различію почва земли, служащая началомъ или дномъ для воды, благопріятствуетъ болѣе тому или другому виду порчи и подмѣсей воды.

Такимъ образомъ ключевая вода, превосходящая впрочемъ доброюю своею всѣ другія

воды, тогда только имѣетъ всѣ желаемыя качества, когда выпекается изъ кремнистой скалы, имѣетъ песчаное дно, живоспѣ въ самомъ испокѣ и быспрое, непрерывное пение. Если же она выпекается изъ скалы, содержащей въ себѣ металлическія руды, то легко можетъ получить ядовитыя свойства; если дно ея состоитъ изъ мягкаго глинистаго камня, мѣлу, мрамору, или изъ соянаго состава, то вода такая дѣлается, въ большей или меньшей степени, твердою, потому что содержитъ въ себѣ углекислую или сѣрнокислую извѣсь, или же ту и другую вмѣстѣ, съ многими примѣсями. Впрочемъ количество всѣхъ сихъ примѣсей къ ключевой водѣ не можетъ быть значительно: ибо, по *Дальтону* (\*), одинъ только гранъ гипса, растворенный въ 2000 чч. ключевой воды, дѣлаетъ уже оную весьма твердою. Если ключевая вода проводится куда либо чрезъ свинцовыя трубы, то дѣлается еще же ядовитою, какъ и вода, выпекающая изъ металлическихъ скалъ.

Рѣчная вода, выпекающая изъ ручья, состоявляемаго ключевою водою, подходитъ къ сей послѣдней стѣмъ ближе, чѣмъ быспрое же-

---

(\*) Hoffmann. Пр. соч. стр. 8.

ченіе воды, и чѣмъ болѣе каменисто-песчаное дно ея, чѣмъ уже самая рѣка и ближе къ гориспому своему источнику. Вообще рѣчная вода менѣе содержишь въ себѣ земляныхъ и соляныхъ часпей, нежели ключевая, а попому и не споль пверда, какъ сія послѣдняя; но зато содержишь менѣе утлекислоты и воздуха. Самое движеніе рѣчной воды, болѣе вліяніе на рѣчную воду атмосфернаго воздуха и его пецлоты, способствующъ разложенію содержимыхъ въ сей водѣ ископаемыхъ веществъ и газовъ. По причинѣ болѣе своей мягкости вода сія способна для хозяйственнаго или повареннаго употребленія болѣе, нежели ключевая; но касательно употребленія въ пище рѣчная вода весьма уступаешь ключевой. Большія и широкія рѣки, особливо имѣющія иловатое и глинистое дно, содержатъ воду хотя и непвердую, но нечистую, смѣшанную съ иловатыми и земляными часпями. Если рѣки сіи проходятъ чрезъ воздѣланныя полосы земли, то оныя кромѣ того часпо засариваются различными растительными и животными веществами, зарапкою водяными, нерѣдко вредными распеніями (*sicuta aquatica* etc.) и проч. Наводненіе, дожди, буря,

сосѣдство рудниковъ, моченіе въ рѣчной водѣ леньки и льну могутъ также быть причиною худаго качества сей воды. Рѣки, медленно текущія, не всегда имѣютъ хорошую воду; рѣки сіи большею частію, богаты рыбами и чѣмъ богаче, тѣмъ худшую имѣютъ воду; по сему доброты воды рыбныхъ рѣкъ соотносить, можно сказать, почти въ обратномъ содержаніи къ количеству самыхъ рыбъ, находящихся въ рѣкѣ.

Вода проспаныхъ озеръ степенью чистоты и твердости своей подходитъ къ рѣчной. Если однако озеро не имѣетъ значительной глубины, если оно сходно болѣе съ дождевою лужею или съ искокомъ воды, остающимся въ низменныхъ, углубленныхъ мѣстахъ послѣ наводненія: то вода оного не только бываетъ мутна, но даже гнила и совершенно испорчена, потому что разнородныя вещества, покрывающія дно и (по себѣ уже грязные) берега сего водохранилища, почти безпрерывно разлагаются отъ вліянія солнечной теплоты и воздуха, сообщая такимъ образомъ водѣ вредныя, ядовитыя качества.

Дождевая вода довольно мягка и чистотю своею, особливо легкостию, подходитъ

къ перегнанной водѣ, но также, какъ и сія послѣдняя, несовершенно способна для пищья, именно, по недоспашку въ ней воздуха и особливо углекислоты. Впрочемъ, очевидно, чистота ея зависитъ, прежде всего отъ степени чистоты воздуха во время дождя, такъ что, по словамъ *Бюргера*, (\*) дождевая вода есть щелокъ воздуха. Посему за городомъ, въ удаленіи отъ жилыхъ мѣстъ, дождевая вода чище, нежели внутри города; посему же весною, въ полдень и послѣ нѣкотораго уже продолженія каждаго дождя вода сія бываетъ чище, нежели въ другія времена года, дня и въ началѣ каждаго дождя. Равно дождевая вода, спакаящая съ крышъ домовыхъ, теряетъ весьма много своей чистоты и нерѣдко содержитъ въ себѣ примѣсь желѣза, даже свинца, мѣди и другихъ постороннихъ веществъ. Вода изъ расплавляющаго снѣга и льда ничѣмъ почти не отличается отъ дождевой, но по большому содержанию въ себѣ воздуха способна для пищья, нежели дождевая вода. Впрочемъ качество самаго снѣга и льда измѣняетъ сію воду, подобно тому, какъ качество воздуха сообщается всегда дождевой водѣ.

---

(\*) T. P. Frank's Syst. d. medicin. Polizey — 3. B. стр. 361-362 ( § 11) (3-te Aufl.).

Колодезная вода хопя и есть видъ ключевой воды, открываемый чрезъ копаніе въ значительную глубину земли, однакожь она, по единогласному почпи врачейныхъ писателей опзыву, между всѣми пипейными водами занимаесть, и весьма справедливо, послѣднее мѣсто. Вода сія по большей часпи бываесть пверда (смѣшанная съ сѣрнокислою и углекислою извесью и проч.) и не всегда годна для хозяйспвеннаго упопробленія. Въ насосныхъ колодезяхъ вода приводицца въ болѣе равномерное движеніе, и попому она предпочитаецца водѣ колодезной, почерпаемой ведрами и проч. Добропа сей воды, основываясь существенно на почвѣ земли, служащей для колодезной воды испочникомъ и дномъ, можесть чрезъ положеніе колодезя около нѣкоторыхъ хозяйспвенныхъ заводовъ и зданій совершенно перемяниться, исчезнуть. Къ шаковымъ вредоноснымъ для колодезей зданіямъ принадлежатъ: бойни, кожевенные заводы, опходныя, либо для моченія льну и пеньки назначенныя мѣста, красильныя, мѣдиплавильныя, вымывальныя и другіе горные заводы, успроенные въ сосѣдствѣ съ колодеземъ, коего вода чрезъ сіе дѣлаецца не только мутною, вонючею, гнилою, разноцвѣтно окра-

шенною, но даже ядовитую. Наконецъ, чѣмъ чаще употребляется вода колодезная, тѣмъ она здоровѣе, и на оборотъ. Если посему въ глубокомъ колодезѣ вода долгое время лишается движенія, а находящійся надъ оною воздухъ также теряетъ сообщеніе съ вѣтвнкою атмосферою: то не только вода въ семъ случаѣ дѣлается вредною, но и самое даже приближеніе людей и животныхъ къ такому мѣсту не всегда бываетъ безопасно для здоровья и жизни ихъ.

Изъ вышесказаннаго само собою явствуетъ, что жилища могутъ быть причиною порчи и подмѣсей воды вообще чрезъ свою неопрятность и несоблюденіе чистоты около воды, употребляемой для питья и приготовления пищи (выбрасываніе въ воду нечистотъ, палыхъ животныхъ и проч.). Наконецъ извѣстно и то, что послѣ землетрясенія, изверженія огнедышащихъ горъ вода претерпѣваетъ вредную для здоровья жителей перемѣну и что въ другихъ случаяхъ вода, бывшая долгое время здоровою и совершенно годною для всякаго употребленія, дѣлается наконецъ безъ всякой явленной причины



вредною и негодною, и припомъ постольно, неизмѣнно, или же временно.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей воды.* Если причины порчи и подмѣсей воды сущъ довольно явственны и могутъ быть удалены, то какъ для опвращенія порчи и подмѣсей воды, такъ и для поправленія испорченной уже воды необходимо пребуется удаление паковыхъ причинъ.

Посему ключевая вода, имѣющая безвредный источникъ и дно, защищается опъ дальнѣйшей порчи и подмѣсей успроеніемъ надъ оною прочной, безвредной крыши, недопускающей дожда и нечиспоитъ, но непрепятспвующей свободному доспугу атмосфернаго воздуха, также надлежащимъ обложеніемъ или ограниченіемъ дна ея и проведеніемъ ключевой воды, въ случаѣ надобности, чрезъ безвредныя трубы или искусспвенные каналы (aquae ductus). Уже древніе упражнялись въ семъ искусствѣ съ опличнымъ успѣхомъ. Примѣромъ сему служатъ водопроводы, успроенные Сезосприсомъ въ Египтѣ, Семирамидою въ Вавилонѣ, Соломономъ въ Іудейской землѣ, особливо же Римскіе водопроводы, бывшіе какъ

въ самомъ Римѣ, пакъ и въ провинціяхъ (Aquaе Marciae, Aquaе Claudiae). Водопроводы сіи удивляютъ насъ даже развалинами своими, оспавшимися днынѣ въ нѣкопрыхъ мѣстахъ Италіи и Африки. Не смотря однакожь на древность и важность водопроводовъ, доселѣ еще не рѣшено, какой родъ сихъ каналовъ лучше, выгоднѣе и особливо безвреднѣе. Римляне знали уже не только глиняные и свинцовые водопроводы, но и самый вредъ, причиняемый послѣдними (\*); посему aquae Marciae проведены были чрезъ каналъ, выложенный кирпичемъ и споль просіпранный, что всалникъ съ лошады могъ свободно проѣзжать чрезъ оный. Нѣкопрые Врачебно-Полицейскіе Писатели сомнѣваются въ вредности свинцовыхъ водопроводовъ и говорятъ, что прежде нежели вода распворитъ сполько свинцу, чтобы сдѣлаться вредною, землянистыя части протекающей воды осядутъ на внутреннюю поверхность трубъ и покроютъ оную твердою каменистою корою, препяп-

---

(\*) M. Vitruvii Pollionis de architectura L. X. Edit. G. de Lact. Amstelodami. 1649. Fol. Lib. vijj. cap. vii. стр. 171.

спивующею дальнѣйшему распворенію свинца (\*). Неосновательность сего мнѣнія сама собою явствуетъ: ибо въ случаяхъ сего рода осторожность никогда не можетъ быть излишнею, и свинцовыя трубы тогда только сдѣлаются безвредными, когда доказано будетъ, что свинецъ не есть ядъ. Мѣсто сихъ ядовитыхъ водопроводовъ могли бы съ пользою заступить желѣзныя, чугуныя и каменныя трубы, если бы оныя не были дороги, равно глиняныя, если бы оныя не трескались. Деревянныя трубы дешевле другихъ и не легко трескаются; но за то загниваются и сообщаютъ водѣ непріятныя качества; сему однакожъ послѣднему недостатку можно пособить чрезъ обжиганіе или обугливаніе внутренней поверхности деревянныхъ трубъ; симъ способомъ достигается двоякая польза: защищеніе деревяннаго водопровода отъ гнилости и очищеніе самой воды. Дабы однакожъ въ полной мѣрѣ достигнуть сей цѣли, нужно деревянные водопроводы составлять изъ твердаго дерева (буко-

---

(\*) G. T. Gmelin's allg. Geschichte der miner. Gifte, стр. 201. Wildberg's Medizin. Gesetzgebung, 2-te Aufl. Berlin. 1820. стр. 108. (§. 212).

ваго, дубоваго, въ щелокъ вымоченнаго, сосноваго), спроеить сіи каналы довольно глубоко подъ поверхностью земли, а выспроенные уже почаше очищать и въ случаѣ надобности поправлять.

Порча и подмѣсъ рѣчной воды предотвращается удаленіемъ отъ оной всѣхъ инородныхъ веществъ, могущихъ претѣснствовать быспрогъ ея печенія. Посему нужно наблюдать, чѣобы рѣка не была наполняема помѣтомъ съ улицъ, домовъ, различныхъ заводовъ, либо палыми живошными, чѣобы въ ней не производилось вымачиваніе льна и пеньки, чѣобы берега рѣки въ городѣ были ограждены и снабжены приспиройками для черпанія воды въ томъ мѣстѣ, гдѣ она печетъ быспрѣ, а не у самого берега. Для опвращенія порчи воды, причиняемой бойнями, красильнями и другими подобными заводами, нужно, какъ о семъ выше упомянуто (см. о живошной цитѣ), помѣщать сіи зданія опдѣльно отъ жилыхъ мѣстъ, и именно тамъ, гдѣ рѣка выпекаетъ изъ города или деревни. Сохраненіе чистоты воды въ озерахъ хотя также основывается на опрашности со стороны жителей, однакожъ не каждая озерная вода спо-

собна для употребленія безъ предварительнаго очищенія ея, о чемъ упомянуто будетъ ниже сего. Почти поже самое должно сказать о дождевой и снѣжной водѣ, пребующей такъ же, смотря по обстоятельствамъ, большаго или меньшаго предварительнаго очищенія.

Дабы всегда имѣть хорошую колодезную воду, для сего нужно, чтобы колодезь не находился вблизи другой воды, особливо же вблизи болотъ, лужъ, навозныхъ и опходныхъ мѣстъ, бойней, красиленъ, рудокопныхъ заводовъ и проч. Для поспроенія колодезя весьма полезно избирать грунтъ земли, болѣе песчаный и копасть яму довольно глубокую, кеглеобразную, такъ чтобы она кнаружи поспепенно расширялась; стѣны сей ямы нужно всегда выкладывать кирпичемъ или твердымъ полевымъ камнемъ, наполняя при этомъ промежутки между камней длиннымъ зеленымъ мохомъ, а дно колодезя покрывать сими же вещами, вышиною въ нѣсколько футовъ. Если же дно колодезной ямы не соотвѣтствуетъ въ полной мѣрѣ своему назначенію, то нужно нижнюю часть сей ямы распроспранить нѣсколько въ ширину, такъ чтобы за камнями во всей окружности ямы оставалось свобод-

ное мѣсто, которое должно наполнить чистымъ пескомъ или хорошо вымѣшанною кирпичною глиною (\*), для оппращенія илу и другихъ примѣсей къ водѣ. Снаружи вся окружность колодезя возвышается, или дѣлается скампъ, препятствующій теченію наружной воды въ колодезь, Колодцы, изъ коихъ черпають воду ведромъ, скорѣе (о чемъ уже упомянуто) засариваются, нежели колодези закрытые, изъ копорыхъ доспають воду насосомъ; а потому послѣдніе предпочипаются первымъ; однакожъ присемъ необходимо нужно, чпобы вдоль насосной трубы находился каналъ, вверху и внизу опкрытый, для сообщенія наружнодо воздуха съ внутреннимъ и чпобы насосная труба успроена была изъ безвредныхъ матеріаловъ (стр. 156). Поелику колодезь доставляетъ тѣмъ лучшую воду, чѣмъ чаще черпають изъ онаго, по посему весьма нужно по временамъ вычерпывать насосомъ за разъ значительное количество колодезной воды и ежегодно очищать, по крайней мѣрѣ однажды, колодезную яму. Столь же

---

(\*) F. L. v. Cancrin's Abhandlung, wie süsse Brunnen vortheilhaft zu graben, gut einzufassen und recht zu gebrauchen. Masburg. 1792. 8.

необходимо и важно очищеніе колодезя послѣ предшедшаго наводненія и землетрясенія, равно какъ и вообще всевозможное всегдашнее соблюденіе чистоты и опрятности въ окружности колодезя; для чего у древнихъ Римлянъ находились особенные смотрители (*curatores aquarum*).

Для опвращенія порчи воды въ бочкахъ *Стипріанъ Люисцій* (*Stipriaan Luiscius*) (\*) совѣтуетъ прибавлять къ оной сѣрную кислоту и порошокъ мрамора и бочку крѣпко закупоривать. *Бертолетъ* (\*\*) напрошивъ погѣ предложилъ обжигать внутреннюю поверхность бочекъ, наполняя оныя попомъ водою и крѣпко запираять.

Поправленіе подмѣщенной или испорченной воды основывается, подобно предопрващенію порчи и подмѣсей ея, на удаленіи причинъ, а по различію оныхъ производится частію механическими, частію химическими, или же тѣми и другими средствами (смѣшеніемъ воды съ кислотами, процѣжива-

---

(\*) Gehler's Jour. f. d. Chemie. B. 1. N. 20.

(\*\*) Pfaff und Friedländer's d. neuest. Entdeckungen Französ. Gelehrten. 1805. st. 5 стр. 70.

ніємъ чрезъ песокъ, угольный порошокъ, замораживаніемъ, вареніемъ, перегонкою и п. д.).

Такимъ образомъ дождевая и снѣжная вода, надлежащимъ образомъ и при соблюденіи всей чистоты собранная, не содержишь въ себѣ доешапочнаго количества углекислоты, а потому и пребуешь поправленія, состоящаго въ выправляваніи таковой воды на открытій воздухъ. По сей же причинѣ *Унцеръ* (\*) совѣщуетъ воду, почерпнутую насосомъ въ закрытыхъ колодезяхъ, ославлять прежде самаго ея употребленія довольно долго на открытомъ воздухѣ. Совѣщуютъ также бросать въ колодезь поваренную соль (\*\*).

Мутность и нечистота рѣчной воды удаляется ускореніемъ теченія рѣки посредствомъ очищенія и углубленія дна ея, помощью искусственныхъ водяныхъ пороговъ и мельницъ, чрезъ проведеніе въ оную другой рѣки, если то можно, или же проведеніе ея самой въ искусственно-вырытый каналъ, усиленный пескомъ и камнями.

---

(\*) Der Arzt, eine medicin. Wochenschrift. стр. 65.

(\*\*) Bernt. I. c. I. B. стр. 344. § 878.



Для очищенія озерной или прудовой воды нужно, по совѣту Юсти (\*), вырыть подлѣ самаго озера или пруда малый прудъ, такъ чптобы онъ имѣлъ низшее положеніе и былъ глубже большаго пруда или озера. Искусствен- ный прудъ сей усиливается пескомъ и твердыми каменьями, припомъ опдѣляется опъ большаго пруда площиною, соспавленною изъ чистаго песку и укрѣпляемою набитыми по споронамъ сваями. Симъ образомъ вода изъ озера, проходя въ искусственный прудъ, процѣживается сквозь песокъ и освобождается опъ своихъ примѣсей. Присемъ ежегодно нужно, какъ замѣчаетъ Франкъ (\*\*), одну по крайней мѣрѣ спорону плошины обновлять свѣжимъ пескомъ.

Эргартъ (\*\*\*) предлагаетъ для сего слѣдующій способъ: вблизи рѣки, озера или пруда вырыть колодезь, копорый долженъ бытьъ глубже рѣки; между симъ колодеземъ и рѣкою спавився досчатый чепвероугольный ящикъ съ многими и большими опверспіями, обра-

---

(\*)—Justi—Polizeywissenschaft etc.—I. В. стр. 413.

(\*\*) Пр. Соч. 3. В. стр. 385—386. (§ 17).

(\*\*\*) Пр. Соч. 2 В. стр. 401.

ценными къ споронѣ колодезя и располагается на равной между обоими линіи, съ малымъ только пониженіемъ или наклонностію къ споронѣ колодезя. Ящикъ сей, равно какъ и колодезь, выплывается пескомъ и кремнистыми камнями. Послѣ сего малая часть земли, оспающаяся между рѣкою или озеромъ и ящикомъ, пробивается насквозь, дабы вода могла безпрестанно протекаетъ въ ящикъ; опѣ сего чрезъ нѣсколько часовъ накапливается чистѣйшая вода въ колодезь. Черезъ нѣсколько недѣль песокъ въ ящикѣ, если нужно, замѣняется новымъ или свѣжимъ.

Вода съ пескомъ, землею, иломъ смѣшанная должна прежде ея употребленія постоятъ спокойно въ открытомъ сосудѣ, дабы поспороннія части осѣли на дно и дабы чистую воду можно было слить. Если сего недостаточна для очищенія воды, или же въ ней усматриваются черви (всего чаще *monoculus pulex*. L.) и малыя наѣкомыя, то должно оную процѣдить чрезъ сложенную вдвое суконку. Сіе средство особливо нужно въ то время, когда за недостаткомъ вырытыхъ колодезей питьевая вода проводится чрезъ трубы и когда источникъ, изъ коего проведены трубы, опѣ

проливного дождя, оппепели и другихъ подобныхъ явленій получаетъ худое качество. *Ларрей* (\*) видѣлъ въ Египтѣ весьма жестокіе припадки у солдатъ, упопрелявшихъ для пипья воду, въ коей водились малыя пиявицы.

Мупная вода легко освѣпляется пережженными квасцами или рыбимъ клеемъ. Пережженный кофе (\*\*) естъ пакже весьма хорошее средство для поправленія худой, особливо же весьма пвердой воды. Однимъ лопомъ пережженного кофе очищается количество воды, попрелное на одинъ день для нѣсколькихъ особъ. Именно, кофейный порошокъ варится съ водою, копорая попомъ процъживается; либо порошокъ сей кладется въ цѣдильный мѣшокъ, куда наливается мало помалу нѣсколько кружекъ кипячей воды, копорой дають попомъ оспынууть.

Если вода уже значипельно испорпилась, получила опврапипельный болописный запахъ и вкусъ, то она можетъ быть поправлена по способу Г-на *Мандсли* (\*\*\*) (*Mand-*

---

(\*) N. Isfordink's Militär. Gesund. Poliz. 2-te Aufl. Wien. 1827. 1. B. стр. 367. ( § 185).

(\*\*) Ehrhart. Пр. соч. 3 B. стр. 160.

(\*\*\*) Isfordink. Пр. соч. стр. стр. 368.

sley). Сей способъ состоитъ въ томъ, что посредствомъ раздувальнаго мѣха или насоса чрезъ кожаные мѣшки, снабженные на концѣ своемъ лейкообразнымъ сипомъ, впускается воздухъ въ бочки, наполненныя испорченною водою. Кожаные мѣшки должны проходить до самаго дна бочекъ. Въ короткое время вода чрезъ сие очищается и дѣлается способною для пища.

*Ловицъ* совѣтуетъ для очищенія воды, брать доспалочно пережженные угли, приводить оныя въ порошокъ, смѣшивать съ тонкимъ рѣчнымъ пескомъ, класать въ два одинъ на другомъ лежащія суконныя лоскуты или въ мѣшокъ и наливать на оныя нѣсколько разъ воду; чрезъ сие въ подставленномъ сосудѣ получается чистая вода. Изъ 30-ли фунтовъ гнилой воды, смѣшанной съ 8-ю фунтами углей, *Ловицъ* получилъ 28 фунтовъ чистой воды. Какъ скоро нужно очистишь новое количество воды, то смѣсь углей и песку опять возобновляется (\*).

Легчайшій и самый дешевый способъ очищенія гнилой воды состоитъ, по совѣту *Эр-*

---

(\*) Isfordink. Пр. Соч. 1. В. стр. 368.

*сарт* (\*) въ слѣдующемъ: берется деревянная бочка, имѣющая 12 дюймовъ въ поперечникѣ и 3 фута вышины, а внизу, около самаго дна, кранъ. На 4 дюйма выше дна бочки укрѣпляется деревянная круглая рѣшетка, обитанная на верхней своей поверхности волосянымъ ситомъ. На сію рѣшетку насыщается цѣдильный песокъ или смѣсь, состоящая изъ равныхъ частей древеснаго угля и крѣпчайшаго осадочнаго камня или накипи. Для сего то и другое вещество превращается въ крупный порошокъ и сверхъ того угли предварительно вымываются въ водѣ до того, что уже не мараютъ пальцевъ. Приготовленной такимъ образомъ смѣсью сею наполняется бочка, начиная отъ сита до верхняго края бочки, такъ чтобы вверху бочки на три дюйма оставалось пустое мѣсто; за симъ наливается вода, которая чрезъ кранъ выпускается совершенно чистою, безъ запаха и вкуса. Въ одинъ часъ можно симъ способомъ процѣдить 50 шпофовъ воды, и вторичное процѣживание рѣдко бываетъ нужно.

Можно также употреблять иногда слѣ-

---

(\*) Пр. Соч. 3. В. стр. 159.

дующий простой способ. Если имются большія кадки, то дно оныхъ покрывается на нѣсколько дюймовъ угольнымъ порошкомъ и рѣчнымъ пескомъ; потомъ наливаютъ туда воду, мѣшаютъ ее нѣсколько разъ въ день и какъ скоро уголь осадитъ, то вода становится чистой, безъ запаха и вкуса.

Если пребудется малое только количество чистой воды, то скорѣе приготвление оной состоитъ въ кипяченіи худой или гнилой воды, которая послѣ сего процеживается, осаживается нѣсколько времени на открытомъ воздухѣ и наконецъ смѣшивается еще иногда съ уксусомъ или нѣсколькими каплями, едвой, или съ сахарною, виннокаменной, лимонною кислотами. Другой для сего способъ есть переливаніе насосомъ гнилой воды съ одного мѣста на другое; послѣ чего осаживается она довольно долго на открытомъ воздухѣ. Впрочемъ гнилая вода очищается нѣкоторымъ образомъ сама по себѣ чрезъ совершенную гнилость; нужно только такую (перепившую) воду пропустить сквозь песокъ и осаживать нѣсколько времени на открытомъ воздухѣ. Сюда же принадлежитъ

способъ *Эргарта* (\*), состоящій въ очищеніи худой воды чрезъ вымазываніе дна пипейныхъ сосудовъ пѣспомъ изъ сладкихъ миндалей или изъ орѣховъ sprawy водонійцы (*strychnos rotatorum. L.*).

Наконецъ въ пѣхъ случаяхъ, гдѣ ни время, ни обспояпельспва не позволяющъ пользоваться предложенными способами очищенія воды, какъ по именно бывающъ во время военныхъ дѣйспвій, нужно спарапсъ испребляпъ въ водѣ худой вкусъ, припупляпъ вредное ея дѣйспвіе и способспвовапъ уполенію жажды. Для сей цѣли весьма полезно прибавляпъ къ водѣ вино, водку, укусъ, сѣрную кислопу. *Картремерж Дисжонваль* (\*\*) (*Quartremere Disjonval*) ошкрывъ, что вода, смѣшанная съ сѣрною кислопою, долѣе оспается свѣжею, не умножающъ значительны испарины и болѣе возбуждающъ аппенитпъ, нежели вода, смѣшанная съ укусомъ. Худая, особливо желудокъ и кишки разслабляющая вода поправляется, по совѣпу *Ванъ-Свитена* (\*\*\*), чрезъ намачиваніе въ оной

---

(\*) Пр. Соч. 2. В. стр. 401.

(\*\*) Isfordink. Пр. Соч. 1. В. стр. 371. *Примѣт.*

(\*\*\*) Beschreib. der Heil. d. Krankh. im Feldlager. Wien. 1758. *Vorrede.*

аирнаго корня (*radix calami aromatici*), пѣтъ болѣе, что корень сей пѣтъ именно распептъ, гдѣ вода. бываетъ худшая, т. е., въ болопн-  
 стыхъ мѣспахъ. Сподь же полезенъ въ семъ  
 случаѣ хрѣновый корень. *Стипріаанъ Луис-*  
*цій* (\*) совѣщуетъ очищати болопную, гни-  
 лую, мушную воду прибавленіемъ къ оной рас-  
 пивора сѣрнокислаго желѣза и уничтоженіемъ  
 желѣзнаго вкуса, если ояъ весьма замѣненъ,  
 чрезъ попанъ.

Въ морскихъ путешествіяхъ, при недо-  
 снапкѣ хорошей прѣсной воды, совѣщуютъ  
 варить морскую воду, держа надъ парами-ея  
 грецкія губки и полною чрезъ выдавливаніе  
 оныхъ получаю чистую воду. *Айрвинъ* (\*\*) изобрѣлъ приборъ, служащій для очищенія  
 морской воды чрезъ перегонку и награжденъ  
 былъ за сіе опѣ Британскаго Правительства  
 400-ми фунтовъ стерлинговъ. Въ случаѣ край-  
 носпи служилпели морскіе должны, по совѣщу  
*Эрарта* (\*\*\*), надѣвать плащъ, обмоченное  
 морскою водою, или же купаться въ морской

(\*) *Hermbsaedt's Bulletin*. В. 1. Н. 2. стр. 187.

(\*\*) *De la methode du Dr. Irwing pour desaler l'eau de mer* — in *Rozier Journal*. Т. 14. стр. 316.

(\*\*\*) *Пр. Соч.* 11. В. стр. 444.



водѣ. Чрезъ искусственное замораживаніе морская вода также довольно очищается. Напротивъ того при недостаткѣ воды на твердой землѣ встрѣчаются великія затрудненія. Известно, что въ осажденныхъ крѣпостяхъ нѣтъ ничего спрашнѣе недостатка въ водѣ. *Лизимахъ*, по свидѣтельству *Плутарха* (*de Tuenda valetudino*), чрезъ одинъ только недостатокъ, въ водѣ принужденъ былъ сдаться. Древніе Римляне почипали недостатокъ воды величайшимъ бѣдствіемъ для арміи и для оправренія сего выдумывали различныя, затруднительныя, впрочемъ и не всегда основательныя способы. *Витрувій* предлагаетъ для сего, какъ легчайшій способъ, слѣдующее: надлежитъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ ищутъ воды въ землѣ, предъ восхожденіемъ солнца лечь на брюхо, опереться объ землю подбородкомъ и смотрѣть вокругъ, не поднимается ли гдѣ либо влажный паръ, выходящій вверхъ волнообразно; тамъ, гдѣ окажется сіе явленіе, нужно копать землю для открытія воды. *Кассіодоръ* говоритъ: если кучи малыхъ комаровъ по направленію какой либо почвы земли безпрестанно лепяются вокругъ одного и того же мѣста, то сіе значить, что въ семъ мѣстѣ кроется вода.

*Палладій* замѣчаетъ, что для сихъ наблюдений нужно избирать мѣста земли, неимѣющей на поверхности своей никакой мокроты: ибо здѣсь, говоритъ онъ, часто бываетъ паръ, хотя въ глубинѣ воды не находится.

Болѣе основательны и частію опытомъ подтверждены слѣдующія примѣты присущія ключевой воды подъ землею. Въ соединенныхъ вмѣстѣ граничныхъ горахъ часто находятся ключи на самой вершинѣ скалы. Ежели между ращелинами расщепъ лѣснѣй сипайкъ (*scirpus silvaticus*), то ключъ находится близко (\*); равно также, если по споронамъ горныхъ утесовъ поднимаются упромъ и вечеромъ малыя облака. Всякое мѣсто земли, покрытое густою травою, сколь бы она мала ни была, содержишь подъ собою ключъ, чѣмъ болѣе блеститъ, чѣмъ понѣе и мокрѣ сія трава, тѣмъ ближе къ поверхности земли ключъ. Въ Флещовыхъ горахъ, гдѣ земляные и каменныя слои лежатъ горизонтально, ключи собираются болѣею частію у подошвы горъ; посему *Колумбе* (\*\*) совѣтуетъ

(\*) Isfordink's — Militär. Gesundh. Polizey. 2-te Aufl. Wien. 1827. 1. B. стр. 361.

(\*\*) Code de médecine militaire — par M. Colombier. Paris. 1772. 1. P. стр. 205. — Isfordink. Пр. Соч.

глубоко копать въ ивовыхъ мѣстахъ: ибо безъ сомнѣня откроется вода и можно будетъ сдѣлать колодезь. Русле или ложбина песчаныхъ истоковъ, высыхающихъ лѣтомъ, содержишь въ себѣ ключи; чѣмъ ближе такая ложбина къ подошвѣ горы, тѣмъ и ключъ ближе къ поверхности земли. Всякая гора, какъ извѣстно, имѣетъ болѣе крупную сторону и менѣе спремнистую или покатую; на крупной сторонѣ горы, обращенной къ сѣверу, скорѣе можно найти ключъ, нежели на покатой же крупной сторонѣ, обращенной къ югу (\*). Если же покатъ горы обращенъ къ западу, а крупизна къ востоку, то на первой сторонѣ обыкновенно болѣе бываетъ ключей, нежели на послѣдней. Если въ кустарникахъ, между ущелинами горъ, показываются водяные комары (culex. L.), или же гдѣ упрямъ и вечеромъ садятся оплещенныя пшпцы, тамъ часто находятся обильныя и неглубоко лежащія ключи (\*\*). Напрямивъ того, опытъ показываетъ, что въ сосновыхъ и березовыхъ лѣсахъ на весьма большомъ пространствѣ не воз-

---

(\*)-Isfordink. Пр. соч.

(\*\*) Isfordink. Пр. Соч. стр. 362.

можно бываетъ открыть воды; что въ лѣсахъ, распутицъ на сухой почвѣ, ключи лежатъ при долинѣ или дощинѣ и что буковые лѣса чаще бывають богаты водою. *Моро де Жонъ* (\*) замѣчаетъ, что лѣсистыя и гористыя страны богаче водою, нежели страны съ противоположными качествами; что человекъ можетъ, по своему произволу, сдѣлать какую либо страну воднистою или безводною, чрезъ разведение или истребленіе лѣсовъ, особливо на горахъ; что высокія горы удерживаютъ и, такъ сказать, связываютъ испареніе воздушной атмосферы, а высокіе лѣса, понижая температуру воздуха, производятъ сгущеніе и ниспаденіе воздушныхъ испареній.

Если сказанные способы окажутся недостаточными для открытія ключа, то нужно, говоритъ *Исфордингъ* (\*\*), слѣдующее: а) ивовыя свая, облупленныя, высушенныя, вбитыя въ сырую, песчаную землю и оставленныя такъ на цѣлую ночь, покажутъ на слѣдующее утро (степенью влажности своей), какъ глубоко лежитъ ключъ. б) Въ гористыхъ и камени-

(\*) Zeitschrift f. d. organische Physik, herausg. v. D. C. F. Heusinger. 1. B. IV-tes Heft. October.—Memoires de l'Academie Royale de Bruxelles. T. V.

(\*\*) Пр. Соч.

сплѣхъ мѣспахъ зарывающъ ягичью шкуру, шерстью внизъ, въ землю на фулъ или на два и оставляютъ такъ на ночь; сырость или дѣйствительная мокрота шкуры на слѣдующее утро дасть знать, находится ли вода въ глубинѣ отъ 7-9 фузовъ (при сырости кожи), или отъ 3-4 фузовъ (при мокротѣ кожи.) в) Если ружейный шомполъ, вспкнутый въ рыхлую землю, при извлеченіи его покрытъ будетъ висячими каплями, то сіе означаетъ близость воды. г) Равно также въ упесистыхъ горахъ, если вѣшь съ листьями, ивовая, сипициковая или ольховая, посаженная въ землю, не завянетъ, то показывается, съ вѣроятностію, близость ключа. д) Гдѣ гончія собаки охотно лежащія и ногами роютъ землю, шамъ по большей части находящіяся ключи (\*). Способнѣйшее орудіе для узнанія, находится ли въ извѣстной глубинѣ земли вода, есть горный буравъ. Если буравъ по извлеченіи изъ земли покрытъ глиною, то мало надежды къ полученію воды; если же на немъ усматривается рыхлая земля или песокъ, то, вѣроятно, находится вода въ шаковомъ мѣстѣ.

(\*) См. журн. Geist der Zeit. Jahrgang 1822. IV B. стр. 117.

Буравъ сей обыкновенно упоируется въ то время, когда нужно усроить колодезь въ соопвѣстивенномъ удаленіи отъ какого либо зданія.

*Распознаваніе порги и подмѣсей воды.* Дабы починѣ опредѣлить вредныя качества сего еспественнаго напитка, нужно напередъ знать, въ чемъ состоятъ качества здоровой воды. Следственно распознаваніе сіе, по принятому нами порядку, основывается:

*Во первыхъ, на показаніи недостатка естественныхъ качествъ, къ каковымъ принадлежатъ:*

а) Ясность и совершенная прозрачность воды, безъ всякаго цвѣта, безъ запаха, безъ особеннаго какого либо вкуса. Прозрачность воды, налипой въ стаканъ, болѣе опредѣляюща способнѣемъ на воду сверху внизъ, нежели съ боку чрезъ стѣнки стакана.

б). Появивши довольно долго, вода сія не оплываетъ осадка на днѣ сосуда.

в). Она совершенно развариваетъ шелушные плоды и растворяетъ мыло безъ всякаго оспатка. Рука, погруженная въ сію воду, особливо же обмываемая съ помощію мыла, явственно ощущаетъ мягкость.

г). Вода сія скоро нагрѣвается и скоро остываетъ; кипятокъ ея извлекаетъ доспаточно существенныя части изъ чаю и кофе.

д) Она содержитъ въ себѣ нѣсколько атмосфернаго воздуха и углекислоты. Сіе узнается изъ того, что вода, переливаемая изъ одного сосуда въ другой, образуетъ бѣлыя жемчужообразныя крупинки и что, особливо въ шеплохъ, на внутренней поверхности сосуда съ водою, равно и на поверхности ея, остаются воздушныя пузыри. Черезъ кипяченіе она не теряетъ своей прозрачности.

е) Животныя охотно пьютъ сію воду, а люди, находя ее способною къ утоленію жажды, не чувствуютъ послѣ питья оной тягости въ животѣ и свободно испражняютъ мочу.

ж) Она содержитъ въ себѣ весьма небольшое количество серно-соляно или углекислыхъ солей; сіе узнается изъ того, когда опѣ прибавленія къ водѣ селитроокислаго серебра (*nitras argenti*) или солянокислаго барита (*hydrochloras barytae*) замѣчается въ ней малая, едва примѣтная мутность.

з) Хлоръ и спиртная наеиночка чернильныхъ орѣшковъ не производятъ въ сей водѣ осадка, по крайней мѣрѣ значительнаго.

и) Наконецъ, что всего важнѣе, окружные жители, пользующіеся сею водою, имѣютъ здоровое и крѣпкое сложеніе. Впрочемъ извѣстна сила привычки. Недоспадокъ одного какого либо изъ вычисленныхъ признаковъ доброты воды не доказываетъ безусловно худого ея качества.

*Во вторыхъ, чрезъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ, каковыя суть:*

а) Недоспадокъ прозрачности, опвратительный запахъ, посторонній, непріятный вкусъ.

б) Мутная и гнилая вода узнаются съ перваго взгляду. Если хлоръ и спиртная наспойка чернильныхъ орѣшковъ дѣлаютъ въ сей водѣ осадокъ, то симъ показывается присутствіе въ водѣ между прочимъ значительнаго количества живопнаго вещества.

в) Чрезмѣрно твердая, слѣдственно безвредная, вода есть та, которая недоспадно развариваетъ шелушные плоды и мыло превращаетъ въ клочки. Мясо, сваренное въ сей водѣ, получаетъ красный цвѣтъ, а края и дно поваренной посуды покрываются осадкомъ; мѣдная же посуда получаетъ отъ сей воды пятна, и все сіе бываетъ пѣмъ въ болѣшей



спесени, чѣмъ тверже самая вода. Опъ прибавленія къ ней раствора (воднаго) солянокислаго барита или щавелекислаго амміака происходитъ обильный осадокъ, — признакъ сернокислой извести.

г) Вода, пресыщенная углекислою известью, не развариваетъ шелушныхъ плодовъ и не растворяетъ мыла; будучи нагреваема при температурѣ гораздо нижей, нежели какая требуется для кипѣнія воды, мутится, потому что чрезъ нагреваніе отдѣляется углекислота, а известь осѣдаетъ. Опъ прибавленія къ сей водѣ извѣстковой воды или щавелекислаго амміака происходитъ значительный осадокъ.

д) Присутствіе гипса въ водѣ узнается, какъ уже упомянуто, чрезъ солянокислый баритъ и щавелекислый амміакъ.

е) Селифра, находящаяся въ водѣ, узнается чрезъ выпариваніе сей послѣдней; опъ сего селифра превращается въ шестиспоровніе кристаллы, которые имѣютъ холодящій вкусъ, на огнѣ плавятся, съ горючими веществами въ жару вспыхиваютъ и припомъ испускаютъ изъ себя красный задушающій паръ, который показывается и тогда, когда на

криспаллы сѣи накапливаются крѣпкая сѣрная кислота.

ж) Присутствіе поваренной соли въ водѣ узнается выпариваніемъ паковой воды; опѣ сего поваренная соль образуетъ кубическіе криспаллы и узнается какъ по собственному вкусу, такъ и по тому, что на раскаленныхъ угляхъ претягивъ и разлепается.

з) Солянокислая извѣсть въ водѣ открывается прибавленіемъ къ одной части воды сѣй селипрокислаго серебра, а къ другой части щавелекислаго амміака; опѣ сего дѣлается въ томъ и другомъ случаѣ обильный осадокъ.

и) Вода, содержащая въ себѣ значительную примѣсь желѣза, имѣетъ кислый, спягивающій, чернильный вкусъ; опѣ прибавленія къ ней настпойки чернильныхъ орѣшковъ, также крѣпкой настпойки Кипайскаго чаю, или розовой воды, происходитъ темнолубоватый или краснопурпуровый цвѣтъ, переходящій мало помалу въ черный.

і) Вода, содержащая въ себѣ значительную примѣсь мѣди, имѣетъ мепалнический вкусъ, будучи выварена до половины и охлаждена, принимаетъ опѣ вкачиванія въ оную

вѣдкаго напашырнаго спирта голубоватый цвѣтъ, либо оплываетъ осадокъ. Лезвее ножа, положенное въ сію воду, получаетъ послѣ нѣкотораго времени красную кору.

к) Вода, содержащая въ себѣ свинецъ, прозрачна, безцвѣтна, не имѣетъ запаха; вкусъ ея иногда нѣсколько сладковатый и спигающий. Опытъ проведенія чрезъ сію воду сѣрово-дороднаго газа или воды, насыщенной симъ газомъ, дѣлается черноватый осадокъ, который чрезъ накаливаніе съ угольнымъ порошкомъ превращается въ металлическій свинецъ (*regulus plumbi*).

### *Питія водныя.*

*Виды порчи и подмѣсей питій водныхъ.*

Сюда относятся:

1) Квасъ, либо очень молодой, либо весьма старѣй. Подмѣсь кислыхъ щей, особливо чрезъ подташъ.

2). Чай уже вымоченный, высушенный потомъ и снова продаваемый. Смѣшеніе лучшаго чаю съ худшимъ или вымоченнымъ, либо съ листьями другихъ растений, которыя иногда сами по себѣ продаются вмѣсто настоящаго чаю. Прямѣромъ служить можетъ шакъ на-

зывается Копорскій или Иванъ-чай (\*). Освѣ-  
 жение стараго, лишеннаго запаха чаю чрезъ  
 примѣсъ эфирныхъ маслъ. Подмѣсъ мѣди или  
 свинца.

3) Кофе гнилое, заплеснѣвшее, подмочен-  
 ное (café mariné). Примѣсъ мѣди. Примѣсъ  
 къ кофейному порошку пережженного и при-  
 веденнаго въ порошокъ цикорейнаго корня.  
 Примѣсъ къ кофейному отвару смѣси изъ хлора  
 и поташа (\*\*) (Eau de Javelle).

4) Шоколадъ, пригопвленнѣй изъ бобовъ  
 шоколадныхъ испорченныхъ, чрезмѣрно переж-  
 женныхъ, смѣшанныхъ съ выжатымъ масломъ  
 или жиромъ животныхъ, съ мукою или крах-  
 маломъ, съ мѣдью, съ свинцомъ.

*Причины порчи и подмѣсей питій водя-  
 ныхъ.* Нѣкоторыя изъ сихъ причинъ суть  
 умысленныя, а другія случайныя. Такъ суше-  
 ние чаю, производимое Кипайцами на мѣдныхъ

---

(\*) По слѣдствію, учиненному въ 1815 году  
 въ С. Петербургѣ, Копорскій или Иванъ-чай  
 пригопвлялся изъ разныхъ видовъ кипрей или  
 еровника (*Epilobium angustifolium*, *hirsutum*, *par-  
 viflorum*, *montanum*, *Hieracium*, *Sabaudum* etc.)  
 См. примѣч. Е. П. С. О. Гаевского — въ Поли-  
 цейской и Судебной Химіи В. Г. Ремера. Ч. 1.  
 С. Петербургъ. 1818. стр. 470—471.

(\*\*) Orfila. Пр. Соч. 11. Т. стр. 461.

лиспахъ (\*), особливо скопленіе мокрыхъ чайныхъ листовъ въ ящикахъ, выложенныхъ свинцомъ, есть, можетъ быть, причина при-  
мѣси къ чаю сихъ металловъ, — причина не-  
всегда умышленная и зависящая иногда отъ невѣ-  
дѣнія. Обстоятельство сіе однакожь не совер-  
шенно извѣстно. *Каде* (\*\*) и *Окенъ* (\*\*\*) говорятъ,  
что для сушенія чайныхъ листовъ употреб-  
ляются не мѣдныя, но желѣзныя пластинки.  
Свинцовый сахаръ, говоритъ *Вильдбергъ* (\*\*\*\*),  
прибавляющъ нарочно къ худшему чаю для  
доставленія ему спягивающаго вкуса. Напро-  
тивъ того Копорскій чай былъ искусственная  
смѣсь, состоявшая въ томъ, что обваренные,  
сквозь рѣшено протертые и высушенные  
листья вышеупомянутыхъ растений продава-  
лись вмѣсто Кипайскаго чаю. Далѣе извѣстно,  
что свѣже-собранный чай имѣетъ оглушающее  
свойство, которое Кипайцы, по увѣренію  
нѣкоторыхъ, употребляютъ тѣмъ, что даютъ  
лежать чаю цѣлый годъ и потомъ уже оп-

(\*) Bernt. Пр. соч. I. В. стр. 372. §. 964.

(\*\*) Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle. Juin, 1808. стр. 466.

(\*\*\*) Oken's Naturgeschichte für Schulen. Leipzig. 1821. стр. 553.

(\*\*\*\*) Пр. соч. стр. 142. § 277.

пускають оный въ продажу, поправляя при-  
семъ запахъ его растипельными вещеспвами,  
содержащими въ себѣ эирное масло (цвѣтами  
*oleae fragrantissimae* (\*), листьями *camelliae*  
*Japonicae* (\*\*)) и проч. Примѣсь мѣди къ кофе  
зависитъ болѣе отъ храненія и варенія его въ не-  
чиспой мѣдной посудѣ. Пережженный цикорей-  
ный корень примѣшивается только къ переж-  
женному и смолопому кофе продажному, для  
умноженія вѣсу. Чпо же касается до состава  
*Eau de Javelle*, то подмѣсь сію однажды  
только видѣлъ и изслѣдовалъ славный Про-  
фессоръ *Орфила* (\*\*\*). Чрезъ растипаніе шо-  
коладныхъ бобовъ въ нечиспой мѣдной и оло-  
вянной посудѣ можетъ иногда случиться  
ядовиная подмѣсь шоколада. Дабы замѣнить  
шоколадное масло, которое иногда нарочно  
извлекается изъ шоколадныхъ бобовъ, подмѣ-  
шиваютъ къ шоколадному пѣспу жиръ, вы-  
жапыя масла, иногда же прибавляютъ крах-  
маль, муку, всего чаще гороховую и чечевич-  
ную, попому чпо мука сія удобнѣе соединяется

---

(\*) *Neues medicinisches Kochbuch etc. v. J. P. Bodo Menzzer. Bremen. 1817. I. Т. стр. 118.*

(\*\*) *Oken. Пр. соч. стр. 553.*

(\*\*\*) *Пр. соч. Т. II. стр. 461 - 463.*

съ шоколаднымъ пѣспомъ, нежели всякая другая мука. Наконецъ касательно кофейныхъ бобовъ извѣстно еще и то, что свѣже-собранное кофе не имѣетъ пріятнаго вкуса, и потому Арабы провѣтриваютъ такое кофе во время морскихъ путешествій на корабляхъ, послѣ чего начинаютъ уже употреблять оное для пипья.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей питій водныхъ.* Мѣры для сего нужныя располагаются по качеству веществъ, изъ коихъ приготовлено водяное пипіе. Для отвращенія порчи и подмѣсей кваса требуется вообще, чтобы онъ приготавлиемъ былъ надлежащимъ образомъ, изъ хорошихъ матеріаловъ, чтобы хранимъ былъ въ прохладномъ мѣстѣ и не оставался долго безъ употребленія, особливо въ жаркое время года. Касательно чаю, кофе и шоколада, многіе писатели, основываясь на значительной дороговизнѣ и весьма часпой посему подмѣси сихъ иностранныхъ произведеній, совѣтовали замѣнять оныя отечественными распеніями, уподобляющимися качествомъ своимъ симъ веществамъ. Такъ вмѣсто чаю предложена права мелиссы (*melissa officinalis*), вероники (*veronica officinalis*), розы

шиповатой и мохлятой (*rosa spinosissima et villosa*), земляники (*fragaria vesca*). Въмѣсто кофе: желуди, морковь, рисъ, сладкіе кашпаны, лѣсные орѣхи, земляные миндали (*cyprus esculentus*). Однакожъ всѣ сіи замѣнные вещества могутъ также быть подвержены подмѣсамъ небезвреднымъ, даже ядовитымъ. Такъ въ одномъ случаѣ (\*) вмѣсто земляныхъ миндалей взяты были ягоды сонной одури. Посему лучшее предохранительное средство состоятъ въ томъ, чтобы привозныя вещества сіи, подобно импортированнымъ приностямъ, не поступали въ продажу прежде надлежащаго оныхъ осмотра.

*Распознаваніе порки и подмѣсей питья водяныхъ.* Оно состоитъ :

*Во первыхъ, въ показаніи недостатка естественныхъ качествъ.* Такъ

1) Хорошій квасъ имѣетъ умѣренно-кисловатый вкусъ, равномерно жидкій составъ, безъ осадка на днѣ сосуда, наполненнаго онымъ.

2) Хорошій чай, будучи размоченъ въ кипячей водѣ, представляетъ яйцевидные листочки, имѣющіе мелкозубчатый край и приятный за-

---

(\*) Hartleben. Пр. соч. 1801. Мау. стр. 502.



пахъ. Чѣмъ меньше величина сихъ листочковъ, тѣмъ лучше чай. Такъ называемый Царскій чай (*thaea caesarea*, Gun powder tea. Angiogum) имѣетъ нѣкоторое сходство съ пушечнымъ порошкомъ, но очертаніемъ своимъ болѣе подобенъ пшеничнымъ сѣменамъ, опъ которыхъ отличается только болѣею величиною; цвѣтомъ своимъ сходенъ онъ съ сухими лавандовыми цвѣтами. Онъ состоитъ изъ нѣжныхъ, едва распускившихся листочковъ, сорванныхъ въ исходѣ Февраля и началѣ Марта и бываетъ въ видѣ нѣрубчечекъ зеленоватыхъ, съ весьма пріятнымъ запахомъ и бальзамическимъ, легко спягивающимъ вкусомъ. Чай сей рѣдко попадаетъ безъ подмѣси (\*). Обыкновенный чай (*thaea bohea*) отличается темнобурымъ или черноватымъ цвѣтомъ, спягивающимъ вкусомъ и нѣсколько розовымъ запахомъ. Зеленый чай (*thaea viridis*) отличается болѣе курчавыми листочками, цвѣта зеленаго, отличающаго голубоватымъ, запаха нѣсколько фиалковаго; онъ сообщаетъ водѣ зеленоватый цвѣтъ.

---

(\*) Въ Лондонскомъ Музеумѣ (British Museum) видѣлъ я въ настоящемъ видѣ чай сей, присланный онъ Китайскаго Императора въ даръ Англійскому Королю.

3) Хорошее кофе состоишь изъ малыхъ, твердыхъ, тяжелыхъ, равномерную величину имѣющихъ бобовъ, зеленоваго цвѣта, едва примѣтнаго горьковаго вкуса и особеннаго, впрочемъ слабаго, запаха. Очертаніе сихъ бобовъ продолговатое и одна поверхность выпуклая, а другая плоско вдавленная, съ жолобоваго по дѣли въпадиною. Чѣмъ меньше величина бобовъ, тѣмъ лучше кофе. Левантское или Арабское кофе состоишь изъ малыхъ, темнозеленыхъ бобовъ и есть самое лучшее. Яванское или Остъ-Индское кофе состоишь изъ довольно большихъ, блѣдно-желто-бѣлыхъ бобовъ и есть самое худшее. Вестъ-Индское или Мартиникское кофе имѣетъ бобы средней величины и зеленоваго цвѣта; оно лучше Остъ-Индскаго. Къ признакамъ хорошаго кофе принадлежитъ и то, если пережженное кофе имѣетъ весьма примѣтный пріятный запахъ; также если опваръ сырыхъ бобовъ по просуженіи получаетъ желто-лимонный цвѣтъ. Наконецъ чѣмъ болѣе бобы кофе очищены отъ шелухи, тѣмъ оно лучше, потому что хотя Арабы изъ легко-поджаренной шелухи сей приготавливаютъ кофе отличной доброты (café à la Sultan), въ нашихъ однакожъ спрѣвахъ

совершенно высохшая шелуха кофейная уже неспособна къ доставленію споль пріятнаго пипья.

4) Хорошій шоколадъ (въ пластинкахъ) имѣетъ темнобуро-красноватый цвѣтъ, гладкую поверхность, изломъ ровный, безъ крошекъ и блестящихъ почекъ, легко распускается во рпу и производитъ пріятное чувство прохлады; будучи растворенъ въ водѣ или молокѣ, сообщаетъ, по замѣчанію *Пармантье* (\*), симъ жидкостямъ умѣренную, не слишкомъ большую густоту; причемъ на поверхности жидкости оказываются масляныя капли.

*Во вторыхъ, чрезъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ, куда относятся слѣдующія :*

1) Квасъ имѣетъ значительную мутность и прѣсный вкусъ, либо напропивъ вкусъ его чрезмѣрно кислый, рѣзкій. Въ первомъ случаѣ квасъ еще молодъ, а во второмъ слишкомъ старъ.

Квасъ, подмѣшанный попашемъ, будучи предварительно процѣженъ, зеленитъ фіалко-

---

(\*) Pfaff u. Friedländer. Пр. соч. Ст. Ч. 6.

вый сиропъ. Если потомъ процеженный квасъ сей выпарить слегка и къ густовающей жидкости прилить водный растворъ солянокислой платины (*hydrochloras platinae*), то дѣлается желто-нижевый осадокъ, — знакъ присутствія поташа.

2) Чай, настоянный чистою кипячею водою, представляетъ жидкость, имѣющую посторонній запахъ и вкусъ. Размоченные листья его (если оные удержали еще видъ свой) имѣютъ несоразмѣрную величину, кожеобразную плотность, разнообразное очертаніе и неяркій цвѣтъ.

Если въ чайной настойкѣ оказывается цвѣтчатая пленка, то сіе, по замѣчанію *Вильдберга* (\*), доказываетъ, что чай подмѣшанъ какимъ либо эфирнымъ масломъ.

Если чай подмѣшанъ мѣдью, то нужно къ крепкой чайной настойкѣ прибавить водный растворъ амміака; отъ сего сдѣлается темноголубоватый осадокъ, который чрезъ накаливаніе съ угольнымъ порошкомъ превращается въ чистую мѣдь (*regulus cupri*). Либо значительная часть чаю варится съ креп-

---

(\*) Пр. соч. стр. 142. § 277.

кимъ и чистымъ уксусомъ, процѣживается, а оставшееся на цѣдикѣ выжимается. После сего, чтобы опскрыпъ мѣдь, нужно въ жидкость сію погрузить на нѣсколько часовъ лезвее ножа, съ прибавленіемъ нѣсколько фосфора; чрезъ сіе, буде мѣдь находишся, лезвее покрывцо будетъ красною корою.

Для опскрыпія свинца, чай, такимъ же образомъ вскипяченный съ уксусомъ и процѣженный, смѣшивается съ сѣроводороднымъ газомъ или съ водою, насыщенною симъ газомъ; опъ сего дѣлается черный осадокъ, который чрезъ накаливаніе съ пошашемъ превращается въ чистый свинецъ (reg. plumbi).

3) Кофейные бобы весьма легкіе, плавающие на поверхности воды въ сосудѣ, имѣющіе бурый цвѣтъ или темный, съ непріятнымъ запахомъ, сушь или лежалые или подмоченные. Если бобы кофейные, наливые кипячею водою, сообщаютъ сей жидкости бурый или зеленый цвѣтъ, но они неспособны, какъ замѣчаетъ *Эргартъ* (\*), къ употребленію, равно какъ и бобы, имѣющіе мягкій, плесенью покрывшій

---

(\*) Пр. соч. 3 В. стр. 223.

составъ, издающіе при поджариваніи оныхъ отвратительный запахъ.

Для открытія мѣди въ кофе нужно отваръ его осветлить помощью хлора и образующійся отъ сего осадокъ отдѣлить процеженіемъ. Пономъ осветленная жидкость испытывается крѣпкимъ нашатырнымъ спиртомъ (см. примѣсь мѣди къ чаю). Если бы при осветленіи сего отвара хлоромъ мѣдь превратилась въ нерасстворимое вещество, то нужно осадокъ, оставшійся на цѣдикѣ, накаливать съ угольнымъ порошкомъ, для полученія чистой мѣди (см. выше).

Примѣсь цикорейнаго пережженного корня узнается изъ того, что порошокъ кофе, растираемый между большимъ и указательнымъ перстами, оказываетъ менѣе твердости, нежели порошокъ чистаго кофе. Если сими же смоченными перстами сжимать довольно крѣпко порошокъ кофе, смѣшаннаго съ цикоріемъ, то образуется комочекъ; между тѣмъ какъ порошокъ чистаго кофе при такомъ же сжиманіи неизмѣнно удерживаетъ порошкообразный видъ. Вкусъ чистаго кофе горькій, а вкусъ кофе, подмѣшаннаго цикоріемъ, горькій и вмѣстѣ кисловатый.

Если кофейный опваръ, подправленный уже молокомъ или сливками, смѣшанъ будетъ съ пакъ называемою Eau de Javelle, состоящею изъ попаша и хлора, то, по совѣту Орфили (\*), нужно часпъ сего опвара смѣшати съ 6-ю часпиями (по объѣмности) алкоголя въ 36° и болпашъ; спустя нѣсколько времени, изъ молока и кофе образуются хлопцы; жидкость, отдѣленная отъ сего осадка чрезъ процѣженіе, имѣетъ желтоватый цвѣтъ, возстановляетъ голубой цвѣтъ лакмусовой бумаги, окрашенной какою либо кислотою и отъ прибавленія солянокислой платины дѣлаетъ обильный желтый осадокъ. Оба сія явленія чрезъ продолжительное слабое выпариваніе жидкости дѣлаются гораздо болѣе явственными (\*) и доказываютъ очевидно присутствіе попаша въ кофе. Въ другую часпъ кофейнаго опвара погружается для открытія хлора пластинка серебра и опваръ подогревается;

---

(\*) Пр. соч. стр. 461-462.

(\*\*) Чистый опваръ кофе съ молокомъ или сливками свершывается отъ прибавленія алкоголя, но не возстановляетъ цвѣта лакмусовой бумаги, окрашенной кислотою; равно опваръ сей съ солянокислою платиною дѣлаетъ едва примѣнный только осадокъ.

за сѣмъ серебряная пластинка вкорѣ имѣетъ (здѣсь образуется *chloruretum argenti nigritum*). Пластинка сія, обмытая перебранною водою и попомъ погруженная въ водяной растворъ амміака, получаетъ прежній свой блескъ, а растворъ амміаковый ошъ прибавленіи къ нему селипреной кислоты дѣлаетъ бѣлой осадокъ (*chloruretum argenti album*). Если опытъ сей былъ неудаченъ, то одно уже опытыіе пошана доспащочно въ сѣмъ случаѣ, пошому что Eau de Javelle именно ошъ примѣси пошана дѣлается ядовитною (\*).

4) Шоколадъ, приготошвенный изъ шоколадныхъ бобовъ прогорѣлыхъ, пороченныхъ червями, слишкомъ пережаренныхъ, оплнчаетъ шѣмъ, что опваръ его образуетъ осадокъ на днѣ сосуда; сверхъ сего вкусъ шакото опшара горькій.

Шоколадъ, смѣшанный съ деревяннымъ масломъ или жиромъ, имѣетъ, по замѣчанію *Пармантье* (\*\*), запахъ сырный; вкусъ его сальный.

Для опырыніи въ шоколадъ мѣди или

---

(\*) Orfila. Пр. соч. стр. 463.

(\*\*) Пр. соч. стр. 459.



свинца нужно опваръ его освѣплить помощію хлора, опдѣлить процѣженіемъ образующійся присемъ осадокъ, выпарить слегка чистую жидкость и поступать такъ, какъ сказано объ опкрытіи мѣди и свинца въ кофе.

Шоколадъ, смѣшанный съ гороховою или чечевичною мукою, имѣетъ вкусъ пѣсна; при вареніи онаго слышенъ запахъ клея и послѣ проспуженія сего опвара образуется студень. Для опкрытія и малѣйшаго количества сихъ примѣсей въ шоколадъ *Орфила* (\*) предлагаеиъ одну часть шоколада кипятить около 8-10 минутъ съ 6-7-ю частями перегнанной воды; потомъ жидкость освѣпляется хлоромъ и процѣженіемъ опдѣляется отъ образующагося присема осадка. Освѣпленная жидкость сія, имѣющая желтоватый цвѣтъ и содержащая въ себѣ крахмальное вещество, отъ прибавленія къ ней 2-3 капель спиртной настойки іода получаетъ весьма красивый голубой цвѣтъ. Напротивъ того чистый шоколадъ, такимъ же образомъ освѣпленный,

---

(\*) Прим. мѣст.

получаетъ опть прибавленія сей же наспойки  
юда не голубой, но темный цвѣтъ.

Крахмаль, примѣшанный къ шоколаду,  
опкрывается также, какъ и примѣсь муки  
къ оному.

(Окончаніе въ слѣдующемъ No ).



### III.

УГЛЕКИСЛОЕ КАЛИ И СОДА.

(Bicarbonas potassae et sodae).

Сообщено Профессоромъ А. П. Нелюбинымъ.

#### *Историческое извѣстіе.*

Хотя о пригопвленіи сихъ солей Бона упоминалъ уже въ 1685 году, но введеніе ихъ во врачебное употребленіе послѣдовало не прежде какъ въ XVIII столѣтіи. Въ послѣднія 60 лѣтъ онѣ предписываны были немногими Врачами и припомъ въ нѣкоторыхъ только болѣзняхъ. Новѣйшіе Врачи обратили болѣе вниманіе, нежели ихъ предшественники, на сіи средства и распространили кругъ ихъ употребленія.

#### *Приготовленіе углекислаго кали.*

Послѣ Бона и Картейзера многими Химиками предложены различные способы пригопвленія сей соли, изъ коихъ главнѣйшіе суть слѣдующіе:

1. По предписанію *Бертолета*, слѣдуетъ взять отъ  $1\frac{1}{2}$ -2-хъ частей несовершенно насыщенного углекислаго кали (*subcarbonas potassae*) и одну часть углекислаго амміака; или, что еще гораздо выгоднѣе, по *Бухгольцу* и *Мейснеру*, одну часть перваго и  $1\frac{1}{2}$  части послѣдняго. Какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ обѣ щелочи растворяются въ водѣ, растворы ихъ смѣшиваются вмѣстѣ и на слабomъ огнѣ изъ реторты амміакъ отдѣляется перегонкою. Находящаяся въ ретортѣ жидкость переливается въ выпарительную чашку, выпаривается и спавится въ холодъ для кристаллизовація.

2. *Гермштедтъ* совѣтуетъ брать произвольное количество *subcarbonatis potassae*, которое разсыпается тонкимъ слоемъ въ глиняномъ сосудѣ и выставляется въ погребъ либо другое мѣсто, гдѣ происходитъ броженіе винъ и другихъ жидкостей, отдѣляющихъ углекислоту. По прошествіи 6-ти либо 8-ми недель совершается совершенное насыщеніе щелочи, которая растворяется въ 3-хъ частяхъ тепловатой воды, процѣживается, выпаривается и кристаллизуется.

3. Сія соль также весьма выгодно получается пропущеніемъ углекислаго газа (изъ мѣла и сѣрной кислоты) чрезъ крѣпкій растворъ углекислаго кали до тѣхъ поръ, пока онъ насытится совершенно углекислою. Жидкость потомъ процеживается, выпаривается и кристаллизуется.

4. Бутылъ, вмѣщающую въ себя до 10-ти фунтовъ воды, наполни углекислымъ газомъ (полученнымъ изъ мѣла помощію сѣрной кислоты), влей въ оную растворъ изъ 1 унціи углекислаго кали и  $1\frac{1}{2}$  унціи воды и сильно взболтай; потомъ время отъ времени опрыскай оную и взбалтывай въ продолженіе трехъ сутокъ. При спокойномъ спояніи жидкости образуются кристаллы, которые слѣдуетъ слегка обмыть водою и высушить.

*Примѣч.* Для составленія сего препарата надлежитъ брать углекислые камни, приготовленные изъ очищеннаго виннаго камня.

#### *К а ч е с т в а.*

*Bicarbonas potassae* кристаллизуется 4-хъ-сторонними призмами либо табличками. Кристаллы не сыръютъ на воздухъ, но опчаспи вывѣтриваются, имѣютъ бѣлый цвѣтъ и

слабый, но не щелочный вкус. Въ 4-хъ частяхъ холодной и почти въ равныхъ частяхъ кипячей воды растворяется. Растворъ не окрашивается куркумовой бумаги и не производитъ мутности въ растворъ сѣрнокислой магнезии. Въ алкоголь почти вовсе не растворяется. Помощію кипяченія съ водою и накаливанія часть угольной кислоты отдѣляется и соль пакн обращается in subcarbonatem potassae. 100 частей состоятъ изъ 53,0 кали, 43,0 кислоты и 4,0 воды.

*Приготовление углекислой соды.*  
(Bicarbonas sodae).

Совершенно насыщенная углекислая сода хотя можетъ быть приготовлена такимъ же образомъ (по четыремъ способамъ), какъ и углекислая кали (bicarbonas potassae), но для сего преимущественно избираются слѣдующіе способы:

1. Чрезъ крѣпкій растворъ очищенной углекислой соды пропускай отдѣляющійся изъ мѣла и сѣрной кислоты углекислый газъ до тѣхъ поръ, пока онъ насытится совершенно углекислотою. Послѣ сего жидкость процѣди, выпари и выкристаллизуй.

2. Крѣпкій растворъ углекислой соды выѣшавъ въ погребъ либо другое мѣсто, гдѣ происходитъ броженіе винъ и другихъ пѣнящихся жидкостей, опредѣляющихъ углекислоту. По прошествіи 7 или 8-ми недѣль совершается (но еще несовершенное) насыщеніе щелочи, копорая процѣживается, выпаривается и кристаллизуется.

3. Растворъ, составленный изъ  $1\frac{1}{2}$  унцій очищенной углекислой соды и  $3\frac{1}{2}$  унцій рѣчной воды, влей въ бутылъ (объемностию въ 10 фунтовъ воды), наполненную углекислымъ газомъ и сильно взбалтывай, потомъ время отъ времени опшывай оную и продолжай взбалтыванъ въ продолженіи 3-хъ сутокъ. При спокойномъ сполніи жидкости образуются кристаллы, копорые надлежитъ слегка обмыть водою и высушить.

4. Четыре унціи очищенной углекислой соды раствори въ 8-ми унціяхъ перегнанной воды и прибавь  $1\frac{1}{2}$  унціи углекислаго амміака (*subcarbonas ammoniae siccus*); смѣсь сію влей въ выпарятельную чашку и при теплоствѣ  $45^{\circ}$  Р. ш., при безпрестанномъ мѣшаніи, выпаривай до появленія на поверхности соляной кожицы. Потомъ жидкость поставь

въ холодное мѣсто для образованія кристалловъ, коихъ обыкновенно получается болѣе 2-хъ унцій. Для сбереженія амміака можно производить выпариваніе въ тубулапной репортѣ съ приспавленнымъ къ ней приѣмникомъ.

### *Качества.*

*Bicarbonas sodae* кристаллизуется весьма мягкими, сдвинутыми, 4-хъспоронними таблицами; большею же частію садится въ видѣ коры и порошка. Онъ прудно перемѣняюща на воздухѣ, имѣющъ бѣлый цвѣтъ и слабый солоноватый вкусъ. Въ 13-ти частяхъ холодной и 4-хъ частяхъ горячей воды растворяюща. Растворъ не окрашивается куркумовой бумаги и не производитъ мутности въ растворъ сернокислой магнезіи. Въ алкоголь не растворяется. Помощію кипяченія съ водою и накаливанія части угольной кислоты отдѣляется и соль пакы обращается въ прежнее состояніе (*subcarbonas sodae*). Она состоитъ изъ 47. части, 52 угольной кислоты и 14 частей воды, или 1 аптома соды, 2-хъ аптомовъ угольной кислоты и 1 аптома воды.



### Динамическое дѣйствіе щелочей.

Дѣйствіе щелочей многіе сравниваютъ съ металлическими окислами, наиболѣе по-тому, что онѣ въ первыхъ пупяхъ мало или вовсе не подвергаются уподобленію (*assimilatio*), но безъ всякой почки перемѣны оп-дѣляются съ мочею. Онѣ дѣйствуютъ на репродуктивную систему, особенно же на лимфатическіе сосуды и желѣзы, умножаютъ опдѣленіе соковъ и вспомошествоуютъ всасы-ванію сосудовъ и въ тоже время раскисляютъ соки и стремятся похищать изъ оныхъ кис-лотворъ. Посему онѣ дѣйствуютъ пропивно кислотамъ и справедливо названы прежними Врачами пропивокислотными средствами (*antacida*). Проникнувъ во впорые пупы, пре-пятствуютъ сверпыванію и образованію пластической матеріи, особенно же разруша-ютъ студенистую матерію и бѣлкованое вещество, равно и волокнистую и печенковую (*crur sanguinis*) часть крови и низводятъ оную въ низшую степень жизненности, сооб-щая ей венозный характеръ.

Отъ сего свѣжесть кожи исчезаетъ, пол-нота пѣла замѣняется левкофлегмазіею, пере-ходящею въ цынгу; за сѣмъ слѣдуютъ разру-

щение соковъ, потеря мышечной раздражи-  
 тельности, растворение органическаго состава  
 липидныхъ частей и обращеніе онаго въ массу,  
 мылу подобную. При продолжительномъ упо-  
 требленіи щелочей нарушается пищевареніе  
 и уподобленіе питательнаго сока, языкъ по-  
 крывается нечистотою, позывъ на пищу  
 пропадаетъ, образуются выпры въ животѣ  
 и появляется поносъ либо запоръ. Послѣ сего  
 дѣйствія на кишечный каналъ и на кровото-  
 ченіе щелочи распространяющъ свое вліяніе  
 на органы растительнаго образованія, особен-  
 но же на лимфатическую систему, желѣзы  
 и серозныя оболочки; отъ чего движеніе на-  
 соки совершается свободнѣе и скорѣе; она  
 становится жиже и самое всасываніе лимфа-  
 тическими сосудами происходитъ сильнѣе.  
 Отъ сего не только жидкія изліянія (exsuda-  
 tio) въ клетчатную плеву, но и другія низ-  
 шаго образованія болѣзненныхъ произведенія,  
 оплагающіяся къ разнымъ органамъ, сначала  
 растворяются, а потомъ всасываются лим-  
 фатическими сосудами. Въ слѣдствіе произ-  
 водимаго щелочами въ лимфатическихъ сосудахъ  
 усиленнаго всасыванія онѣ, какъ кажется,  
 имѣютъ преимущество предъ минеральными

средствами, кои въ зобѣ и другихъ подобныхъ болѣзняхъ употребляются иногда безъ всякой пользы.

Съ симъ дѣйствиемъ на лимфатическую систему и кровообращеніе въ тѣсной связи дѣйствіе ихъ на мочевые пути. Они дѣйствуютъ подобно мочегонительнымъ средствамъ, но сильнѣе ргуппи, которая не дѣйствуетъ непосредственно на мочевые пути, но только умножаетъ всасываніе лимфатической системы. Щелочи разрушаютъ составъ мочи, соединяющагося съ мочевою кислотою, обременяющаго мочу соляными основаніями и сообщаютъ ей серозное качество, что приписывается чистому химическому дѣйствию щелочныхъ солей. Но не лзя впрочемъ не согласиться, что благотворное дѣйствіе щелочей, производящее разрушеніе мочевыхъ камней, зависитъ наибодѣе отъ динамическаго оныхъ дѣйствія, обнаруживающагося на метаморфическія образованія въ организмѣ. Известно, что при избыточномъ пипаніи пѣла излишняя животная матерія опдѣляется въ мочѣ и по мѣрѣ ея перевѣса относительно къ жидкости, осѣдаетъ въ мочевомъ пузырьѣ, кристаллизуется и служитъ къ образованію

мочевыхъ камней. Здѣсь щелочи дѣйствуютъ не только на умноженіе отдѣленія мочи, но также на пищевареніе и уподобленіе соковъ, уменьшаютъ питаніе плѣти и ограничиваютъ образованіе живоїной матеріи, ея измѣненіе и самое оплодженіе къ мочѣ. Щелочи вспомошествоуютъ мѣсячному кровоочищенію, но только при сопряженіи съ нервными припадками. Онѣ также умножаютъ отдѣленіе въ дыхащельныхъ органахъ. Въ хроническихъ воспаленіяхъ репродуктивной системы, поражающихъ слизистыя и серозныя оболочки, желѣзы и другіе органы (въ крупѣ, глазныхъ воспаленіяхъ и прочихъ недугахъ), оказались онѣ равнымъ образомъ весьма полезными.

Относительно противусудорожнаго дѣйствія щелочей не лѣзя еще сказать утвердительно, дѣйствуютъ ли онѣ непосредственно на нервы или сіе совершается только посредствомъ репродуктивной системы. Если съ одной стороны взять въ разсужденіе сильное ихъ дѣйствіе на репродуктивную систему и излеченіе тѣхъ только судорогъ, кои происходятъ не отъ непосредственнаго спораданія нервной системы, но системы репродуктивной, и кои чрезъ отраженіе на нервную обна-

руживаются, какъ по: судороги онъ задержанной испарины и пріоспаовленнаго мѣсячнаго кровоочищенія, равно какъ и поперебвное упопреленіе щелочей съ опіемъ: по сіе свідѣтельствуютъ только о посредственномъ (indirecte) ихъ дѣйствіи на нервную систему; но съ другой стороны, разсмапривая опрареленіе щелочами и также скорую помощь, доставляемую ими въ числѣхъ нервныхъ припадкахъ, съ судорогами сопряженныхъ, и излеченіе сихъ недуговъ безъ всякаго прибавленія опія, не лѣзя не согласишься, что онъ дѣйствуютъ также и непосредственно (directe) на нервную систему. Сіе непосредственное ихъ дѣйствіе, кажется, болѣе всего обнаруживается на периферическую нервную систему и приномъ сильнѣе на центральные органы репродуктивной и мышечной системы, какъ сіе видѣть можно при нервномъ спарданіи желудка, случающемся при опрареленіи щелочами. Онъ дѣйствуютъ на нервную систему экспансивнымъ образомъ; почему и укрощаютъ тѣ только судороги, кои зависятъ онъ перевѣса констрактивной дѣятельности нервной системы предъ экспансивною, онъ чего образуются spasmi tonici, въ коихъ

щелочи оказались полеаными. На раздражительную систему малое оказываютъ дѣйствіе; если же онѣ расслабляютъ мышечныя волокны, то сіе происходитъ часцію отъ вышесказаннаго дѣйствія ихъ на нервы и на процессъ уподобленія соковъ. Мнѣніе *Сертигера*, относително электро-гальваническаго дѣйствія, производимаго въ организмъ щелочами, требуетъ подтвержденія.

*Болезни, въ коихъ углекислые кали и углекислая сода (bicarbonas potassae et bicarbonas sodae) употребляются.*

Углекислые кали и сода, бывъ насыщены угольною кислотою, не производятъ припадковъ распроеннаго пищеваренія и могутъ быть употребляемы долгое время и въ значительномъ количествѣ безъ всякаго вреда. Они предписываются въ слѣдующихъ болѣзняхъ:

1. Въ острыхъ воспаленіяхъ органовъ репродуктивной системы, какъ то: желѣзъ, лимфатическихъ сосудовъ, слизистыхъ и серозныхъ оболочекъ, при наклонности къ изліянію и самому опложенію лимфатической матеріи къ важнымъ органамъ и образованію болѣзнен-

ныхъ произведеній. Посему послѣ кровопусканія соли сіи употребляются вмѣсто рпушныхъ и сюрмяныхъ препараговъ. Въ новѣйшее время опытно прославили сіи средства *Эгертъ*, *Гелвей*, *Фоссъ*, *Дорфмюллеръ* и другіе въ крупѣ, *Маскагни* въ воспаленіи легкихъ, *Сертирнеръ* и *Алканъ* въ воспаленіи брюшины (peritonitis) и родильной горячкѣ (f. puerperarum).

2. Въ трудномъ пищевареніи, потерѣ аппетита и кислотахъ первыхъ путей, происходящихъ отъ нарушеннаго отправленія системы вороніи вены. Сюда слѣдуетъ отнести: изгагу, кислыя опрыжки, циношу, рвошу, судороги желудка, молочницу, колику, поносъ и зеленое испражненіе низомъ.

3. Въ каменной болѣзни (lithiasis), образовавшемся пескѣ, слизи и гнойной мацеріи въ мочевыхъ путяхъ употребляли средства сіи уже прежде сего съ успѣхомъ *Фалкоцеръ*, *Маскагни*, *Люисциусъ* и другіе. Въ новѣйшее время *Голе* и *Брандъ* подтвердили химическое дѣйствіе щелочей на мочевые камни, кои отъ оныхъ растворяются (небольшіе) и извергаются съ мочою.

4. Въ *артритической ломотѣ*, происходящей отъ излишняго питанія тѣла и спирадна пицеварительныхъ органовъ, целочи даются въ припадковъ, и также въ хронической ломотѣ при наростахъ костей (*Scudator*).

5. Въ *хроническомъ ревматизмѣ*, сопряженномъ съ золотухою, равно и при расположеніи къ образованію лимфатическихъ опухолей, нарывовъ, оптвердній желѣзъ и переносовъ къ нервамъ, отъ коихъ приключаются: параличъ, судороги и другіе многіе недуги.

6. Въ *золотухѣ и паршахъ на головѣ* у маленькихъ дѣтей, когда онѣ произошли отъ излишняго питанія тѣла, равно какъ и золотушномъ оптвердній желѣзъ, *Киркландъ* и *Монро* исключительно употребляли углекислую соду и содержанію оной въ морской губкѣ приписывали дѣйствіе ея въ сей болѣзни.

7. Въ *болѣзняхъ жизнерастительной или репродуктивной системы*, какъ то: въ оптвердній, захряслости, опухоляхъ и въ болѣзненныхъ произведеніяхъ желѣзообразныхъ органовъ. Сюда надлежитъ отнести:

а) *Зобъ (struma et bronchocele)*. *Пейше* ошмынно прославилъ въ сей болѣзни углекис-



лую соду, которая дѣйствиємъ своимъ не токмо не уступаетъ іодину, но имѣетъ еще предъ нимъ по преимуществу, что не разспроиваетъ пищеваренія и составляетъ невинное средство. Онъ беретъ отъ 2-хъ до 4-хъ драхмъ *bicarbonatis sodae* и растворяетъ въ 8-ми унціяхъ воды, и въ обыкновенныхъ случаяхъ даетъ по столовой ложкѣ утромъ и вечеромъ въ небольшомъ спаканѣ винограднаго вина или въ ароматной водѣ. Въ зобѣ съ оптверднѣніемъ лимфатическихъ желѣзъ на шеѣ средство сіе соединяется съ горькими, ароматными и слабительными средствами, какъ по: генціаннымъ корнемъ, девесиломъ, ревенемъ, Александрійскимъ листомъ, айнисомъ и Волошскимъ укропомъ, кои настаиваются въ бутылкѣ винограднаго вина. Жидкости сей дается отъ 2-3-хъ разъ въ сутки по 3 столовыя ложки. *Гуфеландъ* успѣлъ разрѣшить у одной молодой дѣвицы зобъ въ продолженіе 3-хъ недѣль, употребляя растворъ, состоявшій изъ 2-хъ драхмъ *bicarbonatis sodae*, 6-ти унцій мелисной воды и  $\frac{1}{2}$  унцій коричневаго сиропа; лекарство сіе было даваемо 4 раза въ день по столовой ложкѣ. *Ермизъ* приводить два

счастливыхъ случая совершеннаго излеченія зоба симъ средствомъ.

b.) *Отвердѣніе женскихъ грудей*, происшедшее отъ захрислости молока, особливо при золотушномъ расположеніи. Въ семъ случаѣ щелочи даются внутрь и употребляются снаружи.

c.) *Отвердѣніе шультъ*, отъ предшедшаго воспаления оныхъ при задержанномъ переловъ происшедшее.

d.) *Отвердѣніе брыжеечныхъ желлъзъ, дѣтская сухотка, Англійская болѣзнь и сахаристое мочеиспущеніе* излечиваются щелочами, употребляемыми умѣренно и непродолжительное время.

e.) *Отвердѣнія печени, селезенки и поджелудочной желлъзы*, если они произошли отъ неправильнаго опдѣленія, сими органами производимаго.

f.) *Отвердѣніе слонныхъ желлъзъ.*

8. Въ *венерической болѣзни* давно уже *Беснардъ* рекомендовалъ свое средство (tinctura antisiphilitica), состоящее изъ кали и опія. Щелочи наиболѣе употребляются въ *любо-страстной болѣзни*, сопряженной съ золотухою и также первоначально для испребленія яда снаружи, какъ прижигающее средство.

9. Въ *накожныхъ хроническихъ сыпяхъ* (*crusta lactea, psora etc.*), происшедшихъ отъ излишняго питанія пшѣла, или сопряженныхъ съ спаданіемъ желѣзъ.

10. Въ *водяной болѣзни* щелочи, какъ мочегонительное средство, предписывающееся въ особенности при опсвердѣніи брюшныхъ внутренностей, послѣ предшедшаго воспаления серозныхъ оболочекъ и въ *водяной болѣзни*, отъ пьянства происшедшей.

11. Въ *хроническихъ болѣзняхъ легкихъ*, къ коимъ слѣдуетъ отнести:

a.) *Catarrhus pulmonum chronicus*, при расположеніи къ воспаленію слизистыхъ оболочекъ и приостановленномъ отдѣленіи изъ легкихъ и судорожномъ кашлѣ.

b.) *Tubercula pulmonum* и опсвердѣніе желѣзъ дыхательнаго горла при опсуществіи воспаления.

c.) *Pneumonia chronica habitualis*, при расположеніи къ образованію узелковъ въ легкихъ.

d.) *Hectica pulmonum*, при переходеніи легочныхъ узелковъ въ нагноеніе, при доспаичныхъ впрочемъ силахъ больного.

12. Въ *неправильномъ мѣсячномъ кровоотцѣненіи* (*menstrua anormala*), происшедшемъ

онъ судорожнаго состоянія мапки и полно-  
кровнаго шѣлосложенія молодыхъ женщинъ.

13. *Въ судорожныхъ бользняхъ. Ститцъ.* (Stytz) впервые употребилъ сіи средства въ сполбнякъ и судорогахъ нижней челюсти попеременно съ опиѣмъ. Онъ беретъ опъ 2-хъ скрупуловъ до 2-хъ драхмъ *subcarbonatis potassae*, и распворивъ въ 4-хъ унціяхъ воды, даетъ по двѣ столовыя ложки чрезъ одинъ или при часа; причемъ въ промежутки употребляетъ при раза въ сутки опъ 1-3-хъ гранъ опія, соразмѣряя приѣмъ онаго по жестокости припадковъ и самому продолженію болѣзни. Для подкрѣпленія дѣйсвія сего лекарства нужно припомъ предписатьъ больному щелочныя теплыя ванны, одинъ либо два раза въ сутки, въ коихъ больной долженъ оспиваться опъ 7-10 минутъ. Въ случаѣ невозможности употребленія ваннъ замѣняются онъ щелочными обмывеніями всего шѣла или припарками, прикладываемыми на живопъ; при запорахъ же назначаются клистиры изъ мыла или углекислаго кали (опъ 1-2-хъ драхмъ). Щелочи съ равною пользою могутъ быти предписываемы и при другихъ судорогахъ, происшедшихъ опъ просуды, неправильнаго

мѣсячнаго очищенія, переносовъ, кислотъ, образовавшихся въ первыхъ пупяхъ, опъ болѣзненно-измѣненныхъ отдѣленій кишечнаго канала, опвердѣній желѣзъ, заваловъ брюшныхъ внупренностей, равно какъ и опъ прорѣзыванія зубовъ у дѣтей и перваго появленія періодическаго очищенія у молодыхъ дѣвицъ; равнымъ образомъ и въ истерическихъ и ипохондрическихъ судорогахъ щелочи приносятъ всегда пользу.

14. Щелочи составляютъ пропивудія (antidota) при оправленіи кислотами, также распищельными ядами (морфіемъ, наркотиномъ, сприхниномъ, брѹиномъ, опиѣмъ, дигитилиномъ и другими многими алколоидами, равно и синильною кислотою) и при внесеніи живопныхъ ядовъ въ пѣло чрезъ раны (Fontana); особливо при ужаленіи змѣями съ пользою употребляется амміакъ.

#### *Пріемъ и формы пріготовляемыхъ лекарствъ.*

Щелочи несовершенно насыщенные (sub-carbonates) производятъ сильное раздраженіе кишечнаго канала и распроиваютъ пищева-  
реніе. Противное сему видимъ въ щелочахъ,

совершенно насыщенныхъ угольною кислотою (bicarbonates), кои, не оспавляя по себѣ паковыхъ неблагопріятныхъ послѣдствій, соспавляютъ превосходныя средства во всѣхъ вышеисчисленныхъ болѣзняхъ, въ коихъ новѣйшіе Врачи исключительно предписываютъ bicarbonatem potassae et bicarbonatem sodae. Щелочи даются опъ одного до двадцати гранъ на одинъ пріемъ, часпію въ порошокъ и пілюляхъ, часпію же въ растворахъ, микспурахъ, эмульсіяхъ, и служащъ также для соспавленія временныхъ (extemporaneae) искусственныхъ минеральныхъ водъ.

*Порошокъ желудочный.*

(Pulvis digestivus).

R. Bicarbonatis potassae,  
Flaredinis corticum aurantiorum,  
utriusque pares portiones

M. F. pulvis Dr.

или

R. Bicarbonatis potassae sesquidrachmam,  
Radicis ari drachmas duas,  
Radicis gentianae semunciam.

M. F. pulvis Dr.

Какъ первый, пакъ и впорый порошокъ даюся опъ скрупула до  $\frac{1}{2}$  драхмы, при раза въ дець съ водою.

*Микстура отъ кислотъ.*

(Mixture antacida).

R. Bicarbonatis potassae drachmas duas,

Solve in

Aquae rubi idaei unciiis quatuor,

adde:

— — Naphae unciam,

— — Cinnamomi semunciam,

Syrupicerasorum nigrorum drachmas sex,

M. Dr.

При образованіи кислотъ въ первыхъ пу-  
тяхъ, при кислыхъ опрыжкахъ, жженіи подъ  
ложечкою, пошнопѣ и рвопѣ микстуры сей  
дается по десертной ложкѣ чрезъ каждые  
два часа.

*Желудочная микстура.*

(Mixture cardiaca).

R. Bicarbonatis sodae drachmam,

Solve in

Aquae rubi idaei unciiis quatuor,

adde :

Aquae Naphae unciam,

— — Cinnamomi semunciam,

Syrupi rubi idaei semunciam.

M. Dr. s.

При трудномъ пищевареніи, кислотахъ въ желудкѣ, судорогахъ и боляхъ давать по столовой ложкѣ чрезъ два часа ;

или

R. Bicarbonatis sodae drachmam,

Extracti absinthii drachmas duas,

Solve in

Aquae menthae piperitae unciiis quatuor.

M. Dr.

При слабости желудка и трудномъ пищевареніи принимать по столовой ложкѣ 4 раза въ сутки.

*Пилули желудочныя.*

R. Bicarbonatis sodae drachmam,

Extracti absinthii drachmas duas,

Pulv. Flaredinis cort. aurantior. q. s. ut

f. l. a pil. gr. jii conspergentur pul-

vere corticis Cinnamomi.

Принимать по 5-ти пилуль три раза въ день ;



или

R. Bicarbonatis sodae,

Extracti rhei,

— — — chamomillae vulgaris

utriusque scrupulum unum.

f. massa in pil. xx. divid. Dr. s.

При трудномъ пищевареніи и образованіи  
кислотъ принимать по 4 пилюли ежедневно.

*Порошокъ, образующій угольную кис-*  
*лоту.*

(Pulvis acidum carbonicum evolvens).

R. Bicarbonatis sodae grana decem,

Eleosachari Cinnamomi, vel

— — — menthae piperitae, vel

— — — citri grana quindecim,

M. f. pulvis dispensentur tales doses N<sup>o</sup> vj.

Dr. s.

Принимать въ столовой ложкѣ чистой воды  
и пощасъ запить столовою же ложкою ли-  
моннаго соку или уксуса, смѣшаннаго предва-  
рительно съ водою.

Или

R. Bicarbonatis sodae pulverati drachmant,

divide in vj partes aequales D. s.

Порошокъ No 1-й.

R. Acidi tartarici pulverisati grana decim;  
dispensentur tales doses N<sup>o</sup> sex. Dr. s.  
Порошокъ No 2-й.

Къ порошку подъ N<sup>o</sup> 1-мъ, разпущенному въ чайной чашкѣ холодной воды, надлежитъ прибавить порошокъ подъ N<sup>o</sup> 2-мъ и перемѣшавъ какъ можно скорѣе, принять за одинъ разъ.

*Примѣчаніе.* Имѣя нѣ и другіе порошки въ запасѣ, можно во всякое время и вездѣ составлять искусственную углекислую воду, которая составляетъ проникающее и оживляющее нервы средство, употребляемое обыкновенно при поносахъ и сильной рвотѣ. Употребленіе сей углекислой воды весьма важно при недоспавкѣ чистой рѣчной воды въ мѣстахъ болошистыхъ и необитаемыхъ. Спаванъ холодной воды, смѣшанной съ 2-мя ложками лимоннаго сахара (eleosacharum citri) и вымѣсказанными порошками, составляетъ пріятное, оживляющее и прохладительное питье въ знойное время года.

Въ новѣйшее время углекислую соду начали употреблять для пригововленія искусственныхъ щелочныхъ минеральныхъ водъ, какъ то: Селперской, Спадской, Билинской,

Фахингерской, Вильдунгерской, Гейльнауской и другихъ. Желаящiе пригото­вить сiи воды проспы­мъ и дешевѣйшимъ способомъ должны раство­рить опъ 2-3-хъ драхмъ *bicarbonatis sodae* въ бутылкѣ холодной рѣчной воды и, прибавя къ ней очищенной соляной кислоты одну драхму, зашкнупъ бутылку крѣпко проб­кою и погрузить въ холодную воду, либо обкла­дывать льдомъ, взбалтывая при этомъ время опъ времени смѣсь, въ бутылкѣ находящуюся; послѣ чего оную засмолить хорошо и хранить на льду или въ подвалѣ. Смѣшенiе сiе дѣйствительно содержишь углекислую воду, поваренную соль и углекислый газъ, кои суть главныя составныя части щелочныхъ минеральныхъ водъ.

Углекислая сода съ пользою можетъ быть употреблена за спомомъ съ кислыми винами. Чайная ложка въ порошокъ сухой соды кладется въ небольшой бакальчикъ рейнвейна либо соперна и во время кипѣнiя выпивается за одинъ разъ.

*Дарсетовы желудочныя лепешки*  
(*Pastilli bicarbonatis sodae*).

*Историческое извѣстіе.*

Уже древними Физиологами доказано кислое свойство желудочнаго сока; а въ новѣйшее время *Прутъ* (Prout), *Шильдранъ*, *Преве*, *Лерое* (Leroyer), *Тидеманъ* и *Гмелинъ*, кажущаяся, доснапочно доказали, что онъ содержитъ въ себѣ соляную кислоту, которая насыщается содою, содержащеюся въ опдѣлительныхъ сокахъ кишечнаго канала, и что сие-то насыщеніе составляетъ существенное условіе растворенія и переваренія пищи. Сие подтверждается также опытами *Г-на Дарсета*, произведенными имъ надъ самимъ собою, изъ которыхъ явствуетъ, что *bicarbonas sodae*, употребляемая въ умеренныхъ количествахъ, способствуетъ пищеваренію и дѣйствию своимъ сходствуетъ съ минеральною (щелочною) водою въ Вихи (Vichy). Но какъ сія вода, говоритъ *Г. Дарсетъ*, способствуетъ пищеваренію и употребляется съ опмѣною пользою въ хроническихъ болѣзняхъ кишечнаго канала, равно какъ и въ каменной болѣзни.

шо и углекислая сода съ равною пользою въ сихъ случаяхъ употреблена бывъ можетъ. Распространеніемъ употребленія сей соли мы наиболѣе обязаны *Дарсету*, который предложилъ употреблять оную въ видѣ слѣдующихъ лепешекъ.

*Приготовленіе Дарсетовыхъ лепешекъ.*

Возьми сухой углекислой соды (*bicarbonas sodae*) 80 гранъ, сахара рафинада 25 драхмъ, масла перечной мяты 3 капли. Первые два входящія въ составъ средства преврати, каждое порознь, въ тонкій порошокъ, всыпь оныя въ пространную сухую спялку и сильно прясни около  $\frac{1}{4}$  часа, дабы они хорошо перемѣшались между собою. Потомъ высыпавъ сіе смѣшеніе въ спунку, прибавь эфирнаго масла и прагакантной слизи столько, сколько будетъ нужно для сообщенія массѣ тѣсту подобной густоты, изъ коего по правиламъ Фармацевтическаго Искусства приготовить лепешки вѣсомъ 16 гранъ каждую; послѣ чего высуши оныя въ печь и храни въ плотно зашпнутой сухой спялкѣ для употребленія.

*Примѣчаніе.* Въмѣсто масла перечной мяты можно брать: *Oleum cinnamomi, citri, naphae, rosarum*, либо *Balsamum Peruvianum nigrum*. Лепешки надлежитъ обсыпать или крахмаломъ либо *radice iridis Florentinae*; каждая лепешка содержитъ въ себѣ около  $\frac{3}{4}$  долей грана углекислой соды.

### Б о л ѣ з н и.

Дѣйствіе *Дарсетовыхъ лепешекъ* зависитъ отъ углекислой соды; посему онѣ предписываются во всѣхъ тѣхъ болѣзняхъ, кои выше сего исчислены. *Дарсетъ* совѣтуетъ употреблять оныя въ замѣнъ щелочной минеральной Вихской воды. Но преимущественно онѣ рекомендуются въ трудномъ пищевареніи, образованіи кислотъ въ первыхъ путяхъ, изгачъ, жженіи подъ ложечкою, въ кислыхъ опрыжкахъ, икотѣ, тошнотѣ и рвотѣ. Послѣ употребленія жирной, трудноваримой и въпрямь производящей пищи лекарство сіе *Дарсетъ* давалъ съ опимѣннымъ успѣхомъ; оно наиболѣе прилично особамъ, пресыщающимся за роскошнымъ столомъ, также страдающимъ геморроидальными, истерическими и ипохондрическими припадками. При обратномъ обращеніи больныхъ къ маг-

незіи и другимъ всасывающимъ лекарствомъ лепешки сіи могутъ быти даваемы въ замѣнъ оныхъ во всѣхъ случаяхъ, не исключая и беременнаго состоянія женщинъ, гдѣ плаковыя лекарства предписываются для укрощенія рвош.

---

---

#### IV.

О ЧЕТЫРЕХЪ ПОДКОЛЪННЫХЪ  
АНЕВРИЗМАХЪ, БЛАГОПОЛУЧНО  
ПЕРЕВЯЗАННЫХЪ ПОМОЩІЮ ТУР-  
НИКЕТА, ИЗОБРЕТЕННАГО ДОК-  
ТОРОМЪ ИЛІЕЮ БУЯЛЬСКИМЪ.

*Сообщено имъ самимъ.*

---

Опытъ Анапомическій показываетъ, что если вырѣзать изъ трупа большую какую либо артерію и оную перевязать лигатурою умѣренно, потомъ разрѣзать лигатуру и ножницами вдоль разрѣзать самую артерію: то, разсмащивая оболочки артерій, вы найдёте, что мышечная оболочка подъ лигатурою передавлена, смята, а иногда какъ бы лопнула, что бываетъ различно, смотря по степени сжатія.

Если же лигатурою перевязать артерію сильно, то по разрѣзаніи лигатуры и артерій разсмащивая увидите, что мышечная



оболочка совершенно перерывана, а внутренняя какъ бы разорвана, особливо подъ уломъ; что также бываетъ различно, смотря по степени сжатія.

Но если артерія перевязана будетъ весьма сильно (\*), то увидите, что оболочки артерій, будучи лигатурою разорваны подлѣ самой лигатуры, по силѣ упругости разойдутся и стѣны артерій не будутъ между собою въ соприкосновеніи; что необходимо для скорого и безопаснаго сращенія артерій; а когда разрѣженіе лигатуры и вдоль самую артерію, то найдете, что мышечная и внутренняя оболочки лигатурою совершенно разрѣзаны, и потому-то мышечная оболочка *жертвая*, по силѣ упругости своей, разойдется, да и наружная оболочка при сильномъ перевязываніи такъ перерываеица, что чуть-чуть держаица, и следовательно въ живомъ пѣтъ онъ сильной перевязки при маломъ движеніи, вздрагиваніи, а особливо чиханіи больного весьма легко артерія лопаетца на мѣстѣ перевязки и слѣдуютъ опасныя и даже смертельныя кровотеченія.

---

(\*) Я произвольно раздѣляю силу сжатія на три степени.

Такое перерѣзываніе артерій лигатурою во время перевязки нѣтъ легче можетъ случиться, когда онѣ бывающъ окислѣнтію; что часто при аневризмахъ и бывающъ.

Сей опытъ на кадаверахъ и наблюденіе надъ живыми людьми совершенно убѣждающъ насъ, что артерію во время перевязыванія, а особливо при аневризмахъ, опы внутреннихъ причинъ происшедшихъ, должно перевязывать легко, умеренно, то есть, чтобы сѣтны артерій между собою только сомкнулись и перестало бы бѣненіе въ аневризмъ. Такое сжатіе артерій и поврежденіе мышечной оболочки весьма опасны для того, чтобы произошло малое въ оболочкахъ воспаленіе, нужное для скорого сращенія оныхъ; и по сей причинѣ, никогда не будетъ кровопеченія. Изъ опытовъ на кадаверахъ и изъ наблюденій надъ живыми людьми увѣрился я несомнѣнно, что все кровопеченія и неблагополучныя опы того исходы операций аневризмъ происходили и происходятъ опы несоблюденія сего правила. И посему бывшее, и нынѣ еще у нѣкоторыхъ Операторовъ оспиающееся прежнее мнѣніе, что артерію должно перевязывать весьма крѣпко, — несправедливо, пропивно познаніямъ

Анатоміи, Физиологіи и Патологіи, а для больных пагубно.

Теперь дѣло состояло въ томъ, что если перевязывать артерію умеренно, то артерія на мѣстѣ перевязки не скоро перегниваетъ и лигатура не выходитъ дней 15-18 и даже, какъ я видѣлъ, до 28 дней.

Дабы удовлетворить обоимъ требованіямъ, то есть, перевязывать артерію умеренно, а лигатуру вынимать скоро, именно, когда спѣны артеріи сраспушся, что бываеетъ чрезъ 4 или 5 дней, — сіе заставило меня выдумать шиковой инструментику, о которой уже и прежде на сей конецъ нѣкоторые Операторы мнѣ предлагали, но по разнымъ неудобствамъ не могъ я сего исполнить.

Турникетикъ мой весь серебряный, весьма малъ и простъ; онъ описанъ и изображенъ на рисункѣ изданныхъ мною Анапомико - Хирургическихъ таблицъ о перевязываніи большихъ артерій,

Многіе изъ Врачей боялись оставлять какой либо металлъ надолго въ соприкосновеніи съ артерією, чтобы по близости оной съ нервомъ не происходило гальваническаго раздраженія на нервъ; но опыты также ясно

доказали, что страхъ сей былъ совершенно напрасенъ.

Я не намѣренъ описывать здѣсь спроеііе и употребленіе сего турникешника, а сообщаю только о сдѣланныхъ мною опытахъ, убедительно доказывающихъ пользу онаго.

Во первыхъ, я сдѣлалъ два опыта надъ собаками, у которыхъ перевязывалъ бедренныя артеріи; у первой турникешникъ оснѣвался 5, а у другой 4 дня, и обѣ собаки скоро выздоровѣли. Потомъ случилось мнѣ сдѣлать 4 опыта сряду надъ людьми съ подкожными аневризмами, и у всѣхъ съ счастливѣымъ успѣхомъ.

1-й. Кавалергардскаго полка рядовой *Трифонъ Пантюхинъ* поступилъ въ больницу 4-го Іюля 1827 года; операція сдѣлана была 3-го Августа того же года, выздоровѣлъ Фѣвралѣ 4-го 1828-го, и получивши отпускъ, отправился на родину. У сего больного аневризматическая опухоль перешла въ нагноеніе и чрезъ нарывъ отдѣлилась поврежденная костью дою пластинка большеберцовой кости. Турникешникъ оснѣвался 5 дней, а лигатура оставлена была еще на два дни, и потомъ вынута.

2-й. Гродненскаго Гарнизоннаго баталіона  
Унтеръ-Офицеръ *Антонъ Тимощевъ* прибылъ  
1829-го Іюня 8-го; операція сдѣлана Іюля 4-го;  
выздоровѣлъ Октября 25-го и отправился  
въ означенный баталіонъ. Турникешикъ оспавался  
4 дня, а лигатура 5 дней.

3-й. Военнорабочей N. 46-го роты Морскаго  
вѣдомства рядовой *Никифоръ Флоровъ* прибылъ  
1829 года Августа 26-го; операція сдѣлана Ок-  
тября 1-го; выздоровѣлъ Декабря 5-го и от-  
правленъ въ роту. Турникешикъ оспавался  
4 дня, а лигатура 5 дней.

Всѣ сіи при операціи сдѣланы въ военно-  
сухопутномъ госпиталѣ Проэкшоромъ Ана-  
поміи Шпабъ-Лекаремъ *Пасломъ Нарановичемъ*  
въ присушествіи Главнаго Доктора Г-на Стап-  
скаго Совѣтника *Гиглера*. Турникешикъ на-  
кладывалъ я самъ и черезъ 5 и 4 дни самъ же  
снималъ.

4-й. Учебнаго Сапернаго Баталіона 1-й ро-  
ты рядовой *Дмитрій Максимъ* поступилъ  
въ госпиталь 11-го Генваря 1830 года; опера-  
ція сдѣлана 15-го Февраля; выздоровѣлъ 28-го  
Апрѣля. Операція сія сдѣлана была въ Артил-  
лерійскомъ госпиталѣ Главнымъ Лекаремъ  
Г-мъ *Талквистомъ*. Турникешикъ оспавался

4½ дня (ибо во всѣхъ артеріяхъ было чрезвычайное сильное бѣіе) и наложить и снять были мною самимъ.

Всѣ сѣи 4 больные въ скоромъ времени выздоровѣли; во время леченія послѣ операций не было съ ними никакихъ особенныхъ przypadковъ или значительныхъ перемѣнъ; о чемъ и сообщаю Врачамъ для вѣрнаго и безопаснаго употребленія сего шпунжесика при дѣланіи операций аневризмъ.

У.

**МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА РАЗ-  
НЫХЪ СТРАНЪ, ГОРОДОВЪ И ПРОЧ.**

Изъ Elements of Medical Statistics и проч.  
By F. Bisset Hawkins, M. Dr. 1829.

---

*Смертность въ разныхъ стра-  
нахъ, городахъ и проч.*

Въ половинѣ прошедшаго столѣтія въ Лон-  
донѣ ежегодно умиралъ 1 изъ 20, а въ 1821-мъ  
1 изъ 40.

Во всей Англіи и Валлисѣ умиралъ 1 изъ 60.

Въ Глазговѣ съ 1801-го по 1826-й 1 изъ 44.41.

Во всей Франціи въ 1781-мъ 1 изъ 29;  
въ 1802 1 изъ 30; въ 1823 1 изъ 40. Въ Парижѣ  
около половины прошедшаго столѣтія 1 изъ  
25; теперь 1 изъ 32.

Въ Pays de Vaud, почтимаемой самою здо-  
ровою сѣраю Франціи, умиралъ 1 изъ 49.

Въ Нѣвціи съ 1775-го по 1795-й ежегодно  
умиралъ 1 изъ 37; въ 1823 1 изъ 48.

Въ Берлинѣ съ 1747-го по 1755-й ежегодно умираетъ 1 изъ 28; съ 1816-го по 1829-й мѣнѣе, нежели 1 изъ 35. Во всей Пруссіи 1 изъ 35.

Въ Мадридѣ 1 изъ 29, въ Римѣ 1 изъ 25, въ Амстердамѣ 1 изъ 24, въ Вѣнѣ 1 изъ 22½, въ Женевѣ 1 изъ 43, въ Неаполѣ 1 изъ 28½, въ Лекгорнѣ 1 изъ 35.

Вообще полагаются, что  $\frac{1}{8}$  часть народа нездорова и  $\frac{1}{100}$  спраждаетъ шрудными болѣзнями.

Во Франціи половина рожденныхъ доживаетъ до 20-ти лѣтъ и претъ до 45-ти. Наименѣе умираетъ десятилѣтнихъ: 1 изъ 130. Въ сорокъ лѣтъ умираетъ 1 изъ 53. Человѣкъ 43-хъ лѣтъ можетъ надѣяться прожить еще 23 года. Смертность больше между бѣдными, нежели между достаточными.

По послѣднему исчисленію во всей Голландіи умираетъ 1 изъ 48, въ Россіи 1 изъ 41, въ С. Петербургѣ 1 изъ 37.

Въ Венеціанской провинціи 1 изъ 28 въ годъ.

*Смертность въ больницахъ.* Въ больницы St. Thomas, въ Лондонѣ, съ 1803-го по 1813-й умираетъ ежегодно по 1 изъ 16; съ 1764-го по 1813-й 1 изъ 15. Отъ внутреннихъ болѣзней



въ печеніи 10-ти лѣтъ умиралъ 1 изъ 9. Въ 1827 году выписано изъ больницы здоровыхъ 3,151, приходящихъ было 9,343, умерло 259, оспалось 879; всего 13,632.

Въ больницу St. Bartholomeus, тамъ же, по опечету 1827 года, выздоровѣло 4,916 лежавшихъ въ больницу, 4,318 приходящихъ и 3,173 случайныхъ; всего 12,407; умерло 350, оспалось 960; всего больныхъ въ печеніи года было 13,367.

Въ больницу St. Georges, тамъ же, по опечетамъ 1825 и 1827, умиралъ 1 изъ 9. Такую большую смертность въ сей больницу приписываютъ пѣсноутъ комнатамъ.

Въ провинціальныхъ больницахъ въ Англіи смертность меньше, нежели въ другихъ государственныхъ. Въ Дублинѣ и Единбургѣ смертность въ общественныхъ заведеніяхъ также меньше. Въ United-Hospital въ Батѣ (Bath) еще меньше; въ 1827 году умеръ 1 изъ 20; въ Хирургическомъ Отдѣленіи 1 изъ 17.

Смертность въ Дублинской больницѣ для горячешныхъ въ послѣдніе годы поспешенно уменьшалась; съ 1804-го по 1812-й умиралъ 1 изъ 12; съ 1812-го по 1814-й 1 изъ 13, а въ 1815 1 изъ 20.

Въ Единбургской Королевской больницѣ съ 1808-го по 1818-й умиралъ 1 изъ 16.

Въ Парижскихъ больницахъ въ 1822 году лежало 47,343 больныхъ, въ домахъ призрѣнія (hospices) 13,216; принесенныхъ дѣтей было на содержаніи Дирекціи 19,557. Средняя смертность всѣхъ больницъ 1 изъ 8. 42. Содержаніе каждаго человѣка стоило въ больницахъ 1 франкъ 76 сопыхъ, а въ домахъ призрѣнія 84 сопыхъ франка.

Смертность въ Hôtel-Dieu въ 1822 году 1 изъ 6. 82; въ отдѣленіи внутреннихъ болезней 1 изъ 6½, въ отдѣленіи наружныхъ 1 изъ 12.

Смертность въ Charité, въ Парижѣ, 1 изъ 5. 53.

Въ Hôtel-Dieu въ Лионѣ умираетъ 1 изъ 11. Въ Монпелье во всѣхъ заведеніяхъ 1 изъ 10.

Въ Берлинѣ, въ больницѣ Charité, въ 20 лѣтъ до 1817-го среднее число умершихъ около 1 изъ 6.

Въ общей больницѣ въ Вѣнѣ умираетъ около 1 изъ 6. Число всѣхъ кроватей 2000, комнатъ 111.

Въ Гражданской больницѣ въ Пескѣ въ 1826 году умеръ 1 изъ 6.

Въ Гражданской больницѣ въ Дрезденѣ въ 1816 умеръ 1 изъ 7.

Въ Мюнхенской больницѣ, недавно и хорошо успроенной, по отчету 1819-го, умеръ 1 изъ 9; всѣхъ больныхъ было 3,500.

Въ больницѣ для бѣдныхъ (чшо мынѣ Маріинская), въ С. Петербургѣ, среднее число умершихъ въ теченіи 14-ти лѣтъ до 1817 года 1 изъ 4½. Въ 1816 году принято въ больницу 2,043, изъ коихъ умерло 461; приходившихъ было 26,968, изъ нихъ умерло 4,072. Въ 1817 году сдѣлана операція изсѣченія камня 32 больнымъ; изъ нихъ умерло 12.

Въ больницѣ Св. Петра, въ Брисселѣ, въ 1823 году умеръ 9-й больной; въ Павіи въ больницѣ San Matteo della Pieta въ 1823 году умерло 10 изъ 100. Всѣхъ больныхъ было 5,287, въ томъ числѣ 42 принесенныхъ умирающими.

Въ Миланѣ, въ большой больницѣ, въ 1823 году умеръ 1 изъ 7. Всѣхъ больныхъ было 13,278.

Средняя смертность больницъ въ Лекгоріи съ 1818-го по 1825-й 1 изъ 7.

Въ двухъ главныхъ больницахъ въ Мадридѣ въ 1818 году было 14,500; сколько въ томъ числѣ приходящихъ, неизвѣстно. Умерло 1,283.

*Статистика родильныхъ домовъ и мертворожденныхъ.* Въ 1750 году въ British lying-in-hospital, въ Лондонѣ, умирала одна роженица изъ 42; въ 1780 1 изъ 60, а съ 1789-го по 1798-й 1 изъ 288. Въ теченіи сихъ десяти лѣтъ одинъ мертворожденный изъ 25, двойни въ одномъ случаѣ изъ 84. Въ 1750-мъ одинъ младенецъ умиралъ изъ 15, въ 1780-мъ одинъ изъ 44, а съ 1789-го по 1798-й 1 изъ 77.

Смертность въ Парижскомъ родильномъ домѣ въ прежнія времена была больше, нежели тогда же въ Лондонѣ. Въ 1822 году она уменьшилась до того, что одна роженица умирала изъ 30. Въ Лондонѣ въ 1826 году 1 изъ 70. Среднее число пребыванія роженицъ въ родильномъ домѣ въ Парижѣ 22 дня.

Въ Дублинскомъ родильномъ домѣ въ 1822 году изъ 2,675 роженицъ умерло 12. Въ семъ заведеніи съ учрежденія его 1757-го года по 1825-й содержаніе родившихся мальчиковъ къ дѣвочкамъ 12: 11.

младенцовъ, умершихъ въ заведеніи . . . 1: 19.

содержаніе мертворожденныхъ	1: 17.
—— двойней . . . . .	1: 60.
—— умершихъ роженицъ	1: 89.
—— тройней и болѣе	1: 4000.

Смертность въ Единбургскомъ родильномъ домѣ 1: 100; въ Спокгольмѣ въ 1822 году 1: 29. Изъ 472 родовъ 11 двойней, 1 тройни и 36 мертворожденныхъ. Умерла 21 роженица, въ томъ числѣ 16 оцъ родильной горячки.

Въ Берлинѣ съ 1796-го по 1806-й одна роженица умирала изъ 42, а въ слѣдующія десятиа лѣтъ 1 изъ 45. Во всей Пруссіи умерла одна роженица изъ 112.

Содержаніе мертворожденныхъ въ послѣднемъ столѣтіи было 1: 25, а въ Спрасбургѣ 1: 8. Теперь въ семъ городѣ 1: 12½.

Въ Швеціи и Финляндіи 1: 40. Вообще въ городахъ болѣе мертворожденныхъ, нежели въ деревняхъ, и между бѣдными болѣе, нежели между достаточными.

Въ Шпудгартѣ замѣчено, что число мертворожденныхъ увеличивается съ умноженіемъ незаконныхъ браковъ. Въ Пруссіи изъ 10-ти законнорожденныхъ дѣтей умираетъ двое, а изъ 11-ти незаконнорожденныхъ трое.

Въ Берлинѣ содержаніе мертворожденныхъ въ продолженіе послѣднихъ 50-ти лѣтъ было почти одинаково. *Каспаръ* представляетъ сіе содержаніе въ Лондонѣ и Вѣнѣ 1: 24, въ Парижѣ и Дрезденѣ 1: 19, въ Гамбургѣ 1: 15.

Содержаніе выкидышей и мертворожденныхъ въ Европѣ гораздо больше между незамужними женщинами, нежели между замужними. Въ *Hôpital des vénériens*, въ Парижѣ, изъ семи младенцовъ двое рождаются мертвыми, а въ таковомъ же заведеніи въ Гамбургѣ одинъ изъ прехъ. Въ Геттингенѣ изъ 100 законныхъ дѣтей родятся мертвыми шрое, а изъ такого же числа незаконныхъ 15.



---

## VI.

### Л Е Ч Е Н І Е   Р О Ж И .

*Извлеченіе изъ сочиненія Лоренца.*  
(Lawrence).

---

Рожа, касательно причинъ, припадковъ и дѣйсвія, подобна другимъ воспаленіямъ; по-сему и леченіе должно быть подобное же, т.е., пропивувоспалительное. Сперва общее и мѣстное испражненіе крови, слабительныя, слабая діета, попомъ соли и попогонныя средства. Чѣмъ раньше будутъ употреблены сіи средства, тѣмъ лучше; дѣятельное леченіе въ началѣ часто сокращаетъ болѣзнь и опивращаетъ распростираніе оной.

Впрочемъ не должно думать, что я предлагаю сильное пропивувоспалительное леченіе, какъ то: общее и мѣстное испражненіе крови во всѣхъ случаяхъ; леченіе рожи, какъ и всякаго другаго воспаленія, должно быть измѣняемо, смотря по возрасту, тѣлосложенію,

предшествовавшимъ болѣзнямъ, періоду болѣзни и проч. Я совѣтую пропивувоспалительное леченіе въ началѣ болѣзни, когда первоначальное и особенное свойство болѣзни явственно, и твердо увѣренъ, что въ семь періодъ такое леченіе всегда будетъ имѣть хорошій успѣхъ.

У людей спарыхъ и слабыхъ болѣзнь сія скоро и примѣнно ослабляетъ силы; и попому Врачъ болѣе долженъ спараться ихъ поддерживать, нежели противодѣйствовать мѣстному злу. Мнѣ нерѣдко случалось видѣть, что больные рожею на лицѣ въ позднѣйшемъ періодѣ при слабости и маломъ пульсѣ, сухомъ и буромъ языкѣ, были излечены употребленіемъ хины и вина.

Рожа, которую видалъ я у молодыхъ людей, почти всегда происходила отъ наружныхъ причинъ и требовала пропивувоспалительнаго леченія. Возбуждающій и крѣпительный способъ леченія для паковыхъ больныхъ всегда былъ вреденъ.

Въ легкихъ случаяхъ достаточно одного мѣстнаго испражненія крови, которое въ сильнѣйшихъ составляетъ вспомогательное средство. Кровососныя банки весьма полезны.



въ соотвѣствующихъ тому случаяхъ, но при сильной боли воспаленной кожи ихъ не лѣзя употреблять. Пѣвки у нѣкоторыхъ людей производятъ на здоровой кожѣ дѣйствіе, подобное рожь; но на воспаленную кожу дѣйствуютъ онѣ иначе, и пупъ можно безъ опасности припускать ихъ во множествѣ.

Опытность показала, что мѣстные средства мало полезны; однакожъ они приносятъ облегченіе больнымъ, хотя нисколько не ограничиваютъ болѣзни. До совершеннаго развитія болѣзни холодныя примочки уменьшаютъ сильный жгучій жаръ. Употребляя прежде примочекъ и вмѣстѣ съ ними соотвѣстственные внутренніе средства, нѣтъ надобности опасаться, что опъ уменьшенія наружнаго воспаления воспослѣдуетъ воспаленіе какого либо внутренняго органа. По развитіи воспаленія теплыя припарки, а особливо примочки, приносятъ большое облегченіе. Дабы получить опъ нихъ всю пользу, нужно продолжать ихъ четыре часа сряду, а въ промежутки покрыть часть припаркою изъ хлѣба и воды.

Дабы опвраратить совершенное развитіе рожѣ флегмонозной, нужно въ первомъ періодѣ сдѣлать общее кровопусканіе, прислѣдить

много пѣвицъ къ спраждающей частии и употребитъ другія противувоспалительныя средства. Кровотеченіе послѣ пѣвицъ поддерживать теплыми примочками, а потомъ прикладывать холодныя примочки; при усилившемся воспаленіи вмѣсто холодныхъ употребляютъ теплыя примочки и припарки. По испражненіи низомъ давати сладкую ругу съ скормяными средствами въ большихъ пріемахъ и среднія соли. Мѣстное испражненіе крови дѣйствительнѣе общаго; послѣднее имѣетъ мѣсто только у людей молодыхъ, полнокровныхъ, при полномъ, крѣпкомъ пульсѣ, либо значительномъ спаданіи головы.

Самое дѣйствительное средство составляютъ наѣчки воспаленной кожи и лежащей подъ нею жирной и клѣпчатой плевы. За пачковыми наѣчками слѣдуетъ весьма скоро, иногда въ ту же минуту, облегченіе; боль и напряженіе прекращаются. Съ симъ облегченіемъ припадковъ происходитъ соотвѣтственное уменьшеніе воспаления, будетъ ли оно находиться въ періодъ изліянія пачки или нагноенія и помершвѣнія. Во время истеченія крови изъ наѣчекъ краснота кожи прилично уменьшается; спусти сущи, она боль-

шею частію совсѣмъ исчезаетъ и по причинѣ опавшей опухоли кожа образуетъ складки. Сколь ни приіпно для больного непосредственное облегченіе, но оно маловажно въ сравненіи съ рѣшишительнымъ вліяніемъ, какое способъ сей имѣетъ на дальнѣйшее распространеніе болѣзни.

Насѣчки имѣютъ мѣсто во всякомъ періодѣ болѣзни; но онѣ гораздо полезнѣе въ началѣ: ибо опшвращаютъ дальнѣйшее ея распространеніе, также нагноеніе и померпвѣніе. Краснота и опухоль поспешенно исчезаютъ, а насѣчки скоро зароспаютъ. Въ позднѣйшемъ періодѣ насѣчки ограничиваютъ нагноеніе и померпвѣніе.

Еще позже, онѣ доставляютъ выходъ гною и померпвѣлымъ частямъ и благопріятствуютъ плопонаращенію и заживанію.

Во избѣжаніе недоразумѣнія касательно споль важнаго предмета, прошу помнишь, что я одобряю насѣчки не во всякой рождѣ, но только во флегмонозной.

Рожа на лицѣ не сопровождается споль сильнымъ воспаленіемъ лежащихъ подѣ кожей частей, чтобы нужно было дѣлать насѣчки. Но въ полспой клѣпчатой плевѣ въкъ нерѣдко

развивается сильное воспаление, переходящее въ нагноение и померпвѣніе. Здѣсь настычки будутъ полезны.

На головѣ рожа занимаетъ или одну только кожу и чашпи, лежащая надъ сухожильнымъ распяженіемъ, или же она представляется въ видѣ флегмонозной рожи, причемъ воспаляющіяся и чашпи, лежащая подъ онымъ распяженіемъ. Первая лечится обыкновенными пропивувоспалительными средствами, а при послѣдней нужно заблаговременно сдѣлать настычки, дабы ограничить опасную болѣзнь. Тоже нужно дѣлать и въ позднѣйшемъ періодѣ, дабы ограничить нагноение и померпвѣніе или доспавить выходъ гною и померпвѣлымъ чашпамъ.

Сдѣлавъ настычки, нужно чашпь покрывать теплыми примочками, пока прекратится кровопеченіе, а потомъ прикладывавъ припарки изъ хлѣба. Если вскорѣ не воспольдуется испеченія изъ ранокъ, то подъ припарку положишь корпію, полсто намазанную unguento basilico либо другимъ раздражающимъ средствомъ. Если нагноение уже наступило, то гной свободно выходитъ чрезъ разрывъ. Иногда куски померпвѣлой кльпчашпой

плевры бывають пакъ велики, что для споспѣшествованія ихъ выходу нужно увеличить разрѣзы. Послѣ сего, и именно, когда кожа чрезъ помертвѣніе клѣпчатой плевры отспала на большемъ пространствѣ, прижатіе повязкою будетъ споспѣшествовать заживанію.

Notizen von Froriep. Bd XXIII. стр. 61.

## VII.

### С м ѣ с ъ .

#### 1. Tinctura jodinae въ болѣзняхъ соспавовъ.

Лондонскій Врачъ *Бухананъ* представилъ примѣчательныя, даже удивительныя наблюденія касательно хорошаго дѣйствія tincturae jodinae въ болѣзняхъ соспавовъ, изъ коихъ два приводятся здѣсь для примѣра.

1. Дѣвушка 19-ти лѣтъ перенѣла значительную боль въ соспавѣ лѣваго указательнаго перста, проспировавшуюся вверхъ на переднее плечо и внизъ до конца перста. Боль усиливалась при движеніи; цвѣтъ покрововъ былъ измѣненъ; явственно чувствуемо было скопленіе гноя; при движеніи соспавъ скрипѣлъ. Болѣзнь продолжалась около года. Вѣрно ежедневно втирали tinct. jodinae въ больной членъ и каждый вечеръ принимали въ небольшомъ количествѣ голубыя пилюли (suboxydi hydrarg.) съ ревенемъ. Лечение началось 1-го Марта; а 7-го боль прекратилась и опухоль

весьма уменьшилась. Гной изъ сумочной связки исчезъ. 10-го больная опущена по желанію ея къ своей должности. 31-го явилась она опять; членъ, которымъ начала она дѣйствовать, не давши ему времени укрѣпиться, былъ очень распухшій. Употреблено поже средство, и 12-го Апрѣля опущена она здороваю.

2. *Робертъ Оливеръ*, году и девяти мѣсяцовъ отъ рода, принесенъ былъ къ Г-ну *Буханану* 19-го Марта 1827 года въ слѣдующемъ состояніи: верхній составъ, праваго бедра распухшій; нога короче; персты обращены внутрь; бедро и голень больной ноги высохли; худый позывъ на ѣду; испражненіе нивомъ чернаго цвѣта; изнурительная лихорадка; русые волосы, бѣлая кожа, вены большія. Мальчикъ сей былъ близнецъ, впрочемъ довольно большой. Болѣзнь началась за шестъ мѣсяцовъ предъ тѣмъ; больного пользовали уже два отличные Врача и два Хирурга. Они прописывали пѣивки, припарки и разныя внутреннія лекарства, но безъ пользы.

На задней части состава скопленіе гноя образовало коническую опухоль, близкую къ произвольному вскрытію. Покровы на срединѣ опухоли бѣловапаго цвѣта, какъ обыкновенно

бываетъ на скопленіяхъ гноя, окружены небольшою красноюю, показывавшею воспаленіе. Всякое движеніе члена и даже легкое прикосновеніе къ опухоли причиняло сильную боль.

Ежедневно втирать въ болящія и опухшія чашки *tinct. jodinae*; каждый вечеръ давать *pulver. compos. gr. v.*

21-го Марта. Опухоль немного уменьшилась, покровы примѣнно сморщились. Продолжать втираніе и порошки; давать три раза въ день по ложкѣ *decoc. dulcam. compos.*

24-го. Опухоль меньше; покровы гораздо мягче и большія образуютъ морщины. Тоже леченіе.

1-го Апрѣля. Опухоль менѣе коническая; больной можетъ двигать членъ гораздо удобнѣе.

8-го. Распухлость чашей уменьшилась; покровы болѣе морщиноваты и мягче; позывъ на вду хорошій; общее здоровье поправляется; больной можетъ приподнять членъ безъ боли; персты постепенно приходятъ въ естественное положеніе. Покровы надъ составомъ естественнаго цвѣта, но весьма ополстѣвшіе.



11-го. Можно ощущать головку *trachanteris majoris*. Тѣже лекарства.

9-го Маія. Правая лядвея имѣетъ почти такой же видъ, какъ и лѣвая, только надъ соспавомъ примѣтна небольшая опухоль. Правая голень слабѣе и тонѣе лѣвой; видъ младенца хорошъ; окрѣпость покрововъ уменьшается. Тоже леченіе.

8-го Іюня. Дитя ходитъ по комнатамъ довольно хорошо. Опухоль исчезла; остается только небольшое возвышеніе ополстѣвшихъ покрововъ.

8-го Августа. Последнія двѣ недѣли пинктуру втирали только черезъ день. Мышцы бедра и голени гораздо крѣпче. Въ началѣ леченія покровы надъ соспавомъ и вокругъ онаго въ нѣкоторыя дни припухали болѣе, а теперь величина частей единообразная, исключая небольшое возвышеніе вокругъ соспава, но и сіе по немногу уменьшается.

Въ 1828 году дитя могло свободно бѣгать, только немного хромало, вѣроятно, говоритъ Г. *Бухананъ*, отъ того, что часть головки бедра разстроена нагноеніемъ во время прежняго леченія, которое конечно было со-

гласно съ общепринятыми правилами, по въ семь случаев, равно какъ и во многихъ другихъ, не могло остановить хода болѣзни.

Notizen von Froriep. Bd XXIII. стр. 169.

Помощію сего же средства Г. *Бухманъ* излечилъ у вѣрснаго переломъ обѣихъ костей голени, оспававшійся несросшимся 46 недѣль и для излеченія копорого въ леченіи шестни мѣсяцовъ щещно упопреленъ былъ *Гунте-ровъ* способъ, опчаспи въ соединеніи со спосо-бомъ *Алибера*. Голень была весьма распушная, ниже перелома двигалась въ спороны. 16-го Апрѣля начали впирапы *tinct. jodinae* пропиль перелома и вокругъ лодыжекъ, и уже 19-го боль и опухоль исчезли. Кромъ того больной принималъ при раза въ день по рюмкѣ *dioscor. dulcamarae compos.* Впираніе 'пинкпуры поупру продолжалось до Маія ежедневно, а попомъ черезъ день. Въ Августѣ больной оппущенъ здоровымъ; нога была крѣпче, нежели до перелома.

Тамъ же, стр. 265.

## 2. *Леченіе венерической.*

Г. *Дезрюель* (*Desruelles*), Врачъ отдѣленія венерическихъ въ госпиталь *Val de Grace*, въ Парижѣ, изъ 1,312-ми наблюдений вывелъ слѣдующія заключенія :

1. Первоначальные припадки венерической проходятъ гораздо скорѣе, нежели вторичные, хроническіе или произведенные ршупью, какое бы леченіе и содержаніе ни было припомъ употреблено.

2. Леченіе безъ ршупи гораздо выгоднѣе для больныхъ, нежели леченіе помощію сего средства, будетъ ли припомъ предписана діетъ живошная и возбуждающая, или распшпелъная и легкая.

3. Легкая распшпелъная діетъ, выгоднѣе для леченія, нежели живошная, какъ при употребленіи ршупи, такъ и безъ оной.

4. При живошной, возбуждающей діетѣ больные гораздо скорѣе выздоравливаютъ безъ употребленія ршупи, нежели употребляющую.

5. Равнымъ образомъ при легкой распшпелъной діетѣ больные скорѣе выздоравливаютъ безъ ршупи, нежели употребляющую.

6. Наконецъ больные, лечимые рпущью, при животной пищѣ и возбуждающемъ содержаніи вообще гораздо медленнѣе выздоравливаютъ, нежели въ упомянутомъ (5-мъ) случаѣ.

Изъ 1,312 больныхъ лечены:

461	рпущью.	386 съ первоначальными припадками.	189 при животной, возбуждающей діетѣ. Среднее число дней леченія $51\frac{11}{13}$ .
			197 при расшипельной легкой діетѣ. Среднее число дней леченія $42\frac{12}{17}$ .
851	безъ рпу- щи.	75 со вторичными припадками.	33 при животной, возбуждающей діетѣ. Среднее число дней леченія 82.
			42 при расшипельной діетѣ. Среднее число дней леченія $55\frac{1}{3}$ .
		698 съ первоначальными припадками.	62 при животной, возбуждающей діетѣ. Среднее число дней леченія $50\frac{3}{2}$ .
			636 при расшипельной діетѣ. Среднее число дней леченія $25\frac{2}{16}$ .
		153 со вторичными припадками.	Всѣ при легкой расшипельной діетѣ. Среднее число дней леченія $45\frac{9}{15}$ .

Съ того времени, какъ Г. Дезрюелль оспаривалъ рпущь, онъ не видѣлъ ни одного припадка, который бы не былъ излеченъ простымъ спо-

собомъ. Если испытаніе шло медленно, то сіе зависѣло отъ раздраженія какой либо внутренности, холода, несоблюденія діеты или другой какой нибудь причины, которую нужно было удалить.

La Clinique. T. III. N. 79.

### 3. *Лечение венерической безъ ртути, въ Стокгольмѣ.*

Больные содержащія въ комнапахъ шесть недѣль и въ теченіе сего времени даюшъ имъ только по 4 унціи жареной говядины, безъ жиру и подливки, и около 5-ти унцій хорошо-испеченнаго бѣлаго хлѣба въ супки. Въспомоществуя получаютъ они опваръ, приготовленный изъ двухъ унцій корня *smilacis chinae*, съ 4-мя фунтами воды, уваренной до 2½ фунтовъ, на день. Если въ продолженіе сего времени силы больного весьма ослабляютъ, что впрочемъ рѣдко случается, то количество говядины и хлѣба, смотря по обстоятельствамъ, увеличивается; а при сильной жаждѣ декокта даюшъ больше или разводятъ его водою. Въ случаѣ надобности употребляютъ и мѣстныя средства. Въ 3-4 недѣли обыкно-

венно всѣ припадки исчезаютъ, а спустя 6 недѣль, Профессоръ Осбекъ прекращаетъ все лечение на 3 недѣли, но испеченіи коихъ снова подвергаетъ больныхъ шаковому же лечению въ продолженіе 3-хъ недѣль. Многіе другіе Врачи нашли, что сіе дополнительное лечение излишно. Профессоръ Осбекъ только одинъ даетъ еще своимъ больнымъ во время леченія пилюли изъ *chaerophyllum sylvestre*. Ошваръ *smilacis chinae* имѣетъ по преимуществу, что больные не получаютъ къ нему ошваренія; впрочемъ его можно замѣнить и другимъ легкоплавательнымъ ошваромъ. Посему способъ леченія, называемый Шведскими Врачами *леченіе діетой*, есть не иное что, какъ леченіе венерической безъ ртутти, помощью одного содержанія (*regimen*) и въ сущности совершенно сходенъ съ тѣмъ, копорый Англійскіе и Французскіе Врачи называютъ измѣненнымъ прошивувоспалительнымъ способомъ (это есть *regime sec*, похваляемый нѣкоторыми Врачами въ болѣзняхъ кожи). Способъ сей въ Швеція, а особливо въ Спокгольмъ, оказался весьма успѣшнымъ, какъ можно судить изъ слѣдующихъ обстоятельствъ.

1. До 1812-го года въ Спокгольмъ и его округъ

было шесть заведений для венерических и во всѣхъ лечили въ то время всѣхъ больныхъ рпупью; 2. однако число больныхъ сего рода ежегодно увеличивалось и часто случавшіеся возвратаы болѣзни возбудили въ народѣ такое недовѣріе къ сямъ заведеніямъ, что больные скрывали свою болѣзнь, дабы не быть оппавленными въ оныя; 3. въ 1812-мъ году число венерическихъ въ Спокгольмскомъ округѣ увеличилось до того, что нужно было учредипь седьмое заведеніе, которое и теперь существуетъ подѣ названіемъ больницы для венерическихъ; 4. число больныхъ коспными паросами, болями и косподю, принятыхъ въ началѣ въ больницы и леченныхъ по болшей части рпупью, содержалось въ Спокгольмѣ какъ 54: 100, а въ округѣ какъ 38: 100; 5. съ 1820-го года упомянутыя шесть заведений уничтожены и осталась только *больница для венерическихъ* для города и его округа. Въ ней лечатъ какъ первоначальныя, такъ и вппоричныя припадкы болѣзни одною дешою, а рпупь употребляютъ только для леченія младенцовъ и беременныхъ, и окуриваніе киноварью до совершеннаго слюношеченія для пѣхъ, кои уже много принимали рпупы, но остались

невъмеченными. 6. Съ того времени, какъ введено леченіе содержаніемъ, число венерическихъ въ Спокгольмъ и его округъ весьма уменьшилось, народъ снова возымѣлъ довѣріе къ заведенію и между больными, принятыми въ больницу 1826-го года, число спрдавшихъ востпыми наростами, болями и костоѣдою содержалось изъ города какъ  $9\frac{1}{2}$ : 100, а изъ округа какъ  $10\frac{1}{2}$ : 100.

Notizen von Froriep. Bd XXIII. стр. 31.

#### 4. *Селипра противъ цынги.*

Въ Pharmacopoea Castrensis Ruthena, Auctore Jacobo Wylie, editio tertia 1818, говорится о пользѣ селипры противъ цынги (см. nitras potassae depuratus и succus oxycolli nitratus). Англійскій Хирургъ III. Кameronъ съ пользою употребилъ сіе средство противъ сказанной болѣзни на корабль Фергуссонъ, въ 1828 году перевозившемъ преступниковъ изъ Ирландіи въ Новый Южный Валлисъ. Болѣзь еще не достигла совершеннаго развитія, но была въ низшей степени, называемой цынгопнымъ расположеніемъ, съ



приливомъ крови ко внутренностямъ, особливо къ легкимъ. Г. *Камеронъ* растворялъ 8 унцій селистры въ такомъ количествѣ уксусу, чпобы раствора было 64 унцій и для вкуса прибавлялъ сахаръ и нѣсколько капель olei menthae piperitae. Иногда онъ бралъ равныя части уксусу и лимоннаго соку. Растворъ сей даваемъ былъ по унціи на пріемъ, онъ прехъ до осьми разъ въ день, смотря по степени припадковъ.

Copy of a letter from Charles Cameron to the Commissioners for victualing His Majesty's Navy и проч.

## VIII.

ОФИЦИАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1<sup>го</sup>  
МАРТА ПО 1<sup>го</sup> МАІЯ 1830<sup>го</sup> ГОДА.

### I. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ на высшія мѣста.*

*Дивизионнымъ Докторамъ* въ 12-ю пѣхотную Дивизию состоящій во 2-й арміи сверхъ комплекта Шпабъ-Лекаръ Надворный Совѣтникъ Кондрацкій. *Старшими Лекарями:* въ Сѣвскій пѣхотный полкъ опредѣленный во 2-ю армію сверхъ комплекта Шпабъ-Лекаръ Михайловскій, въ 31-й Егерскій полкъ Шпабъ-Лекаръ Харьковскаго Уланскаго полка Ринкъ, въ 13-й Егерскій полкъ Младшій Лекаръ онаго полка Докшоръ Медицины Беръ, во 2-й резервный Саперный баталіонъ Шпабъ-Лекаръ пѣхотнаго Принца Карла Прусскаго полка Пѣпниковъ, въ 21-й Егерскій полкъ опредѣленный во 2-ю армію сверхъ комплекта Шпабъ-Лекаръ Пропоповъ, въ пѣхотный Фельдмар-

шала Князъ Купцузова-Смоленскаго полкъ Штабъ-Лекаръ онаго полка Баневичъ и въ Одесскій пѣхотный полкъ Штабъ-Лекаръ 19-й Артиллерійской бригады Серединскій.

2. *Вновь поступившіе въ службу.*

*Изъ здѣшней ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико-Хирургической Академіи* Лекаръ 3-го отдѣленія Григорій Гаркушевскій въ Конно-Артиллерійскую N. 27-го роту. *Изъ ИМПЕРАТОРСКАГО Виленскаго Университета* Декари: Попейко въ 45-й Егерскій полкъ, Рогальскій въ Нарвскій пѣхотный, Висневскій въ Аспраханскій Кирасирскій, Шлегель въ Брестскій пѣхотный полки Младшими Лекарями, Ольховичъ въ 3-й баталіонъ 6-го Егерскаго полка, Жудра въ таковой же баталіонъ 1-го Егерскаго полка, Ягніонцковскій въ госпиталь Песковского Кирасирскаго полка Ординапоромъ. *Изъ Гражданскаго вѣдомства:* Лекаръ Феликсъ Саксъ въ Нарвскій Гусарскій полкъ Младшимъ Лекаремъ. *Изъ Вольнопрактикующихъ:* Лекаръ Густавъ Келлеръ въ Рижскій военный госпиталь Ординапоромъ, Докторъ-Медицины Викторъ Кожанскій Лейбъ-Гвардіи въ Подольскій Кирасирскій полкъ Младшимъ Лекаремъ и Лекаръ Яковъ

Горбаневъ въ Псковскій Кирасирскій полкъ младшимъ Лекаремъ. *Изъ отставныхъ*: Докторъ Медицины и Хирургіи Коллежскій Ассесоръ Сикспъ Левковичъ въ Гродненскій военный госпиталь Ординаторомъ и Шпабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Алексѣй Писаревъ въ Эспляндскій пѣхотный полкъ Старшимъ Лекаремъ.

### 3. Увольненіе отъ службы.

Старшій Медикъ 2-й Гусарской Дивизіи Шпабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Топачевъ съ мундиромъ; Старшій Лекарь Тифлискаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лекарь Воздвиженскій, Ординаторъ Краіовскаго военно-временнаго госпиталя Докторъ Шмиціанъ. *Пережльщенны въ Гражданское вѣдомство*: Ординаторъ С. Пешербургскаго военносухопутнаго госпиталя Лекарь Благовѣщенскій, Лекарь Нарвскаго Гусарскаго полка Саксъ и Ординаторъ Тираспольскаго военного госпиталя Шпабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Повозницкій.

### 4. Производство въ ученныя званія.

Въ Доктора Медицины Лекари: Линейнаго Оренбургскаго баталіона N. 10. Кольшко

и резервного батальона 37-го Егерскаго полка Добровольскій. *Въ Штабъ-Лекари* Лекари: Ординаторъ Кіевскаго военнаго госпиталѣ 12-го класса Спесани, состоящій въ Военномъ Управленіи при Нерчинскихъ рудникахъ Ильинскій, находившійся Лейбъ-Гвардіи въ Гренадерскомъ полку Батальоннымъ Лекаремъ Лейгони, Ординаторъ Георгіевскаго военнаго госпиталѣ Бажановъ, 10-й Артиллерійской бригады Подчаниновъ, командированные во 2-ю армію Ординаторы: Артиллерійскаго госпиталѣ Нашонъ и Выборгскаго военнаго госпиталѣ Косыльевъ, Младшій Лекарь 17-го Егерскаго полка Шаровъ, Старшій Лекарь Галицкаго пѣхотнаго полка Сокольскій, Ординаторъ Ораніенбаумскаго военнаго госпиталѣ командированный во 2-ю армію Шкопше, Ординаторъ Херсонскаго военнаго госпиталѣ Полешаевъ, Младшіе Лекари пѣхотныхъ полковъ: Камчатскаго Громыченковъ и Низовскаго Преображенскій. *Въ Лекари* Ординаторы Бобруйскаго военнаго госпиталѣ Кандидаты Медицины Орро и Поповъ. *Въ Ветеринарные Лекари* Ветеринарный Помощникъ Курляндскаго Уланскаго полка Кризбергъ.

5. *Награды.*

За оппично-усердную службу Всемилостивѣйше награждены чинами: *Надворнаго Совѣтника* Старшій Лекаръ Анхіольскаго военновременнаго госпитала Шпабъ-Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Миловановъ; *Коллежскаго Ассесора*: Старшій Лекаръ Базарджискаго военновременнаго госпитала Шпабъ-Лекаръ Шрейберъ и Старшій Лекаръ Несвижскаго Карabinернаго полка Шпабъ-Лекаръ Сухоцкій; *званіемъ Штабъ-Лекаря* Лекари: Охотскаго пѣхотнаго полка Левицкій, Смоленскаго Уланскаго полка Пучковскій, Старшій Лекаръ Азовскаго пѣхотнаго полка Савицкій и Ординапоръ Ревельскаго военнаго госпитала командированный во 2-ю армію Бейерсдорфъ. *Орденами*: Св. Владиміра 3-й степени Исправляющій должность Полеваго Генераль-Штабъ-Доктора 2-й арміи Спашскій Совѣтникъ Холодовичъ; *того же ордена* 4-й степени: Старшій Лекаръ 19-го Егерскаго полка Шпабъ-Лекаръ Гульковскій, Старшій Лекаръ Харьковскаго Уланскаго полка Шпабъ-Лекаръ Корнъ, Шпабъ-Лекаръ 37-го Егерскаго полка Саговскій, Дивизионный Докпоръ 18-й пѣхотной Дивизіи Шпабъ-Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Черкуновъ, Шпабъ-Лекаръ

Уфимскаго пѣхотнаго полка Коллежскій Ассесоръ Блюсь, Спаршій Лекарь 37-го Егерскаго полка Шпабъ - Лекарь Паньковский, Спаршій Лекарь Яскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Сильванскій, Спаршій Лекарь Бузеовскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Сорокинъ, Спаршій Лекарь Пипешинскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Киселевъ, Спаршій Докторъ Мангалскаго военновременнаго госпиталѣ Докторъ Медицины Чернобаевъ, Ординапоръ Бадчикскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Дубницкій, Ординапоръ Базарджинскаго военновременнаго госпиталѣ Докторъ Шпертъ, Спаршій Лекарь Камчикскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Злобинъ, Спаршій Лекарь Букарештскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Савиновъ, Спаршій Лекарь Рымникскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Тихомировъ, Каварнскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Вороничъ, Варнскаго военновременнаго госпиталѣ Докторъ Пеперсенъ и Шпабъ - Лекарь Савей - Могилевичъ. *Св. Анны*

2-й степени, **ИМПЕРАТОРСКОЮ** Коро-  
ной украшеннымъ: Спаршій Докпоръ Кара-  
лапскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ-  
Лекаръ Коллежскій Совѣтникъ Римаревскій и  
Спаршій Докпоръ Браиловскаго военновремен-  
наго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Коллежскій  
Совѣтникъ Басмановъ. *Св. Анны 2-й сте-  
пени:* Спаршій Докпоръ подвижнаго госпиталѣ  
главной кватирѣ Докпоръ Медицины Зейд-  
лицъ и Корпусный Шпабъ - Докпоръ Опдѣль-  
наго Сибирскаго Корпуса Шпабъ - Лекаръ На-  
дворный Совѣтникъ Маршевъ. *Того же ордена*  
*3-й степени:* Веперинарный Лекаръ Курлянд-  
скаго Уланскаго полка Яковлевъ, Младшій  
Лекаръ Муромскаго пѣхотнаго полка Сцепура,  
командированный во 2-ю армію Ординапоръ  
Выборгскаго военного госпиталѣ Шпабъ - Ле-  
каръ Коспылевъ, состоящіе въ оной арміи  
сверхъ комплекта Доктора Медицины Даль и  
Паукеръ, Ординапоры Букареспскаго военно-  
временнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Нико-  
ласъ и Красногвѣцовъ, Лекаръ: Буловскій,  
Каллюпинъ, Павлюцъ, Коллежскій Секретаръ  
Арцимовичъ, Кригеръ и Мадейскій, Ординапоръ  
Фокшанскаго военновременнаго госпиталѣ Ле-  
каръ Школинъ, Ординапоры Ясскаго военно-



временнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Гольдерекеръ и Шпабъ - Лекаръ Орловъ, Ординапоры Краіовскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Бочковскій и Мапѣвевъ, Ординапоръ Слободзейскаго военновременнаго госпиталѣ Лекаръ Дроздовъ, Ординапоры Браіловскаго военновременнаго госпиталѣ Лекаръ Ганцарштъ и Шпабъ - Лекаръ Мозовіусъ, Спаршій Лекаръ Плоештскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Сявцило, состоящій при Браіловскомъ военновременномъ госпиталѣ Лекаръ Кириловичъ, Ординапоръ Каралашскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Ксанфовъ, Ординапоры Бабадагскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Поповъ и Лекаръ Прозоровскій, Ординапоръ Долинскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Поваринскій, Ординапоры Черноводскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Спаверей и Салингеръ, Ординапоры Кюспенджійскаго военновременнаго госпиталѣ Лекаръ Лабупинъ и Шпабъ - Лекаръ Полчаниновъ, Ординапоры Бальчикскаго военновременнаго госпиталѣ Докторъ Медицины Барбатъ-де-Марни и Шпабъ - Лекаръ Дершевъ и Спаршій Лекаръ Терговишп-

скаго военновременнаго госпиталѣ Штабъ-  
 Лекаръ Гаспіанъ. *Денежнымъ награжденіемъ*:  
 единовременно годовымъ жалованьемъ: Старшій  
 Медикъ 4-й Уланской Дивизіи Коллежскій Со-  
 вѣтникъ Гофманъ, 13-го Егерскаго полка  
 Докторъ Медицины Беръ, Старшій Лекаръ  
 Галацкаго военновременнаго госпиталѣ Спан-  
 скій Совѣтникъ Оспрогорскій, Ординаторъ  
 Букарестскаго военновременнаго госпиталѣ  
 Штабъ - Лекаръ Коллежскій Совѣтникъ Плис-  
 ковскій, Старшій Лекаръ Сланинскаго военно-  
 временнаго госпиталѣ Штабъ - Лекаръ Надвор-  
 ный Совѣтникъ Терновскій, Старшій Лекаръ  
 С. Петербургскаго военносудопупнаго госпи-  
 талѣ Докторъ Медицины Коллежскій Совѣт-  
 никъ Брунъ, Старшій Ветеринарный Ле-  
 каръ Лейбъ - Гвардіи Гродненскаго Гусарскаго  
 полка Лебедевъ, Дивизионный Докторъ 2-й  
 пѣхотной Дивизіи Штабъ - Лекаръ Надвор-  
 ный Совѣтникъ Любарскій, Штабъ - Лекаръ  
 Самогилпскаго Гренадерскаго полка Коллеж-  
 скій Ассесоръ Навережскій, Старшій Ле-  
 каръ пѣхотнаго Принца Вильгельма Прус-  
 скаго полка Штабъ - Лекаръ Коллежскій Ассе-  
 соръ Губченко, Старшій Лекаръ Ревельскаго  
 пѣхотнаго полка Штабъ - Лекаръ Коллежскій

Ассесоръ Чулицкій, Штабъ - Лекаръ 3-го баталіона Рязскаго пѣхотнаго полка Коллежскій Ассесоръ Аугаръ, Спаршій Лекаръ 4-го Егерскаго полка Штабъ-Лекаръ Барановъ, Штабъ-Лекаръ Линейнаго Сибирскаго баталіона N 9-го Музалевскій, Штабъ - Лекаръ 3-го баталіона 29-го Егерскаго полка Синьковскій, Спаршій Лекаръ Тульскаго пѣхотнаго полка Медико - Хирургъ Вержицкій, состоящій во 2-й арміи сверхъ комплекта Штабъ - Лекаръ Спарцевъ, Ветеринарные Лекари: Армейскаго Конно - Пионернаго эскадрона Ашмаровъ, Образцоваго Кавалерійскаго полка Лебедевъ и Чугуевского Уланскаго полка 8-го класса Бочаревъ. *Подарками:* Спаршій Лекаръ 20-го Егерскаго полка Штабъ-Лекаръ Оспромысленскій, Младшій Лекаръ Троицкаго пѣхотнаго полка Лекаръ Рацевичъ, Лекаръ Нижегородскаго пѣхотнаго полка Мезеръ, Ординапоръ Тульчинскаго военнаго госпиталѣ Лекаръ Романовскій, Ординапоры Букареспскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Цвѣтковъ и Трухановъ, Ординапоръ Краіовскаго военновременнаго госпиталѣ Лекаръ Буковскій, Ординапоръ Браимовскаго военновременнаго госпиталѣ Лекаръ Добржанскій, Ординапоръ Бырлатскаго военновремен-

наго госпиталѣ Лекарь Куржинскій, Ордина-  
 торъ Мангальскаго военновременнаго госпи-  
 талѣ Лекарь Склябинъ, Ординаторъ Бальчик-  
 скаго военновременнаго госпиталѣ Лекарь  
 Парвицкій, Ординаторъ Слапинскаго военно-  
 временнаго госпиталѣ Лекарь Веллеръ, Спар-  
 шій Ветеринарный Лекарь Курляндскаго Улан-  
 скаго полка Яковлевъ, Шпабъ - Лекарь Линей-  
 наго Сибирскаго баталіона N 4-го Зибершпейнъ,  
 Шпабъ - Лекарь Эшапныхъ командъ Енисейской  
 губерніи Графъ, Шпабъ - Лекарь Скопинскаго  
 Военно - Конскаго завода Голубовскій, Шпабъ -  
 Лекарь Линейнаго Оренбургскаго баталіона  
 N 9-го Коропочинскій, Лекари: Конно-Аршил-  
 лерійской N 14-го роты Валицкій и 3-го  
 Егерскаго полка Салмановъ; а Корпусному  
 Шпабъ - Доктору 3-го пѣхотнаго Корпуса  
 Спанискому Совѣснику Лучинскому, Шпабъ -  
 Лекарю Линейнаго Сибирскаго баталіона N 10-го  
 Надворному Совѣснику Маршину и Лекарю  
 Линейнаго Сибирскаго баталіона N 1-го Садов-  
 скому. В ы с о ч а й ш е повелѣно объявивъ  
 благоволеніе. — За выслугу лѣтъ В с е м и л о -  
 с т и в ѣ й ш е пожалованъ пенсіонъ Корпусному  
 Шпабъ - Доктору 1-го пѣхотнаго Корпуса

Спашскому Совѣтнику Чорбѣ по 1,500 рублей въ годъ.

# 6. У м е р ш і е.

Ветеринарный Лекарь Гусарскаго Генераль - Фельдмаршала Графа Витгенштейна полка Бредгольдъ, Шпабъ - Лекарь 3-го баталіона Днѣпровскаго пѣхотнаго полка Ильяшевъ, Лекарь Невскаго пѣхотнаго полка Каплевскій, Шпабъ - Лекарь 18-го Егерскаго полка Хандо-боковъ, Ординапоръ - Базарджикскаго военно-временнаго госпиталю Лекарь Финшеръ, Лекарь 3-го баталіона Саратовскаго пѣхотнаго полка Смѣльскій, опредѣленный во 2-ю армію сверхъ комплекта Лекарь Парлу, Старшій Лекарь пѣхотнаго Генераль - Фельдмаршала Герцога Веллингтона полка Докпоръ Медицины Коллежскій Ассесоръ Пельхау, Ординапоры: Одесскаго военновременнаго госпиталю Лекарь Голубевъ, Варнскаго военновременнаго госпиталю Лекарь Тихомировъ и Базарджикскаго военновременнаго госпиталю Лекарь Шиповъ, Шпабъ - Лекарь резервнаго баталіона Казанскаго пѣхотнаго полка Бойчевскій, Ординапоръ Аршимерійскаго госпиталю Шпабъ - Лекарь Надворный Совѣтникъ Григорьевъ, Шпабъ - Лекарь Том-

скаго пѣхольнаго полка Талицкій, Младшій  
 Лекаръ Казанскаго пѣхольнаго полка Сондецкій,  
 Ординапоръ Варискаго военновременнаго госпи-  
 тала Лекаръ Валицкій, Младшій Лекаръ Казан-  
 скаго пѣхольнаго полка Докпоръ Медицины  
 Горячевъ, Ординапоръ Базарджикскаго военно-  
 временнаго госпиталя Лекаръ Кулишевъ и  
 Ординапоръ Бальчикскаго военновременнаго  
 госпиталя Лекаръ Агровъ.

### 7. Ш т р а ф ы.

Ординапоръ Гельсингфорскаго военнаго  
 госпиталя Шшабъ -- Лекаръ Прохоровъ за не-  
 презвое поведеніе опсцавленъ опъ службы  
 съ шѣмъ, чинобы и впредь никуда не опре-  
 дѣляпъ.

# СОДЕРЖАНІЕ.

---

Стран.

I. О СОХРАНЕНИИ здоГОВЬЯ Европейцовъ въ жаркихъ странахъ . . . . .	119.
II. О жизненныхъ припасахъ въ Меди- ко - Полицейскомъ отношеніи ( <i>Про- долженіе</i> ) . . . . .	144.
III. УГЛЕКИСЛОЕ КАЛИ И СОДА . . . . .	195.
IV. О ЧЕТЫРЕХЪ ПОДКОЛЪИНЫХЪ АНЕВРИЗ- МАХЪ, БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕВЯЗАННЫХЪ ПОМОЩІЮ ТУРНИКЕТА, ИЗОВРЪТЕННАГО ДОКТОРОМЪ ИЛЕЮ БУЯЛЬСКИМЪ . . . .	224.
V. МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА РАЗНЫХЪ СТРАНЪ, ГОРОДОВЪ И ПРОЧ. . . . .	231.
VI. ЛЕЧЕНІЕ РОЖИ . . . . .	239.
VII. Смѣсь.	
1. Tinctura jodinae въ бользняхъ составовъ . . . . .	246.
2. <i>Леченіе венерической</i> . . . . .	251.
3. <i>Леченіе венерической безъ ртути, въ Стокгольмѣ.</i> . . . .	253.
4. <i>Селитра противъ цынги</i> . . . . .	256.
VIII. ОФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО МАРТА ПО 1-е МАІЯ 1850-го года . . . . .	258.

---









Sm 4872

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ  
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

Часть XV. N. 3.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ,

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ ИВЕРСЕНА.

1850 ГОДА.

Изъ Библіотеки для чтенія А. Смирдина

№ 4872.

За годъ . . 10 рубл. сер.

За полгода 6 » »

За 3 мѣсяца 4 » »

За мѣсяць 2 » »

За чтеніе книгъ съ жур-  
налами 20 рубл. сер.

Новыя книги держать не  
болѣе двухъ недѣль.



*Slovanská knihovna*

**SLOVANSKÁ KNIHOVNA**

3108276777



ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

# ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ  
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

Часть XV. N. 3.

155364

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:  
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

Cato.

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ ИВЕРСЕНА.

1830 года.



# I.

## О жизненных припасахъ въ Мк- дикко-Полицейскомъ отношеніи.

(Окончаніе).

### О спиртныхъ напиткахъ и о по- судѣ, яственной и питейной.

Употребительнѣйшіе спиртные напитки  
суть: 1) виноградное вино, 2) хлѣбное вино,  
3) ячменное вино (\*) или пиво. Сюда же  
принадлежитъ опочасни питейный медъ.

#### *Виноградное вино.*

*Виды порчи и подмѣсей винограднаго вина.*

Сюда принадлежатъ:

- 1) Вино окисшее.
- 2) Хорошее вино, подмѣшанное худымъ.

---

(\*) Въ химическомъ смыслѣ виномъ называе-  
тся всякая жидкость, сдѣлавшаяся чрезъ броже-  
ніе спиртною; посему, кромѣ винограднаго вина,  
названіе сіе заслуживаютъ: пиво, сидръ, медъ  
и проч. См. „A Dictionary of Chemistry, on the  
basis of Mr. Nicholson's, by Andr. Ure. London.  
„1821. 8. Art. Wine.



3) Искусственное вино, продаваемое вмѣстѣ съ естественнаго винограднаго.

4) Вино чрезмерно остренное.

5) Примѣсь сюрмы къ вину.

6) Вино, подмѣшанное мышьякомъ,

7) — — сулемою,

8) — — мѣдью,

9) — — свинцомъ,

10) — — хлѣбнымъ виномъ,

11) — — водою,

12) — — квасцами,

13) — — чистую известью, или  
мыломъ,

14) — — попомъ,

15) — — красящими веществами.

*Причины порчи и подмѣсей винограднаго вина.* Если вино слабое, содержащее въ себѣ мало спиртныхъ частей, находится въ тепломъ и влажномъ мѣстѣ, если оно при перевозкѣ недостаточно защищено отъ вліянія атмосфернаго воздуха, если наконецъ приводится часто въ движеніе: то оно сего ускоряется и усиливается кислое броженіе, сообщающее вину терпкій, кислый и неприятный вкусъ; словомъ, вино поспѣшенно превращается въ уксусъ. Желая по возможности скрыть сего



мочу, винопродавцы стараются поправить вкусъ вина, заглушить кислоту и основываясь на дальнейший ходъ броженія прибавленіемъ къ вину сахара, меда, сока солодковаго корня, чистоты известии или мѣлу, поппаца, равно также свинцовыхъ составовъ. Для сей же цѣли и для окрашиванія легкихъ, малоспиртныхъ винъ смѣшиваются оныя съ крѣпкими, каковыя суть, между Французскими особливо винами, кагоръ, поммероль, русильонъ и проч. Касаательно искусственныхъ винныхъ смѣсей, дорогія и рѣдкія вина преимущественно служатъ поводомъ къ сему обману. Следственно сюда относятся изъ Французскихъ винъ: Шампанское — бѣлое и розовое, Бургонское — Кло-Вужо, Романе, Шамберпенъ, Фронпиньякъ, Палъ де Лангедокъ (Vin de paille), Ривезальпъ, Люпедъ; изъ Италіанскихъ: Лакрима-Хриспи, Калабрское вино и проч.; изъ Испанскихъ: Аликантъ, Малага, Гренамъ; изъ Греческихъ: Морейское Матвоази; изъ Венгерскихъ: Токайское; съ мыса Доброй Надежды: Капское вино или Капъ-Конспансъ. Составы, для приготовления сихъ смѣсей служащіе, и безчисленны и скрытны. Впрочемъ для приготовления

лѣнистаго (\*) Шампанскаго вина берется сахаръ, бѣлов невябродившее вино и нѣсколько виннаго камня; иногда же прибавляется бѣлый куриный поместъ, или голубиный калъ, сокъ изъ ягодъ смородины и проч. Розовое Шампанское есть вино, либо слабо только выбродившее, либо бѣлое вино, подмѣшанное такъ мазываемымъ *vin de Fimes* (\*\*), состоящимъ изъ сока бузиновыхъ ягодъ и виннаго камня. Винный спиртъ, особливо алкоголь, также изюмъ, входящъ въ составъ искусственныхъ Бургонскихъ винъ, къ которымъ прибавляются сверхъ того ароматныя вещества. Освѣиваніе винъ, или сожиганіе въ винныхъ бочкахъ предъ наполненіемъ ихъ виномъ холстины, напишанной сѣрою, иногда съ примѣсью мускатнаго орѣха, также насыщеніе сѣрыми парами винограднаго сусла, которое по-

---

(\*) Пѣнистымъ дѣлается вино, выливаемое во время самаго броженія его въ бочки, а потомъ и въ бушьяки, кошоры накрѣпко запираются, съ замазкою, дабы удержанъ въ нихъ углекислый газъ.

(\*\*) *Histoire naturelle de la vigne et du vin*, — par M. L. Demerson. Paris. 1826. 8. p. 88. et 152. — Сіе бузиновое вино готовится въ Фимѣ, небольшомъ городкѣ Шампаніи.

помъ приливается къ вину въ бочкахъ, — все сіе дѣлается для доставленія вину прочности и отвращенія заплесневѣлости. Вина обыкновенно подвергаются осыриванію пѣмъ большему, чѣмъ они менѣе прочны; естественно подмѣшанныя и искусственныя вина, какъ непрочныя, осыриваются (\*) гораздо болѣе, нежели чистыя, естественныя. При чрезмѣрномъ осыриваніи легко могутъ примѣшиваться къ вину, кромѣ значительнаго количества сѣры, ядовитыя металлы, содержащіяся нерѣдко въ сѣрѣ, п. е., сурьма и мышьякъ, особливо если для осыриванія винъ употребляется такъ называемый *emplastrum sulphuratum ad vinum*. Храненіе винъ, особливо кислыхъ, въ мѣдной и свинцовой посудѣ даетъ поводъ къ растворенію сихъ металловъ въ винѣ, такъ точно, какъ полосканіе винныхъ бутылокъ свинцовой дробью можетъ попомъ сообщать вину свинецъ, если п. е. дробь останеся въ бутылкѣ. Хлѣбное вино или спиртъ, такъ же ромъ, примѣшиваются нарочно къ вину легкому для большей крѣпости и прочности; чаще однако подвергаются

---

(\*) Т. е. насыщаются сѣрноватой кислотою.

умышленной сей примѣси вина, еспесивенно спиритныя. Такъ мадера, поривейнъ, буццеласъ, рѣдко, можетъ быть никогда не продаются совершенно чистые. Для умноженія количества вина прибавляется, безвредная впрочемъ примѣсь, — вода. Наконецъ для доставленія вину живѣйшаго цвѣта примѣшиваются квасцы; а чпобы оно имѣло, кромѣ красиваго цвѣта, приятный запахъ и вкусъ, прибавляются различныя вещества растительныя, какъ то: лакмусовая настойка, сокъ бузищныхъ ягодъ, лазоревое или кампешевое дерево, ягоды черники, малиновый сиропъ, мѣшечекъ съ виноградными листьями, повѣщенный по срединѣ бочки съ виномъ, настойка изъ листовъ или цвѣтовъ нѣкоторыхъ розъ (*rosa rubiginosa*, *rosa gallica*). Во Франціи, по увѣренію *Делерсона* (\*), прижививаются иногда къ винамъ оглушающія травы, именно же, *adoxa moschatellina*. Къ сладкимъ молодымъ винамъ, выдаваемымъ за старыя, прибавляютъ мушкатный цвѣтъ, гвоздику, кардамонъ, калганъ, цвѣты бузи-

---

(\*) L. C. p. 109 - 110.

ные, шафранные, шраву полезно шалея (\*) (*salvia nemorosa*, L.); послѣдняя шрава оособливо упошребляея для пригопвления фронтиньяка. Порцвейнъ, подмѣшнвающъ не только водкою или спиртомъ, но также дубовыми опилками, Волощскими орѣхами, красящими веществвами. Древнѣ Греки и Римляне для поправленія вкуса красныхъ винъ и для доспавленія онымъ бо́льшей крѣпости и прочности погружали въ винные сосуды соспавъ изъ смолы, воска, соли и ладону. Соспавъ сей иногда сожнгаемъ былъ такъ, какъ нынѣ сожнгаемъ сѣра въ бочкахъ. Дѣлашь сѣ, — мазывалось *picare vina*, а поправленныя такимъ образомъ вина именовались *vina picata*. Они прибавляли также къ вину маслику, мирру (*vina myrrhata*), полынь, душицу, нрдъ, пи-мианъ, розы, медъ, ячменную муку, плоды, личные желтки и бѣлки, морскую воду, ко-торою чрезмѣрно подмѣшнваемы были пре-мущественно Родосскія вина и бо́льшая часть Греческихъ (\*\*). По увѣренію *Плинія* (\*\*\*),

(\*) Der Getränke-Prüfer, v. C. A. F. Hoffmann, Quedlinburg u. Leipzig. 1826. 8. S. 67.

(\*\*) Q. Horatii Flacci Opera, — in usum Sereniss. Delphini. Edit. undecima Londini: p. 498. Satyr. L. II. Satyra 8. v. 15. — „Chium mavis experts.“

(\*\*\*) Hist. animal. vol. XIV. cap. 19.

многія подмѣсы винъ были довольно извѣстны древнимъ. *Марціалъ* (\*) посему говоритъ:

»Scelus est jugulare Sabernum

»Et dare Campano toxica saeva meros.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей вина.*

Частымъ и щепетильнымъ осматриваніемъ винныхъ погребовъ, съѣстныхъ харчевень и другихъ подобныхъ заведеній предотвращается продажа испорченныхъ и подмѣшанныхъ винъ; равно успроеніемъ въ винныхъ бочкахъ краювъ, не мѣдныхъ или желѣзныхъ, но деревянныхъ или стеклянныхъ, защищается вино отъ примѣси мѣди и желѣза. Сполъ же необходимо, чтобы вновь привезенныя вина поступали въ продажу не прежде, какъ послѣ надлежащаго оныхъ осмопра. Касапелъно остриванія винъ, *Франкъ* (\*\*) замѣчаетъ, что шѣ только вина можно нѣсколько болѣе остривать, которыя спавялися въ погреба на долгое время. *Вильдбергъ* (\*\*\*) совѣтуетъ остриваніе винъ замѣ-

---

(\*) Val. Martialis Epigram. Accur. Schrevelio. Lugd. Batav. 1656. L. 1. Ep. 19.

(\*\*) J. P. Frank's Syst. einer vollst. medic. Polizei. Dritte Aufl. Wien. 1787. 8. Dritter Band. S. 450. (§ 7).

(\*\*\*) System der medicin. Gesetzgebung—v. C. F. L. Wildberg. 2te Ausg. Berlin. 1820. 8. S. 125. (§ 241).

ннлѣ обжиганіемъ внутренней позерхности  
винныхъ бочекъ, какъ по *Бертолетъ* предло-  
жилъ для сбереженія воды (см. спашью о вода-  
ниопныхъ напитоккахъ).

Дабы вино еще молодое и попому вредное  
не было употребляемо, нужно наблюдать, дабы  
оное оспавляемо было по крайней мѣрѣ на  
нѣсколько мѣсяцовъ въ совершенномъ покоѣ (\*).  
Чрезъ сіе осаждается на стѣнкахъ сосуда  
виннаго пакъ называемый винный камень, —  
вещество шерпкаго, непріятнаго вкуса, а  
съ симъ вмѣстѣ увеличивается поспе-  
пенно количество алкоголя въ винѣ и  
такимъ образомъ вино улучшается. Чѣмъ  
долѣе оспавляется вино въ покоѣ, тѣмъ совер-  
шеннѣе спаволялся сіи перемѣны. Посему-то  
чѣмъ спарѣ вино, тѣмъ оно лучше, и на  
оборонѣ. Древніе съ особенною точностію  
опредѣляли время зрѣлости или доброты пи-  
тейнаго вина (\*\*). Они много заботились о

---

(\*) Frank. I. C.

(\*\*) *Плиній* (I. c.) говоритъ: „Falernum ab annis  
decem ut potui idoneum et a quindecim usque ad  
viginti annos: deinde grave est capiti et nervos offen-  
dit. Albani vero quum duae sint species, hoc dulce,  
illud acerbum, ambo a decimo quinto anno vigent.  
Surrentinum vigesimo quinto anno incipit esse utile.

надлежащемъ сбереженіи вина; для чего служили обыкновенно мраморные или порфировые сосуды (*amphorae et cadae*), покрываемые смолою, воскомъ и гипсомъ и хранимые въ прохладныхъ мѣстахъ. Крѣпкія вина, которыя желательнѣе было сберегать долгое время, помѣщались были на открытомъ воздухѣ и подвергались вліянію дождя, солнца, снѣгу и всѣхъ непогодъ; чрезъ сіе они сохранялись безвредно около ста лѣтъ. *Плиній* (\*) упоминаетъ о двуспольныхъ винахъ, получившихъ отъ старости густоту меда, такъ что нужно было разжижать оныя теплою водою. И дѣйствительно, для оживращенія порчи вина весьма важенъ способъ сбереженія его. Посему лучшіе винные погреба суть пещи, кои вырыты въ скалѣ, у подножій горы, въ направленіи отъ юга къ сѣверу; погреба, вырытые на почвѣ земли, богатой мѣломъ, весьма способны для сбереженія отъ порчи

---

quia est pingue et vix digeritar, ac veterascens solum fit potui idoneum. Tiburtinum leve est, facile vaporat, viget ab annis decem. Lubicanum pingue et inter albanum et salernum putatur usui ab annis decem idoneum. Gauranum rarum invenitur, at optimum est et robustum. Signinum ab annis sex potui utile."

(\*) L. C. cap. 4.



самыхъ лучшихъ винъ. Нужно припомъ, чѣмбы погребъ сей имѣлъ поспойную температуру 8-10° Р. и былъ ни сухой, ни влажный, ниже напишанный кислыми, вонючими испареніями. Чѣмъ большее количество вина помѣщается въ одномъ сосудѣ, тѣмъ вѣрнѣе оно сберегается. Посему въ славныхъ Гейдельбергскихъ бочкахъ вино сохранялось цѣлыя вѣки, съ постепенно большимъ улучшеніемъ доброты его. Для сбереженія вина въ бутылкахъ совѣщаютъ зарывать оныя въ песокъ, такъ, чѣмбы бутылки всегда лежали и припомъ противоположными рядами. Въ подземельѣ одного развалившагося замка найдены бутылки съ виномъ, зарытыя въ песокъ; по вычисленію оказалось, что оныя лежали около 200 лѣтъ, и вино имѣло отличныя качества (\*). Сіе случилось во Франціи.

*Распознаваніе порчи и подлѣсей вина винограднаго. Оно производится*

*Во-первыхъ, чрезъ показаніе недостатка естественныхъ качествъ, каковыя сунъ:*

1) Естественный цвѣтъ, запахъ и вкусъ. Сколь важны сіи физическія качества, яв-

---

(\*) Demerson. I. с. р. 95.

снзуелтъ уже изъ того, что многоразличныя подмѣсы винъ состоятъ именно въ болѣе или менѣ вредномъ, искусственномъ измѣненіи сихъ качествъ, отъ которыхъ заимствована и самая пословица: »habet colorem, odorem, saporem.« Тоже доказывающа изрѣченіемъ Салернитанской Школы:

Vina probantur odore, sapore, nitore, colore.

Si bona vina cupis, quinque ista probantur in illis:  
Fortia, formosa et fragrantia, frigida, frigida.

2) Отборныя вина отличаются особенною пріятностію запаха и вкуса, зависящею отъ нѣкотораго летучаго, неизвѣстнаго начала. Сей отличительный признакъ отборныхъ винъ Франузы называютъ bouquet (\*) и говорятъ, что онъ появляется въ винахъ обыкновенно уже послѣ броженія. Качества сего не возможно сообщить другому вину; ниже замѣнить посредствомъ искусства; оно улетаетъ безвозвратно при повышеніи окружающей температуры, при естественномъ измѣненіи и искусственномъ подмѣшиваніи вина. Кромѣ сего нѣкоторыя отборныя

---

(\*) Demerson l. c. p. 122.

вина отличающагося особыми свойствами, а именно:

Пьянящее Шампанское вино хопя выбивает пробку из бутылки, однакожь умеренно пьинпее; будучи налито въ рюмку, оно имѣетъ свѣтлый цвѣтъ и прозрачность и посповѣ шакъ около часа, переспаетъ пѣниться и образовать жемчуговидные пузырьки. Длинногордая бутылка, наполненная симъ виномъ и обращенная, открытымъ своимъ отверстиемъ въ спаканъ съ водою, удерживаетъ оное шакъ, что ниодна капля вина не попадаетъ въ воду (\*). Кусокъ полированного серебра, погруженный въ сіе вино, не переменяется въ цвѣтъ своемъ. Чрезъ выпариваніе сего вина получается весьма малый остатокъ.

Бургонское вино, будучи вылипто на плоскую тарелку, при поднесеніи огня нимало не горитъ.

Сладкія вина, кромѣ свойственнаго имъ запаха и вкуса (bouquet), нимало не выделяютса, шакже какъ и Шампанское, изъ длинногорлой бутылки въ спаканъ съ водою (см.

---

(\*) Frank l. c. 3. B. S. 497 (§ 19).

выше). После выпариванія сихъ винъ остается едва примѣтный осадокъ.

Рейнское вино при наливаніи въ рюмку производитъ слабый свистъ, образуетъ на поверхности своей легкую пѣну въ видѣ малыхъ шариковъ, скоро исчезающихъ (\*). Опытъ прибавленія извѣстковой воды цвѣтъ сего вина нисколько не измѣнился.

3) Алкоголь, какъ составная часть всѣхъ виноградныхъ винъ, полученный чрезъ перегонку, бываетъ въ различномъ, соразмѣрномъ впрочемъ количествѣ, которое въ слабыхъ винахъ равняется почти  $\frac{1}{6}$ , а въ крепкихъ почти  $\frac{1}{3}$  части вина по объему. По опытамъ *Бранда* (\*\*), количество алкоголя, содержащагося во 100 частяхъ вина, есть: въ Шампанскомъ 12, 61, въ Бургонскомъ 14, 57, въ Мадерѣ 22, 27, въ Лиссе 25, 41, въ Малагѣ 18, 94, въ Капъ-Компанскѣ 19, 75, въ Мокригъ-Христи 19, 70, въ Мюнель 15, 52, въ Фронпиньякѣ 12, 79, въ Токайскомъ 9, 88. По опытамъ *Алкона* (\*\*\*), количество алкоголя во 100

(\*) Hoffmann — 1. c. S. 83-84.

(\*\*) Ure — Dict. of Chemistry — Art. Wine.

(\*\*\*) Hoffmann — 1. c. S. 43-44.

часть вина есть: въ портвейнѣ 22, 96, въ хересѣ или шері 19, 17, въ кларетѣ 15, 10, въ Гохгеймскомъ 12, 08. Чтобы опредѣлить количество алкоголя въ винѣ, нужно прибавить, по совѣту Бранда (\*), къ 8-ми частямъ вина одну часть крѣпкаго раствора углекислаго свинца, процѣдить, взболтавъ предварительно, смѣсь сію и къ процѣженной жидкости (состоящей изъ алкоголя, водянистой части вина и нѣсколько уксусокислаго свинца) прибавить совершенно сухое углекислое кали; чрезъ сіе вода, поглощенная чистымъ кали, опустится ко дну сосуда, а алкоголь будетъ плавать въ верхней части сосуда; посему если сей опытъ дѣлается въ стеклянной трубкѣ, имѣющей около 2-хъ дюймовъ въ поперечникѣ и раздѣленной на 100 градусовъ, количество алкоголя въ испытываемомъ винѣ становится очевиднымъ.

*Во-вторыхъ, чрезъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ, куда принадлежатъ:*

1) Цвѣтъ, чрезмѣрно темный или необыкновенно свѣтлый, составъ мушный, вкусъ кислый, терпкій, водянистый, запахъ непріят-

---

(\*) L. C. S. 40.

ный, весьма спиртный. Посему молодое или окисшее вино открывалось съ перваго взгляду. Однакожъ смѣшеніе однихъ винъ, съ другими неудобно открывалось по запаху и вкусу; но если спарое вино подмѣшано молодымъ, или на оборотъ, то на днѣ бутылки, наполненной таковымъ виномъ, осѣдають нерѣдко блестящій сладкообразный осадокъ, или винный камень. Касательно красныхъ винъ, если осадокъ, произведенный въ винѣ синильнокислымъ кали, бывъ процѣженъ и высушенъ въ пѣни, имѣють цвѣтъ не красный чистый, но темный или черновато-красный, по сіе означаетъ, что хорошее вино подмѣшано испорченнымъ (\*).

2) Искусственное пѣнистое Шампанское вино чрезмѣрно пѣнилося, и будучи оставлено въ рюмкѣ, никогда не переспашъ испускать жемчуговидные пузырьки. Если длинногорлая бутылка, наполненная симъ виномъ и открытая, погрузится въ сосудъ съ водою, то вся примѣсь вина перейдетъ въ воду, а въ бутылкѣ останется чистое вино (\*\*). Чрезъ

---

(\*) Gottl. v. Ehrhart, Entwurf eines physikalisch-medizinischen Polizey-Gesetzbuches etc. Augsburg u. Leipzig. (S. a.) 3. B. S. 218.

(\*\*) Frank l. c.

выпариваніе сего вина въ фарфоровой чашкѣ получается обильный осадокъ, состоящій изъ сахара, сиропа и другихъ примѣсей. Серебряная ложка, погруженная въ сіе вино, желтѣетъ.

3) Искусственное Бургонское, вылитое на тарелку, при поднесеніи огня горитъ; при перегонкѣ сего вина отдѣляется весьма скоро значительное количество спирта.

4) Искусственные сладкія вина узнаются посредствомъ воды, какъ это сказано о Шампанскомъ. Вѣрный же способъ состоитъ въ томъ, чтобы при пузырьки сего вина, вылитыя въ чашку, выпарить поспешно на легкомъ огнѣ до густоты сиропа, послѣ чего осадокъ развести крѣпкимъ виннымъ спиртомъ и медленно охладить. Черезъ 24 часа окажется охрусталлованный осадокъ (винный камень), отъ котораго отдѣленная осторожно жидкая часть снова выпаривается до густоты сиропа; если осадокъ сей доведенъ будетъ до совершенной сухости, то представится полупрозрачный, сладко-сахарный и на раскаленныхъ угольяхъ старающійся запахомъ пережженного сахара. Венгерскія и Испанскія вина, поддѣланные сахаромъ, оставаясь

долго въ спокойномъ положеніи, опдѣляютъ  
онѣи опъ себя и скоро подвергаются порчѣ.  
*Видлебъ* (\*) предлагаеиъ для открывшя пе-  
режженного сахара въ винѣ слѣдующее: въ рюм-  
ку, наполненную виномъ, выпускается нѣсколько  
капель раствора сулемы въ перегнанной водѣ,  
опъ чего дѣлается перемѣна въ цвѣтѣ вина,  
которая вовсе не замѣчается въ винѣ, непод-  
мѣшанномъ пережженнымъ сахаромъ.

5) Искусственный рейнвейиъ, будучи на-  
лииъ въ рюмку, весьма медленно образуетъ  
легкую пѣну въ видѣ малыхъ шариковъ (см.  
выше). Если въ рюмку такого вина прилииъ  
извѣстковой воды, то вся жидкостъ получитъ  
темный цвѣтъ (\*\*).

6) Вино, чрезмѣрно оокренное (пресыщен-  
ное серноватую кислотою), узнается изъ  
того, что свѣжее куриное яйцо, оставленное  
въ семь винѣ на 24 часа, получаетъ черный  
цвѣтъ на скорлупѣ своей. Серебряная ложка,  
наполненная симъ виномъ и подогрѣваемая надъ  
огнемъ, получаетъ на внутренней своей по-

---

(\*) Hoffmann l. c. S. 66-67.

(\*\*) Betruglexicon, v. Franz Reinhard. Erfurt. 1801.  
Hoffmann l. c. S. 83-84.



верхности черный цвѣтъ. Растворъ въ перегнанной водѣ селищроксидаго серебра осаждается сіе вино бурнымъ, краснобурнымъ или черноватымъ цвѣтомъ; смоля по степени самаго осѣиванія.

7) Примѣсъ сурьмы узнается чрезъ прибавленіе къ вину сѣроводороднаго газа или воды, насыщенной симъ газомъ; опъ сего дѣлается осадокъ желто-золотистаго цвѣта; высушенный и съ равными частями кали и угля смѣшанный осадокъ сей, будучи накаливается въ узкой спекляной трубкѣ, превращается въ мешаллическую сурьму.

8) Примѣсъ мышьяка открывається чрезъ растворъ мѣди въ нашенърномъ спиртѣ, прибавляемый къ вину, освѣщенному въ случаѣ надобности (\*) помощію хлора; опъ сего происходитъ мало помалу зелено-желтоватый нечисный осадокъ, который, бывъ высушенъ и смѣшанъ съ цопашемъ и углями, нагрѣ-

---

(\*) Вина, имѣющія темный цвѣтъ, — красныя, надлежитъ предварительно освѣщать чрезъ прибавленіе къ онымъ хлора и отдѣленіе образующагося присемъ осадка помощію процѣживанія. Изъ сего однако исключается примѣсъ сурьмы къ вину: ибо растворъ сего мешала опъ прибавленія хлора превращается въ осадокъ.

ваеиъа слегка въ узкой стекляннй трубкѣ; опть сего мышьякъ возгоняеиъа и осѣдаеиъа на верхней части трубки, опдѣляя припомъ чесночный запахъ. При значительной примѣси мышьяка высушенный осадокъ, брошенный на раскаленные уголья, издаеиъа довольно примъшно чесночный запахъ.

9) Примъсь сулемы, по предварительномъ, если нужно, освѣпленіи вина, узнаеиъа чрезъ возбалипыванеіи вина съ эииромъ, попомъ чрезъ перелипиіи онаго въ стекляннуй воронку, коея опверсиіи закрыпио перспомъ; здѣсь замѣлны будупъ два слоя жидкоспи; нижній слой нужно слипъ прочъ (эпи вода), а верхній слой (эииръ, распворившій сулему) выливаетъа на плоскій сосудъ; симъ способомъ эииръ испарипъа, оставшаяся же въ пвердомъ видѣ сулема, если будепъ распворена въ перегнанной водѣ, узнаеиъа по слѣдующимъ явленіямъ: мѣдная полированная бляшка, погруженная въ распворъ сей, темнѣепъ, но чрезъ преніи кускомъ бумаги получаепъ сребриспый цвѣпъ, копорый чрезъ нагрѣванеіи исчезаепъ и бляшка получаепъ овой еспешспвенный цвѣпъ.

10) Примъсь мѣди, по освѣпленіи красного вина, узнаеиъа погруженіемъ въ оное

палочки фосфора, который въ такомъ случаѣ покроемся голубо-красною корою, блестящею подобно мѣди; или же погружася въ вино полированная желѣзная пластинка, которая здѣсь получитъ мѣдно-красный цвѣтъ, предполагая, что количество примѣси довольно значительно. Кровяный щелокъ производитъ въ семь винъ краснобурый осадокъ, который чрезъ накаливаніе съ угольнымъ порошкомъ превращается въ непластическую мѣдь.

11) Свинецъ въ освѣпленномъ винѣ открывася чрезъ Ганнеманову, нѣсколько исправленную винную пробу (*aqua hydrosulphurata acidula*, *P. h. C. R.*), или же чрезъ насыщеніе такого вина чистымъ сероводороднымъ газомъ; отъ сего происходитъ червякъ осадокъ, превращающійся чрезъ накаливаніе съ углемъ въ чистый свинецъ. По опытамъ Кастнера (\*), выполированная цинковая пластинка, погруженная въ вино, подмѣшанное свинцомъ и весьма разведенное перегнанною водою, получила черностврую, нѣсколько блестящую пленку. Чрезъ увеличительное стекло замѣчено, что сія тонкая поволока состояла

---

(\*) Ehrhart l. c. 3. B. S. 217.

изъ охрусталлованныхъ строметаллическихъ свинцовыхъ чашпицъ.

12) Хлебное вино узнается нерѣдко по одному уже спиртному запаху винограднаго вина, ощущаемому особливо при растираніи вина между ладонями. Вѣрнѣе открывается сія подмѣсь чрезъ перегонку, причѣмъ, если примѣсь недавно и въ большомъ количествѣ сдѣлана, опредѣляется спиртъ прежде, нежели вино начнетъ кипѣть, между тѣмъ какъ при перегонкѣ чистаго вина сперва опредѣляется нѣсколько воды, потомъ винный спиртъ, а наконецъ опять вода. Опредѣлительнѣе говоря, водка, примѣшанная къ вину, опредѣляется при  $200 - 208^{\circ}$  Фаренг., а алкоголь, свойственный вину, опредѣляется при  $220^{\circ}$  Фар. Если же подмѣсь давно уже сдѣлана и въ маломъ количествѣ, то для сего нужно опредѣлить, по способу *Бранда*, выше (стр. 286) предложенному, количество алкоголя во 100 чашахъ вина.

13) О примѣси воды къ вину можно иногда заключить по водянистому вкусу вина, тѣмъ конечно примѣшнѣйшему, чѣмъ больше примѣшано воды. По замѣчанію *Унцера* (\*), чистое

---

(\*) Wildberg I. c. S. 126. § 244.

вино не моришъ извесицъ, а вино, подмѣшанное водою, производить сіе. Если въ вино, подмѣшанное водою, погрузить проспиртованную палку, вымазанную деревяннымъ масломъ, то оно присѣкаетъ къ палкѣ, а чистое вино сего не дѣлаетъ (\*). Въ кипячей водѣ вино, подмѣшанное водою, разбрызгивается, преципитъ, а чистое сего не дѣлаетъ. Очевидно впрочемъ, признаки сіи не всегда вѣрны.

14) Квасцы опкрываются тѣмъ, что осѣпшенное вино выпаривается въ фаянсовой чашкѣ до тѣхъ поръ, пока останеся  $\frac{1}{2}$  только часть жидкости, которая потомъ чрезъ процѣживаніе отдѣляется отъ красноватаго осадка, образовавшагося во время выпариванія и представляетъ слѣдующія качества: съ амміакомъ или попомъ производитъ она бѣлый осадокъ, который (если употребленъ попомъ) поспчасъ растворяется. Отъ прибавленія къ сей жидкости селитроокислаго или солянокислаго барита дѣлается бѣлый осадокъ, нерасстворимый ни въ водѣ, ни въ селитреной кислотѣ.

15) Известъ или мѣлъ опкрываются слѣдующимъ образомъ: вино, выпаренное до

(\*) Hoffmann l. c. S. 50.

густоты сиропа, смѣшивается съ алкоголемъ въ 46°. Происшедшій отъ сего алкоголическій распворъ содержишь въ себѣ уксусокислую извесць (образовавшуюся изъ еспеспивенно находящейся въ винѣ уксусной кислоты и подмѣшанной извеспи). Распворъ сей отъ прибавленія щавелекислаго амміака производитъ бѣлый осадокъ, который чрезъ накаливаніе превращается въ живую извесць.

16) Попашъ открывається чрезъ выпариваніе вина до густоты сиропа, потомъ чрезъ болпаніе онаго нѣсколько минушь съ небольшимъ количествомъ алкоголя въ 35° и легкое подогрѣваніе. Чрезъ сіе алкоголь распворяетъ весь попашъ, соединенный съ уксусною кислотю вина. Прощенную жидкость надѣжишь раздѣлишь на двѣ части и одну ея часть смѣшаешь съ солянокислою плавиною, отъ чего происходитъ желточижевый осадокъ, доказывающій присутствіе попаша; другая часть выпаривается до сухости и остатокъ смѣшивается съ крѣпкою сѣрною кислотю, чрезъ что отдѣляются пары уксусной кислоты, отличающейся своимъ запахомъ. Поелику же уксусокислый попашъ во всякомъ винѣ находится, то все вышесказан-

ное замѣчается и въ чистомъ винѣ, но только въ весьма маломъ, едва примѣнномъ видѣ, чрезъ что и отличается чистое вино отъ вина, подмѣшаннаго нарочно попашемъ.

17) Красяція вещества узнаются иногда изъ того, что вино образуетъ значительный осадокъ въ бочкѣ, бупынкѣ и даже въ рюмкѣ, состоящий, особливо въ бочкѣ, изъ кусочковъ красящаго вещества. Черникою подмѣянное вино окрашивается губы голубоватымъ цвѣтомъ. Если вино такое налить въ малую аптекарскую спклянку и погрузить сію последнюю, закрывъ перстомъ отверстіе ея, въ спаканъ, наполненный водою, то по удаленіи перста отъ спклянки красящее вещество, примѣшанное къ вину, перейдетъ въ воду, потому что примѣсь сія обыкновенно пѣже-лѣе воды. Равнымъ образомъ если въ рюмку, наполненную симъ виномъ, прибавленъ будетъ распворъ квасцовъ въ перегнанной водѣ, то постороннія вещества, примѣшанныя къ вину, пошчасъ осядутъ на дно.

## Хлѣбное вино.

*Виды порчи и подлѣсей хлѣбнаго вина (\*).*

Они суть :

1) Примѣсь острыхъ, одуряющихъ веществъ, длиннаго перца (*piper longum*), Испанскаго перца (*capsicum annuum*), рыбодовныхъ ягодъ (*cocculus indicus*), дурмана (*datura stramonium*), плевела или головолома (*lolium temulentum*), куколя (*agrostemma githago*). Последнее вещество — куколь дѣлается, по увѣренію нѣкоторыхъ, вино пѣнымъ и пошому весьма уважается винокурами.

2) Примѣсь листовъ лавровой вишни (*folia-pruni laurocerasi*), также горькихъ миндалей.

3) Подмѣсь хлѣбнаго вина мѣдью или свинцомъ,

4) ————— сѣрною кислотою,

5) ————— водою,

6) ————— квасцами,

7) Примѣсь къ коньяку хлѣбнаго вина, или сѣрной кислоты.

---

(\*) Мы упоминаемъ здѣсь и о коньякѣ, ромѣ и аракѣ.



8) *Ромъ*, подмѣшанный дубовыми опилками, крѣпкою наспойкою изюмовыхъ зеренъ, пережженнымъ сахаромъ.

9) *Аракъ*, подмѣшанный Французскою водкою или коньякомъ, либо оспрыми распительными веществамн; сюда же принадлежить примѣсь многонога (holothuria).

*Причины порчи и подмѣсей хлѣбнаго вина.*  
Острыя, оглушающія вещества подмѣшиваются для крѣпости. Съ такимъ же намѣреніемъ перегоняють водку или хлѣбное вино чрезъ листья лавровой вишни, либо паспаиваютъ оное съ горькими миндалями. Мѣдь и свинецъ попадають большою частію случайно въ водку; именно, сему бывають причиною сосуды, въ коихъ выдѣлывается и хранится хлѣбное вино; особливо вишпообразныя мѣдныя трубы племовъ, употребляемые при тонкѣ хлѣбнаго вина, наиболѣе способствуютъ растворенію мѣди въ годкѣ. Для освѣпленія водки прибавляють къ ней квасцы, стрвную кислоту, даже свищовый сахаръ. Чіобы увеличить количество водки, прибавляють безвредную подмѣсь — воду. Съ паковымъ же намѣреніемъ ромъ и аракъ подмѣшцають Французскою водкою. Дабы молодой ромъ по

виду своему и вкусу подходить къ старому, примѣшивающъ дубовыя опилки, пережженный сахаръ и проч. Многоногъ прибавляется Китайцами къ араку для большей оспрошпы сего напитка.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей хлѣбнаго вина.* Подобно винограднымъ винамъ, хлѣбное вино защищается опъ порчи и подмѣсей чрезъ частый осмопръ винокурень, водочныхъ погребовъ, шинковъ, также чрезъ предварительное осматриваніе иноспранныхъ водокъ, назначенныхъ для продажи. Для опвращенія примѣси къ водкѣ мѣди и свинца употребляется обыкновенно луженіе перегонныхъ шлемовъ и прубъ; поелику же полуда сія легко сходитъ, поелику и самое олово, для сего употребляемое, не бываетъ чисто, — безъ примѣси свинца или висмуца: по *Плукетъ* предлагають для сего чисто-оловянныя прубы и шлемы (\*); однако совершенно чистое олово встрѣчается рѣдко. Посему болѣе полезны изобрѣпенныя въ Испаніи (\*\*) охладительныя

---

(\*) Warnung an das Publikum vor einem in manchem Braantweine enthaltenen Gifte. 1780.—Scherf's Archiv d. med. Poliz. I. B. S. 279.

(\*\*) Allgemeine Zeitung. 1802. No 152. S. 603.

трубы, составленные изъ различныхъ видовъ глины, двукратно пережженные и вымуравленные. Сюда же принадлежитъ приготовленіе сихъ орудій изъ дерева. Можно бы также употреблять спекляныя трубы, обложенныя желѣзомъ, если бы ломкость ихъ не составляла значительнаго препятствія. Нѣкоторыя совышуютъ при гонкѣ вина хлѣбнаго примѣшивая нѣсколько мѣлу, приведеннаго въ порошокъ, дабы чрезъ сіе поглощать уксусную кислоту, образующуюся при броженіи и такимъ образомъ предупреждать распвореніе мѣди въ водкѣ или хлѣбномъ винѣ (\*).

*Распознаваніе порчи и подлѣсей хлѣбнаго вина. Для сего пробуется*

*Во-первыхъ, показаніе недостатка естественныхъ качествъ. Такъ:*

1) Чистое хлѣбное вино бываетъ совершенно прозрачно и безцвѣтно, имѣетъ спиртной, но припомъ собственный запахъ и вкусъ, чѣмъ оно и отличается отъ другихъ спиртныхъ жидкостей; будучи налито въ рюмку, хлѣбное вино образуетъ много пузырьковъ, долго остающихся; при перегонкѣ отдѣляется

---

(\*) Ehrhart I. c. 3. B. S. 221.

легко и скоро значительное количество алкоголя; на плоскую тарелку налитое хлебное вино при поднесении огня горитъ голубымъ пламенемъ почти безъ остатка.

Хорошій коньякъ или Французская водка имѣетъ совершенную прозрачность, пріятный, нѣсколько винному подобный вкусъ и запахъ. Если ложка, наполненная коньякомъ, держится надъ горящею свѣчею, то по испареніи всей жидкости остается осадокъ, коего количество никогда не превышаетъ  $\frac{1}{3}$  части коньяка по вѣсу. Вкусъ сего осадка виннокисловатый, острый; запахомъ подобенъ вареному вину.

3) Хорошій ромъ имѣетъ желтоватый цвѣтъ, также собственный крѣпкій, спиртовый запахъ, обнаруживающійся особливо при растираніи между ладонями малаго количества рому. При перегонкѣ большая половина жидкости состоитъ изъ чистаго алкоголя.

4) Хорошій аракъ или ракъ просвѣчивается, имѣетъ желтоватый цвѣтъ, крѣпкій, спиртовый запахъ и вкусъ. Подобно рому, при перегонкѣ большую половину жидкости составляетъ алкоголь.

*Во-вторыхъ, показаніе присутствія постоянныхъ качествъ, а именно :*

1) Хлѣбное вино представляетъ жидкость мутную, подобную сыворопкѣ, вкуса кислаго, горькаго, пригорѣлаго, маслянаго. При сожиганіи оспаеется въ ложкѣ большая половина жидкости, — воды; при распираніи между ладонями небольшого количества вина сего оспаеется значительная часть жидкости, имѣющей неприятный запахъ. Для узнанія примѣси воды употребляется обыкновенно волчокъ. При перегонкѣ вина хлѣбнаго, подмѣшаннаго водою, получается малое количество алкоголя.

2) Хлѣбное вино, подмѣшанное оспрымъ распирительными веществами, производитъ иногда, подобно подмѣшанному уксусу (см. спашью о съезиныхъ приправахъ), жженіе, если, п. е., одна губа будетъ намазана чистую, а другая подозрительною водкою. Выпариваніемъ такого вина въ фаянсовой чашкѣ узнается также, какъ замѣчаетъ Орфила (\*), подмѣсь оспрыхъ веществъ, попому что

---

(\*) *Leçons de médecine légale — par M. Orfila. Tome second. Paris. 1821. p. 476.*

чистое хлѣбное вино по мѣрѣ выпариванія перьяетъ поспешенно спиртный запахъ и наконецъ совершенно лишается онаго; напротивъ того если водка подмѣшана оспрыми веществами, то чѣмъ долѣ продолжается выпариваніе, тѣмъ примѣшныя спановигтся запахъ остраго вещества.

3) Хлѣбное вино, перегнанное чрезъ листья лавровой вишни, имѣетъ нерѣдко запахъ горькихъ миндалей. Тоже разумѣется о водкѣ, настоенной съ горькими миндалями. Если къ таковой водкѣ прибавимъ попоашъ, сѣрно-кислое, желѣзо и сѣрную кислоту, то чрезъ нѣсколько часовъ явится въ осадкѣ Берлинская лазурь.

4) Примѣсь къ хлѣбному вину мѣди и свинца открывається также, какъ и въ виноградномъ винѣ (см. стр. 293).

5) Примѣсь къ хлѣбному вину сѣрной кислоты открывається прибавленіемъ къ вину сему водянаго раствора углекислаго барита, опъ чего происходитъ бѣлый осадокъ, не-растворяющійся ни въ водѣ, ни въ селитренной кислотѣ.

6) Квасцы, примѣшанные къ хлѣбному вину, открываются также, какъ и въ виноградномъ винѣ (спр. 295).

7) Если коньякъ, подмѣшанный хлѣбнымъ виномъ, въ жестиной ложкѣ выпаривается надъ горящею свѣчею до того, что паръ не загорается болѣе опъ горящаго лоскутка бумаги, то образуетъ обильный осадокъ, съ оспрымъ, пригорѣлымъ, водочнымъ вкусомъ и запахомъ.

8) Худой ромъ имѣетъ особенный вкусъ и юфшанный (\*) запахъ. Опъ прибавленія къ оному нѣсколькихъ капель водянаго раствора желѣзнаго купороса является черноватый или черноглубоватый цвѣтъ, доказывающій примѣсъ дубовыхъ опилокъ. Если ромъ имѣетъ сладкій, охлаждающій вкусъ, то сіе означаетъ примѣсъ пережженного сахара.

9) Аракъ, подмѣшанный Французскою водкою, представляетъ жидкость, большую частью мутную, желтую, лишенную собственнаго вкуса и запаха. Жгучій вкусъ арака доказываетъ примѣсъ острыхъ веществъ,

---

(\*) Нобмана I. с. 8. 103.

которыя узлаются также и чрезъ выпариваніе арака, какъ по сказано о хлѣбномъ винѣ.

### *П и в о.*

*Виды порчи и подмѣсей пива.* Сюда принадлежатъ :

- 1) Чрезмѣрно молодое или окисшее пиво.
- 2) Примѣсь оспрыхъ, одуряющихъ, распищельныхъ веществъ,
- 3) ——— извести,
- 4) ——— поташу,
- 5) ——— поваренной соли;
- 6) Примѣсь къ пиву опвара или студени изъ пелячьихъ ножекъ, яичнаго бѣлка, рыбьяго клею; примѣсь къ пивной водѣ коровьяго навозу.
- 7) Примѣсь мѣди или свинца.
- 8) Англійское пиво (ale, table или small beer и porter), подмѣшанное квасцами и сѣрною кислотою, равно приготовленное не съ хмѣлемъ, но съ горькими распищельными веществами и проч.

*Причины порчи и подмѣсей пива.* Поводомъ къ сему бываетъ частію худое качество пивныхъ матеріаловъ (воды, хлѣбныхъ зеренъ, хмѣлю, дрожжей), частію небрежное



вареніе пива, часпію же примѣси случайныя или умышленныя. Нечистая, гнилая, пвердая вода, пороспія, запрѣлыя, больныя, нечистыя хлѣбныя зерна, дикій, незрѣлый или перезрѣлый, гнилой хмѣль, смѣшанныя съ поддоннымъ осадкомъ худыя дрожжи, — сіи и подобные имъ маперіалы не обыцають хорошаго пива. Касапельно примѣсей къ пиву, случайныхъ и умышленныхъ, многоразличныя веществва, распищельныя, живошныя и ископаемыя, смѣшиваются съ пивомъ при самомъ его приготовленіи и храненіи, или же прибавляются для поправленія худосвареннаго, испорченнаго пива. Такъ если вблизи пивныхъ потребовъ находятся конюшни, свинныя епойла, коровники, по оныя испареніями своими препятствуютъ броженію пива и сообщаютъ ему худое качество. Такъ распищельныя веществва прибавляютъ къ пиву, часпію для бѣльшей крѣпости, часпію же для вкуса и цвѣта. Длинный перецъ, дурманъ, шабачныя лиспы, рыбное сѣмя, багунъ, белена, чемерица, маковыя головки, опій, заячій корень (*asafum europaeum*), мелкій калганъ (*marantha galanga*) доставляютъ пиву острое и оглушающее свойство. Корень аира (*rad. calami aro-*

matici), корень и выпяжка горечавки (rad. et extractum gentianae), райское съмя (atomum. grana paradisi), киснецъ или коляндрa (semina coriandri), права вахпы (herba mel-ganthis trifoliatae), пижмы (h. tanaceti vulgaris), чернобыльника (h. artemisiae judaicae), квассія (cort. ligni quassiae), ивовая кора, полынь, можжевельныя ягоды, сабуръ, сажа, бычачья желчь, — всѣ сии вещества сообщаютъ пиву сильную горечь и потому примѣшиваются, особливо къ Англійскому пиву, вмѣстѣ хмѣлю (\*). По замѣчанію Д. А. Юра (\*\*), всего чаще примѣшиваются къ Англійскому пиву квассія, полынь и горечавка. Сокъ солодового корня и пережженный сахаръ доставляютъ пиву темнѣйшій видъ и большую густоту, а потому примѣшиваются къ черному пиву и къ портеру. Для опивращенія окислоспи пива и для поправленія окисшаго уже пива примѣшивается известь, попаншъ, даже свинцовый сахаръ, либо погружаются въ пиво оловячныя тарелки. Примѣшиваніе

---

(\*) Такое (справяное) пиво содержится къ числѣ-му шакъ, какъ пиіейная вода къ минеральной.

(\*\*) L. C. Art. Beer.

поваренной соли извѣсть цѣлю усилиить жажду; прибавленіе клейкихъ веществъ употребляется для освѣпленія мушпаго пива, а посредствомъ коровьяго навоза спараются иногда смягчить швердую, неспособную для варенія пива воду. Доспопримѣчательный примѣръ опривленія пива при освѣпленіи онаго описанъ въ Зальцбургскихъ врачебныхъ газетахъ (\*). Мѣдъ и свинець супъ болѣе случайныя примѣси, зависящія опъ пригопшвленія и храненія пива въ нечиспой мешаллической посудѣ, или опъ освѣпленія пива помощью оловянныхъ парелокъ, погружаемыхъ въ копелъ съ пивомъ. По наблшденіямъ *Вилькинсона* (\*\*), портерьъ, доспавасмый изъ погреба чрезъ свипцовыя насосныя прубы, растворелтъ свинець и дѣлается вреднымъ. Наконецъ, посліку свѣже-пригопшвленное Англійское пиво дѣлается хорошимъ неиначе, какъ постоявъ спокойно 12 или даже 18 мѣсшцовъ, по пивовары спараются превращають молодой портерь въ старый прибавленіемъ къ онору сѣрной кислоты и квасцовъ. *Малькольмъ* (\*\*\*) упоминаелтъ о

---

(\*) Salz. Med. Chirurg. Zeitung. 1800. B. 2. S. 240.

(\*\*) London medical Repository. Vol. V. p. 1.

(\*\*\*) St. James Chronicle. 17 May. 1806.

подмѣси портера чрезвычайно вредной, — именно, о прибавленіи къ нему молодого рому; таковая подмѣсь названа kill devil.

*Предотвращеніе порчи и подмѣсей пива.*  
 Для сего требуется прежде всего надлежащее качество маперіаловъ, изъ коихъ варится пиво, равно вниманіе и бдительность при самомъ пригопвленіи онаго. Посему нужно наблюдать, чтобы вода для сего употреблялась чистая и болѣе мягкая, нежели твердая. При загопвленіи пива для погребовъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ, дабы употреблять оное льдомъ, лучшею признана твердая вода, потому что хотя она удерживаетъ нѣсколько броженіе, но за то менѣе способствуеетъ гнилости. Нужно также, чтобы солодъ получаемъ былъ изъ хлѣбныхъ зеренъ, совершенно зрѣлыхъ, здоровыхъ и ничѣмъ не подмѣшанныхъ, чтобы онъ былъ свѣжъ, высушенъ на солнцѣ или въ сушильнѣ и не имѣлъ захлаваго, кислаго, пригорѣлаго запаха; чтобы наконецъ хмѣль былъ доспапочно зрѣлый и чистый. При самомъ пригопвленіи пива весьма важны надлежащая степень теплоты и время варенія. Если вареніе пива производится при слабой теплотѣ, то оно легко окисаетъ;

долговаримое пиво дѣлается безвкуснымъ. Равнымъ образомъ безъ прибавленія надлежащаго количества хмѣлю пиво легко окисается. Для охлажденія пива нужно употреблять одни только деревянные сосуды (\*), прибавляя надлежащее количество хорошихъ дрожжей и прерывая процессъ броженія, какъ скоро спиртное броженіе уже кончилось, — но не погружая для сей цѣли оловянныхъ шарелокъ въ пиво, равно также не прибавляя никакихъ примѣсей. Очищеніе мутнаго пива чрезъ клейкія вещества хопя и безвредно, но оптимается опъ пива всю силу и питательность, а посему и не можетъ быть одобряемо. Наконецъ храненіемъ пива въ чистыхъ, прохладныхъ и сухихъ погребахъ, снабженныхъ опдушинами, удаленіемъ опъ сихъ погребовъ зелени, мяса и другихъ веществъ, наполненіемъ пивныхъ бочекъ пакъ, чтобы не оспавалось пусопы въ оныхъ, переливаніемъ пива въ бутылки не прежде окончанія броженія, равно осмопромъ пивныхъ лавокъ, можетъ быть

---

(\*) О варенія пива въ мѣдныхъ кошлахъ упомянуто будетъ въ слѣдующемъ о посудѣ.

совершенно опивращена продажа и употребленіе окисшаго, испорченнаго пива (\*).

*Распознаваніе порчи и подмѣсей пива.* Сіе достигается:

*Во - первыхъ , чрезъ показаніе недостатка естественныхъ качествъ , каковыя сущь:*

1) Пиво представляеть жидкость прозрачную, запаха и вкуса спиртованнаго, собственнаго; образуеть пенную, бѣлую, незначительную пену (признакъ углекислоты), остающуюся долго на поверхности пива, налитаго въ стаканъ или другой сосудъ, безъ осадка на днѣ стакана. Постоявъ нѣсколько времени, пиво не теряетъ сихъ качествъ, а чрезъ долгое пребываніе въ приличной посудѣ и въ хорошихъ погребахъ еще болѣе улучшается, дѣлается пеннѣе. Будучи принаю внутрь, не причиняеть, кромѣ болѣе или менѣе опьянѣлости, никакихъ припадковъ.

2) Англійское пиво, кромѣ сказанныхъ качествъ, имѣеть большую степень спиртоватости и горечи. Если пиво сіе подвержено

---

(\*) Über das Bier, in Beziehung auf den Brauer, den Trinker und die Polizey. v. C. J. Röhrich. Wien. 1817. S. 25 u. ff.

будеть перегонкѣ, то каждый видъ онаго во 100 часпяхъ своихъ будетъ заключать извѣстное количество алкоголя. Такъ, по опытамъ *Бранда* (\*), *Burton ale* имѣетъ во 100 своихъ чч. алкоголя 8, 88, *Edinburg ale* 6, 2, *Dorchester ale* 5, 56, *Brown Stout* 6, 8, *London-porter* 4, 2, *London small beer* 1, 28. Чтобы узнатье сіе, то, по совѣту *Алкома* (\*\*), алкоголь, полученный чрезъ перегонку извѣстнаго количества пива, вливается въ стеклянную пробку, имѣющую  $\frac{3}{4}$  дюйма въ поперечникѣ и раздѣленную на 50 или 100 градусоу; потомъ прибавляется чистое углекисловатое кали, которое поглощаетъ всю воду, содержащуюся въ алкогольѣ и оседаетъ на дно, а алкогольъ будетъ плавать свободно и количество его откроется съ перваго взгляду по градусной лѣсницѣ.

*Во - вторыхъ, чрезъ показаніе присутствія постороннихъ качествъ, каковыя суть:*

1) Пиво представляетъ жидкость мутную, слизистую, съ осадкомъ и помѣною желтою пѣною, или безъ пѣны, вкуса прищ-

---

(\*) *Ure l. c. Art. Beer.*

(\*\*) *Hoffmann l. c. S. 24. 34. 35.*

наго, сладковатаго, свойственнаго молодому пиву, или же кислаго, непріятнаго вкуса, свойственнаго перекисшему пиву.

2) О подмѣси пива оспрыми одуряющими растеніями можно подозрѣвать изъ того, что малое количество онаго причиняетъ головокруженіе, боль головы, опьяненіе, пошноту, рвоту. Пиво, подмѣшанное горькими растеніями, оплчается непріятнымъ, нечистопорькимъ вкусомъ, долго остающимся на языкѣ, темнымъ, необыкновеннымъ цвѣтомъ, окрашенною пѣною; сверхъ того пиво сіе скорѣе окисаетъ и поршипсѣ, нежели то, которое приготоовлено съ хмѣлемъ.

3) Примѣсъ извести и попаша узнается также, какъ сказано о виноградномъ винѣ (см. стр. 296).

4) Примѣсъ поваренной соли узнается чрезъ выпариваніе пива, опъ чего поваренная соль осѣдаетъ и оплчается охрупсѣлованнымъ своимъ видомъ, равно и пѣмъ, что на раскаленныхъ угольяхъ прещипетъ и разбрызгивается. Опъ прибавленія къ таковому пиву селитроокислаго серебра образуетъ въ осадкѣ роговое серебро, нерасшворяющееся ни въ водѣ,



ни въ селипреной кислотѣ и чернѣющее опъ дѣйствіа солнечнаго свѣта.

5) Примѣсь слизистыхъ клейкихъ живопныхъ веществъ сообщаетъ пиву клейкій, опврапипельный вкусъ. Пиво такое, въ тепломъ особливо мѣстѣ, скоро загнивается и получаетъ опврапипельный запахъ. Нерѣдко находятся въ пивѣ самые опаски сихъ примѣсей. Опваръ чернильныхъ орѣшковъ производить въ семъ пивѣ охлопковатый осадокъ. Пиво, сваренное съ водою, кошорая подмѣшана коровьимъ навозомъ, кромѣ наклонности къ гніенію, имѣетъ опврапипельный запахъ.

6) Примѣсь мѣди и свинца узнается также, какъ сказано о виноградномъ винѣ (спр. 293).

7) Англійское пиво, приготовленное съ горькими распипительными веществами, оппичается, какъ по сказано о пивѣ вообще, чрезмерно горькимъ, припомъ нечистымъ вкусомъ и наклонностию къ скорой порчѣ. Примѣсь квасцовъ и сѣрной кислоты опкрывается также, какъ въ хлѣбномъ и виноградномъ винахъ.

*Примѣч.* Пипейный медъ, частію спирпный напитокъ, разматривается также во всѣхъ опношеніяхъ, какъ и пиво.

## П о с у д а.

*Виды вредной посуды.* Виды посуды, могущей при извѣстныхъ обстоятельствахъ быть вредною, суть :

- 1) Мѣдная посуда ,
- 2) Оловянная посуда ,
- 3) Свинцовая посуда ,
- 4) Глиняная посуда.

*Причины вредности посуды.* Посуда, какъ извѣстно, можетъ вредить двоякимъ образомъ, — именно, когда посуда составлена изъ ядовитыхъ матеріаловъ, каковы суть: мѣдь и свинецъ, и когда внутренняя поверхность посуды покрывается непрочными, при этомъ вредоносными веществами, куда относятся лужение металлической и муравление глиняной посуды. Какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ яства и напитки, особливо кислые, соленые, жирные, находясь нѣкоторое время въ посудѣ, способствуютъ окисленію металлическихъ частей посуды, которыя, получивъ чрезъ сіе способность растворяться въ жидкостяхъ, сообщаютъ яствѣ или напитоку вредныя, ядовитыя качества. Если олово не содержитъ въ себѣ никакихъ постороннихъ примѣсей, то приготовленная изъ онаго посуда

можесть безвредно служить для питья воды, подаванія яспвъ, какъ по обыкновенно водился въ казенныхъ заведеніяхъ. Въ пропивномъ же случаѣ нечислая оловянная посуда дѣлается столь же вредною, какъ мѣдная и свинцовая, тѣмъ болѣе, что нечиспое олово именно содержитъ въ себѣ мѣдь, свинець, цинкъ, иногда даже мышьякъ. Клейменное олово содержитъ по въ 10-ни, по въ 9-ни, по даже въ 5-ни фунтахъ олова одинъ фунтъ свинца. Есть также олово безъ клейма, гдѣ примѣсь свинца зависить отъ произвола. Англійское брусковое олово содержитъ, по *Веструмбу* (\*), свинець, цинкъ и мѣдь. Лучшимъ почитается Индѣйское (Banka, Malacka) олово, потому что оно легче распускается, болѣе ковко и, подобно Саксонскому вымывальному олову (Seifen-zinn), не содержитъ, какъ увѣряютъ, мышьяка; однакожъ нѣкоторые сомнѣваются въ томъ, чтобы можно было гдѣ либо найти олово совершенно чистое (\*\*). Поелику же

---

(\*) См. его Handbuch der Apothekerkunst. 2-te Aufl. T. 3. S. 434.

(\*\*) Commentationes de rebus in scientia naturali et medica gestis. Vol. 21. partie 1. p. 163. Marggraf-Opera chymica. T. 1. p. 264. Toussaint Navier-Contre-poisons etc. T. 1. p. 314.

мышьякъ, находящійся въ чистомъ оловѣ, соспавляесть не болѣе, какъ 576-ю часть онаго и припомъ находится здѣсь не въ орудіумъ соспавліи, но въ мепаллическомъ видѣ (*status regulinus*) и слѣдственнo неспособенъ распворитьсѣ: по примѣсь сія, очевидно, неопасна (\*); но свинець, примѣшанный къ олову въ болѣшемъ или мѣньшемъ количествѣ, никогда не можетъ бытъ безопасною примѣсью, не смотря на то, что *Прустъ* и *Гумли* (\*\*) спарались доказать безвредностъ оловянной посуды, содержащей въ себѣ примѣсь свинца. Касательно мѣди извѣстно, что королекъ сего мепалла (*regulus cupri*), даже и въ видѣ тончайшаго порошка, неядовитъ. Молоко, чай, кофе, пиво и другія жидкости, говоришь *Орфила* (\*\*\*), находясь долго въ посудѣ изъ чистой мѣди, не дѣлаются ядовитыми; если же случилось присемъ несчастіе, то это всегда зависѣло отъ окиси, припомъ находившейся. Но если,

---

(\*) *Recherches chimiques sur l'étain, faites et publiées par ordre du Gouvernement, ou réponse à cette question: peut-on sans aucun danger employer les vaissaux d'étain dans l'usage oeconomique; par Mm. Baïen et Charlard. Paris. 1781. 8.*

(\*\*) *Schweigger's neues Journal für Chemie und Physik. B. 6. H. 2.*

(\*\*\*) *L. c. T. II. p. 108.*

говоришь сей же писатель (\*), въ посудѣ изъ  
 чистой мѣди варить воду съ прибавленіемъ  
 поваренной соли, но растворъ получаетъ изъ-  
 вѣснѣе количество мѣдной окиси, узнаваемой  
 извѣстными способами. Когда же къ сей самой  
 солевой водѣ прибавить мяса, жиру и другихъ  
 веществъ, способныхъ соединяться съ окисью  
 мѣди, здѣсь образовавшагося и соспавляющихъ  
 съ оною нераспворимый составъ, то послѣ  
 варенія водянистая жидкость не будетъ со-  
 держать нисколько мѣдной окиси. Касаательно  
 варенія пива въ мѣдныхъ концахъ Е. П.-во  
 Г. Л. М. С. *О. Гаевскій* (\*) замѣчаетъ слѣдую-  
 щее: »По особенному случаю, замѣченному  
 въ Кіевѣ, пребывавшій въ 1812 году мѣдникъ  
 »Медицинскаго Совѣта Министрства Поли-  
 »ціи, не вредно ли для здоровья пиво, ва-  
 »римое въ мѣдныхъ нелуженыхъ концахъ?  
 »Полицейское слѣдствіе показало, что мѣдные  
 »нелуженые концы употребляются на всѣхъ  
 »22-хъ пивоварняхъ, въ С. Петербургѣ суще-  
 »ствующихъ, изъ которыхъ на четырехъ

---

(\*) Л. С.

(\*\*) Полиц. и Судебн. Химія В. Г. Ремера  
 Ч. I. стр. 183-184.

«кроме медной употребляется и желѣзная посуда. Пробы пива, вареннаго въ медныхъ, недуженыхъ коплахъ, взятыя изъ всѣхъ пивоварень, въ столицѣ находящихся, подвержены были самому снроному химическому испытанію, въ слѣдствіе косяго не оказалось въ ономъ пивѣ нимало не только медныхъ окисей, но и никакихъ другихъ минеральныхъ частей. Посему Медицинскій Совѣтъ и заключася, что вареніе пива и впредь въ медныхъ недуженыхъ коплахъ позволять можно, съ тѣмъ однако, чгобы они всегда были столь возможно чисты, не имѣли на себѣ никакой зелени или металлической окиси и чгобы сваренное пиво нимало не оставалось въ медныхъ коплахъ.» Въ семь же сочиненіи сдѣлано Е. Н.-мъ слѣдующее замѣчаніе о споловыхъ судахъ (\*): «Само собою разумѣется, что не льзя одобрять употребленія обыкновенныхъ споловыхъ судовъ; обдѣланныхъ серебромъ или худо-вызолоченною медью. Держимыя въ оныхъ укусуе и масло при наливаніи могутъ растворить образующуюся на оправѣ ярь. Тоже должно сказать и о

(\*) В. Г. Ремера Полиц. и Судбн. Химія. Ч. I. стр. 265.

«горчичникахъ, оправленныхъ металломъ, особенно если заржавѣвшій металлъ вовсе не очищается».

*Предотвращеніе вредности посуды.* Луженіе мѣдной и муравленіе глиняной посуды принадлежатъ къ главнѣйшимъ средствамъ, употребляемымъ противу вредности посуды. Древніе Римляне обкладывали мѣдную свою посуду серебряными пластинками, или позолачивали оную. При открытіи оспашковъ Геркуланума около Неаполя въ 1772 году найдены мѣдные котлы, коихъ внутренность вмѣсто полуды устилаа была серебряными листами (\*). Въ Нимѣ найдена древняя Римская посуда, составленная изъ мѣди и вызолоченная внутри и снаружи (\*\*). *Плиній* (\*\*\*) упоминаетъ также о покрываніи мѣдной посуды оловомъ. Луженіе или наведеніе олова на внутреннюю поверхность мѣдной посуды, защищая яства и напитки отъ дѣйствія мѣди, можетъ, какъ выше сказано, примѣсами своими причинить значительный вредъ. Сверхъ

(\*) Frank l. c. 3. B. S. 559-560. (§ 2).

(\*\*) L. G.

(\*\*\*) Ero Histor. natur. Lib. XXXIV. cap. 17.

сего новѣйшіе опыты показали, что если въ мѣдной посудѣ гдѣ либо опсала полуха, то одно уже сбереженіе воды въ таковой посудѣ весьма вредно: ибо чрезъ гальваническое дѣйствіе мѣди и цинка (содержащагося въ оловѣ) вода разлагается и пѣнѣ самымъ удобнѣе дѣйствуетъ на мѣдь. По сей причинѣ сдѣлано много предложеній касательно безвреднаго луженія посуды. *Штраусъ* (\*) совѣтовалъ мѣдную посуду выстилать плащиною, копорал, если дороговизна сего металла не мѣшала, можетъ наилучше опвращать вредность мѣдной посуды. Предложеніе *Траппмана* (\*\*) покрывать мѣдную посуду соспавомъ изъ желѣза и сюрмы мало еще испытано, хотя и доспойно, кажется, вниманія. *Траппманъ* получилъ за сіе опъ Гарлемской Академіи сто червонцовъ. Совѣтъ замѣнять мѣдную посуду желѣзною, копорал конечно сообщаетъ нѣкоторымъ яспвамъ и напипкамъ темный цвѣтъ, доспойнѣ всякаго уваженія; сего однакожъ не лзя безусловно сказать о

---

(\*) Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneykunde. B. 10. S. 258.

(\*\*) Crell's Chemische Annalen. 1792. Wiltberg. l. c. S. 147. § 286.



железной посудѣ, выстилаемой въ нѣкоторыхъ странахъ листами олова, или же, по совѣту *Ла Фола* (\*), цинкомъ. Сей послѣдній родъ посуды не одобряется, пошому что цинкъ еще болѣе смѣшанъ бываетъ съ вредными металлами, нежели олово (\*\*). И такъ опыты дальнѣйшихъ испытаній зависить рѣшеніе вопроса: которому изъ всѣхъ сихъ предложеній надлежитъ отдать преимущество? — Съ тѣхъ поръ, какъ братья *Гравенгорсты* въ Брауншвейгѣ (\*\*\*) показали способъ покрывать мѣдную посуду чистымъ Англійскимъ оловомъ, за лучшее и дешевѣйшее средство противу вредности мѣдной посуды починаясь луженіе оной чистымъ оловомъ, которое для болѣе прочности самой посуды должно смѣшивать съ нашатыремъ, а не съ обыкновенною смолою: ибо послѣдняго рода посуда необходимо (пребуеетъ примѣси свинца. Присемъ наблюдать нужно, чпобы предъ каж-

---

(\*) Journal de Physique. 1778. Dec. 1779. Oct.

(\*\*) Gehler's neues allgemein. Journal der Chemie. B. 3. S. 154.

(\*\*\*) Ausführliche Anweisung zur Verzinnung der kupfernen, messingenen und eisernen Gefässe mit reinem englischen Zinne, von den Gebrüder Gravenhorst. Braunschweig. 1774. 8.

дымъ новымъ луженіемъ посуды совершенно снимаема была старая полуда, не чрезъ соскабливаніе и царапанье мѣди, которая опъ сего испоничевается, но чрезъ очищеніе такой посуды вишними дрожжами, съ прибавленіемъ небольшого количества крѣпкой водки и песку. Предъ употребленіемъ вновь вылуженной посуды нужно удостовѣриться, имѣетъ ли она всѣ признаки прочности и безвредности полуды, какъ по сказано будетъ ниже сего; при томъ не хранивъ долго въ луженой посудѣ ясивъ и напипковъ. Наконецъ, какъ опыты показывающъ, что самая лучшая полуда рѣдко держится въ цѣлости долѣе двухъ мѣсяцовъ, то благоразуміе пребуетъ возобновлять заблаговременно полуду посуды, пошому особливо, что полуда, кое-гдѣ только спадшая съ посуды, хотя и не такъ замѣтна, но не менѣе того всегда угрожающъ опасностію. Посему, какъ скоро полуда предспавляетъ малыя углубленія или малопримѣныя дырочки, нужно пошчасъ поновлять оную. Что самое производство луженія посуды, равно безвредность посуды, употребляемой особливо въ харчевняхъ и другихъ общественныхъ домахъ, прс-

буютъ особеннаго надзора, сіе изъ вышеказаннаго само собою явствуетъ.

Для муравленія или оспеклованія глиняной посуды обыкновенно берется составъ изъ мелкаго песку, свинцовой золы, древесной золы, поваренной соли; для желтой или красной муравы прибавляется еще сурьма. Вредность нѣкопородныхъ, особливо изъ сихъ веществъ очевидна; чѣмъ лучше однакожъ вымуравлена глиняная посуда, чѣмъ болѣе выжжена помурованная посуда, тѣмъ она безвреднѣе; если же иногда и растворится нѣсколько металлическаго сего стекла въ яствахъ или пияхъ, то количество сего раствора бываетъ столь мало, что дѣлается почти безвреднымъ. По крайней мѣрѣ *Веструлиъ* (\*) и *Шоницеръ* (\*\*) доказали, что *Эбель* (\*\*\*) приписалъ муравѣ глиняной посуды болѣе вреда, нежели сколько можно предполагать. Съ другой однакожъ стороны худая мурава столь же

---

(\*) *Ero Physik. chemische Abhandlung. B. 2. Heft 2. B. 4. H. 2.*

(\*\*) *Untersuchung der Schädlichkeit der Bleiglasur des irdenen Geschirres. Berlin. 1796. 8.*

(\*\*\*) *Die Bleiglasur des irdenen Küchengeschirres. Hannover. 1794. 8.*

опасна, какъ и небрежная полуда. По сей причинѣ нѣкоторые друзья человѣчества спарались поправить вмѣстѣ съ луженіемъ мѣдной и муравленіе глиняной посуды. Между всѣми по сему поводу предложеніями надлежитъ, кажется, отдать преимущество муравѣ, предложенной *Низеманномъ* (\*), *Фейлмеромъ* (\*\*) и *Шапталемъ* (\*\*\*). *Низеманнова* мурава состоитъ изъ селистры, поваренной соли и поташа. *Фейлмерова* мурава есть стекло, составленное изъ 4-хъ частей пережженной соды и 5-ти частей бѣлаго песку, чистаго, не содержащаго въ себѣ нимаго желѣза. Способъ *Шаптала* есть слѣдующій: глиняная посуда, невыжженная еще, но хорошо высушенная, погружается скоро въ воду, въ коей размѣшана глина и высушивается; потомъ погружается опять въ чистую воду, съ коею смѣшано мелко сполченное и просѣянное зеленое стекло, послѣ чего потчасъ кладется въ печь для надлежащаго расплавленія и обжиганія сего состава.

---

(\*) Hildt — Handlungszeitung. 1798. St. 1. S. 7-8.

(\*\*) Fr. Hermbstädt's Bulletin des Neuesten und Wissenwürdigsten aus der Naturwissenschaft. B. 2. H. 3. S. 239.

(\*\*\*) Ehrhart l. c. 3. B. S. 229.

Немуравленная, хорошо выжженная поваренная посуда из хорошей глины совершенно безвредна; но она непрочна, впитываетъ въ себя жиръ и даетъ поводъ иногда къ прогорклости яствъ.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ муравленіе и муравленная посуда пребудутъ столь же щипельнаго надзора, какъ и луженіе и полуженная посуда.

*Распознаваніе вредной посуды. Для сего требуется:*

*Во-первыхъ, показаніе недостатка хорошихъ качествъ, къ каковымъ относятся:*

1) Хорошо выжженная мѣдная посуда (безъ примѣси п. е. свинца) имѣетъ живой блескъ и бѣлосеребристый цвѣтъ. Если въ сей посудѣ сварено будетъ равное количество уксусу, и воды и потомъ въ жидкость сію погружится надпиленный желѣзный гвоздь, то онъ нисколько не покрывается красноватою корою; самая жидкость сія не имѣетъ мѣдиснаго вкуса, а полуда не теряетъ своего блеска и никакъ не отдѣляется отъ посуды. Персиль, которымъ попирается полуда, не получаетъ маркаго цвѣта. Черезъ царапаніе полуды можемъ она не отдѣляться отъ мѣди.

2) Посуда, составленная изъ чистаго олова, имѣетъ всѣ качества чистой полуды, выше означенныя. Уксусъ, сваренный въ сей посудѣ, не дѣлается сладковатымъ и опть прибавленія Ганнемановой пробы (*aqua hydrosulphurata acidula*, Ph. C. Ruth.) не получаетъ бураго или черноватаго осадка. Ложки и другіе подобные приборы, сдѣланные изъ чистаго олова, претцаютъ при сгибаніи оныхъ и не получаютъ царапинъ или впадинъ при давленіи ихъ перспомъ.

3) Хорошо вымуравленная глиняная посуда имѣетъ внутреннюю поверхность гладкую, равномерно покрывшую муравою. Посуда сія довольно крѣпка, равномерно выжжена и звонка. Переходъ опть значительнаго жара къ холоду нисколько не измѣняетъ оную. Уксусъ съ водою и поваренною солью, варимый въ сей посудѣ цѣлый часъ, не измѣняется нисколько въ своемъ вкусѣ и запахѣ, а опть прибавленія Ганнемановой пробы не помѣняетъ.

*Во-вторыхъ, показаніе присутствія худыхъ, вредныхъ качествъ, каковыя суть:*

1) Полуда съ примѣсью свинца имѣетъ голубоватый цвѣтъ и тусклый блескъ. Конечно перспа, которымъ претпса полуда,

окрашивается свинцовымъ или черноватымъ цвѣтомъ. Уксусъ, сваренный въ сей посудѣ, получаетъ сладковатый вкусъ, отъ прибавленія поваренной соли мутится, а отъ Ганемановой пробы получаетъ темный осадокъ. Сими же качествами отличается оловянная посуда, въ коей содержится примѣсь свинца. Сверхъ сего нечистая оловянная посуда покрывается иногда темными пятнами; густо-сваренное облупленное лицо, лежащее въ сей посудѣ, темнѣетъ.

2) Худо - вымуравленная посуда имѣетъ свойства, противоположныя хорошо вымуравленной посудѣ, какъ то упомянуто выше сего.



## II.

### Болезни членосоединений.

*Сочинение Профессора Оперативной Хирургии,  
Докт. Мед. и Хирург. Х. Саломона.*

---

Болезни членосоединений такъ часто встречаются въ практикѣ и такъ важны, что я починаю опиывать неизлишнимъ изложить ихъ въ семъ Журналѣ, пѣтъ болѣе, что Патологія и Терапія оныхъ въ новѣйшія времена почти опредѣлена. Кромѣ того предметъ сей принадлежитъ къ темнѣйшимъ и запущаннѣйшимъ въ Практической Медицинѣ; при описаніи сихъ болезней встречается множество названій для означенія одного и того же болезненнаго состоянія, и на оборотъ тоже названіе употребляется для различныхъ болезненныхъ состояній. Съ того времени, какъ начали дѣлать анатомико-патологическія изслѣдованія съ болѣею ревностію и точностію, и сія часть Хирургіи очищена отъ



многихъ произвольно принятыхъ мнѣній. Изъ числа новѣйшихъ писателей наипаче *Броди* опланился своимъ классическимъ сочиненіемъ о болѣзняхъ членосоединеній (\*); онъ оспавиль преждепринятые весьма сложныя наименованія и изложилъ сіи болѣзни такъ, какъ онѣ представлялись ему въ природѣ. Описывая ихъ въ патологическомъ и терапевтическомъ отношеніи, я хочу вмѣстѣ показать, какимъ образомъ новѣйшія усовершенствованія можно соединить съ понятіями прежнихъ или древнихъ временъ. Я оппюдь не намѣренъ выдумывать новыхъ названій, а только проспо изложу сей предметъ, сообразно нынѣшнему состоянію Хирургіи. Если мѣспами присоединю я замѣчанія касательно предубѣжденій и произвольныхъ мнѣній, то оныя не будутъ проспираться за границы благоприспособности.

Прежде всего нужно представить почное анатомическое описаніе членосоединенія: поелику это есть первый предметъ, пребующій вниманія и поясненій. — Каждое членосоеди-

---

(\*) Brodie Pathological and Surgical Observations on Diseases of the joints. London. 1818. Переведено на Французскій и Нѣмецкій языки.

неніе состоить изъ двухъ или большаго числа костей, поздревааго и сосудистаго существа. Составные концы костей окружаются хрящемъ или бѣлымъ, плотнымъ, упругимъ, волокнистаго строенія, нечувствительнымъ слоемъ разной толщины, едва имѣющимъ кровеносные сосуды. Сія часть состава покрывается и укрѣпляется, кромѣ клѣпчатой плевы, связками и сухими жилами. Внутренняя поверхность связокъ покрывается крѣпкою, прозрачною перепонкою, которая также покрываетъ и составные концы кости вмѣсто надкостной плевы. Опшуда перепонка сія проспирается на хряцевую ихъ поверхность, гдѣ она весьма тонко и удобно разрывается. Впрочемъ она имѣетъ весьма большое сходство съ сыворопочными оболочками, сосудиста и составляетъ глухой (безъ отверстій) мѣшокъ. Она получаетъ сосуды отъ членосоставныхъ связокъ, какъ это доказалъ *А. Куперъ*. Перепонка сія служитъ для отдѣленія членосоставной влаги (*sinovia*).

Что касается до членосоставныхъ желѣзъ (*glandulae sinovialis*), то ихъ теперь по справедливости не принимаютъ въ такомъ смыслѣ, какой объ нихъ имѣли прежніе Ана-

помы, т. е., что онѣ отдѣляютъ членосоставную влагу и вмѣстѣ съ членосоединительными связками служатъ къ составленію членосоединенія: послѣду сѣи жельзы находятся въ весьма маломъ количествѣ, обыкновенно по одиначкѣ, не имѣютъ никакого отверстія и очень рѣдко имѣютъ сообщенія съ составомъ; чаще онѣ находятся внѣ состава и окружаютъ сухія жилы, наприм.: на плечевомъ составѣ подъ *acromion*, на локтевомъ составѣ и проч. Только на коленѣ находится значительная *bursa sinovialis* (или *mucosa negl. sinovialis*), имѣющая сообщеніе съ коленнымъ составомъ подъ *musculus extensor cruris*, выше надколенной кости. Сѣи *bursae mucosae* иногда подвергаются болѣзненнымъ перемѣнамъ и представляютъ особливые болѣзненные явленія. Разныя части, составляющія составъ, находятся между собою въ весьма тѣсной связи; посему болѣзненное состояніе одной мало помалу сообщается всемъ другимъ.

Мы различаемъ *членосоставныя связки* и *членосоставныя перепонки* (*membranae sinoviales*), *членосоставныя хрящи* и *возрастающія концы костей*. Въ каждой изъ сихъ частей можетъ произойти воспаленіе *первоначально*, потомъ

распространиться на другія и произвести въ нихъ разныя органическія измѣненія, въ прежнихъ Хирургіяхъ описанныя подъ названіями: *fungus articuli*, *tumor albus*, *hydrops articuli*, *luxatio spontanea*, *arthrocace* и проч.

Членосоединенія, кромѣ многоразличныхъ механическихъ поврежденій, наприм.: ранъ, вывиховъ, ушибовъ и проч., о копорыхъ вѣздѣсь говорить не намѣренъ, подвержены, наравнѣ съ прочими частями нашего тѣла, *воспаленію и разнымъ его исходамъ*. Хотя воспаленіе членосоединеній въ сущности не различествуетъ отъ воспаленія другихъ частей, однако по особенному спроеію и оиправленію сопоставовъ явленія онаго измѣняются, а сообразно тому и самое леченіе должно быть измѣнено.

### *1. Воспаленіе членосоставной перепонки и связокъ, inflammatio membranae sinovialis et ligamentorum.*

Воспаленіе членосоединеній часто начинается въ членосоставной перепонкѣ, копорая изъ всѣхъ частей сопоставы имѣетъ болѣе сосудовъ и служить оидѣленію

членососпальной влаги; посему болѣе другихъ одарена жизненными качествами и легче другихъ можетъ подвергнуться болѣзненному сосполю. Впрочемъ воспаление сіе поражаетъ вмѣстѣ связки соспава и кляпчатую плевру, оной окружающую. Оно бываетъ или первоначальное, или же распространилось на членососпальную перепонку изъ другихъ частей соспава; въ рѣдкихъ случаяхъ воспаление соспава первоначально развивается на наружной поверхности связокъ. Оно бываетъ разной степени, *острое* или *хроническое*; гораздо чаще однако оно случается въ видѣ хроническаго или медленнаго, которое нѣсколько затрудняетъ движеніе члена, но не совсемъ оному препятствуетъ, и если, въ самомъ началѣ не уничтожено правильнымъ леченіемъ, то у нѣкоторыхъ людей продолжается цѣлые годы, по временамъ ожесточаясь и облегчаясь.

Въ началѣ больной жалуется на боль во всемъ соспавѣ, часто болѣе чувствительную въ одномъ какомъ либо мѣстѣ онаго. Въ продолженіе недѣли или двухъ боль увеличивается, пока достигнетъ высочайшей степени. Иногда по временамъ она значительно утихаетъ, а потомъ снова пакъ ожесточается, что не поз-

волесть нматѣйшаго движенія члена. Спусти  
супки или двос опъ начала боли, сосставъ  
начинаетъ пухнуть. Опухоль сначала бываетъ  
мятка, какъ бы зыбленіе оказывающая и за-  
виситъ опъ умноженнаго отдѣленія членосо-  
ставной влаги; но спустя нѣсколько времени,  
она дѣлается пѣсповашою, а зыбленіе въ ней  
спановится менѣе явспвенно опъ того, что  
членосоставная перепонка ополстѣла опъ  
выпонтѣвшей пластической лимфы, или опъ  
того, что таковая лимфа скопилась на наруж-  
ной либо на внутрсней поверхности члено-  
составной перепонки. Если болѣзнь суще-  
ствуетъ съ давняго времени, то жидкость  
въ составъ бываетъ вообще сдва примѣтна и  
движеніе члена болѣе затрудняется: поелику  
и мягкія часпи ополстѣли и какъ бы окрѣп-  
ли. Видъ опухоли зависитъ опъ степени  
распяхенія и ополстѣнія членосоставной  
перепонки и связокъ; поему опухоль явспвен-  
нѣ въ пѣхъ мѣспахъ, въ коихъ упомянутыя  
часпи лежатъ ближе подъ кожею, наприм.:  
на колѣнномъ составѣ, по обѣимъ споронамъ  
надколѣнной коспи, на локтѣ, выше олесггон,  
по обѣимъ споронамъ и кзади, на ручныхъ  
и ножныхъ составахъ, съ тылу, подъ сухими

жилами выправляющихъ мышцъ, на плечевомъ составѣ, между грудною большою и делтовидною мышцею.

Въ плечевомъ и бедренномъ составѣ болѣзнь сія рѣже случается, нежели въ другихъ, не споль глубоко лежащихъ членосоединеніяхъ. Въ бедренномъ составѣ имѣетъ она большое сходство съ вертлужною болью (*coxalgia*), опть копорой однако нужно ее различать. При воспаленіи членосоставной перепонки боль въ началѣ сильнѣе, нежели въ продолженіе болѣзни и никогда не бываетъ такъ сильна, грызуча какъ при вертлужной боли; она увеличивается при движеніи члена, но не опть давленія хрящевыхъ поверхностей одной на другую; хопя сѣдалищныя мышцы припомъ сохнутъ, однако сему всегда предшесшествуетъ опухоль ягодиць.

Иногда, хопя рѣдко, воспаление бываетъ оспраго или спеническаго свойства и попому скоро совершаетъ свое печеніе. Тогда опухоль появляется вмѣстѣ съ болью или вскорѣ по ея появленіи, кожа красная, боль сильная и всякое движеніе члена чрезвычайно затруднительно; почему больный спарается держать его безпрестанно въ одномъ, обыкновенно

въ полусогбенномъ положеніи. Къ сему присоединяется болѣе или менѣе сильная воспалительная горячка. Будучи оставлено безъ всякаго леченія, воспаленіе сіе въ нѣсколько дней переходитъ въ хроническое, а при надлежащемъ леченіи разрѣшается.

Надлежитъ однако замѣнить, что почныхъ границъ между острымъ и хроническимъ воспаленіемъ положить не лзя; названія сіи употребляются только для означенія главныхъ различій воспаленія, но между ними есть много постепенностей, копоры трудно причислить къ тому либо къ другому виду. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, предоставляется практическому таланту Врача опредѣлить многоразличныя измѣненія сихъ болѣзней и сообразно тому расположить леченіе.

Приличнымъ противувоспалительнымъ леченіемъ воспаленіе членососпавной перепонки, будетъ ли оно острое или хроническое, часто излечивается такъ счастливо, что видъ и опправленіе члена нисколько не измѣняются; при неблагоприятныхъ обстоятельствевахъ или неправильномъ леченіи оно переходитъ: 1. въ скопленіе членососпавной влаги въ полости со-



спава (hydrops articuli); 2. въ изліяніе спво-  
 роживающей пасоки въ полость соспава  
 либо въ шкань перепонки и въ околележа-  
 щую кльпчаную плеву, сгдывательно въ опол-  
 сптвіе сихъ частей; послдній исходъ часно  
 случается опъ подго, что воспалніе члено-  
 составной перепонки распрбспранилось на  
 связки и околележащую кльпчаную плеву,  
 но въ рдкихъ случаяхъ оно начинается, какъ  
 упомянуто, опъ наружной поверхности свя-  
 зокъ и прспирается на членосоставную  
 перепонку; 3. въ нагноеніе и изъязвленіе мяг-  
 кихъ частей; 4. въ распроеіе соспава чрезъ  
 нагноеніе хрящей и костофду, за коцорымъ  
 часно слдуетъ потеря члена, а иногда и са-  
 мой жизни.

*Причины.* Воспаленіе сіе можетъ случиться  
 во всякомъ возрастѣ; у дѣтей однако вообще  
 оно рдко встрчается, еще рже во время  
 возмужалости, а наичаще у взрослыхъ. Въ семъ  
 опношеніи оно пропивоположно другимъ вос-  
 палипельнымъ болзнямъ членосоединеній, и  
 обспольспство сія весьма важно для распо-  
 знанія.

Воспаленіе соспава бываетъ либо перво-  
 начальное или припадочное. Оно происходитъ

опъ наружныхъ насилій, простуды, общихъ болѣзней, наприм.: ревматизма, ломоты, золотухи, венерической, излишняго употребленія ртуты, кожныхъ сыпей, переносовъ, опъ прекращенія привычныхъ испражнений и проч. Опъ общихъ причинъ зависящее воспаленіе обыкновенно бываетъ хроническое.

Если болѣзнь произошла опъ наружныхъ причинъ, то предсказаніе благоприятнѣе, нежели когда она зависитъ опъ общаго состоянія организма. Въ началѣ можно разрѣшить воспаленіе, употребивъ надлежащія средства; но послѣ, когда уже воспослѣдовало скопленіе жидкости, разрѣщеніе происходитъ медленно, и долгое время, часто навсегда остается припухлость и слабость члена. При разспросѣнн мягкихъ частей, хрящей и концовъ костей неподвижность сустава (*anchylosis*) есть еще благополучное окончаніе; большею же частію къ спасенію больного не остается иного средства, кромѣ опнианія члена.

Леченіе располагается по причинамъ и по степени воспаленія. Если мѣстная болѣзнь зависитъ опъ спаданія всего организма, то надлежитъ, по правиламъ Терапіи, лечить общее состояніе организма.

При сильномъ воспаленіи назначается общее кровопусканіе, а особливо если больной крѣпкаго тѣлосложенія и одержимъ воспалительною горячкою. Мѣстное испражненіе крови посредствомъ пиявокъ или рожекъ всегда полезно, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ должно быть повсюрюемо. Въ началѣ надобно прикладывать холодныя примочки изъ свинцовой воды съ виннымъ спиртомъ, наипаче когда воспаленіе произошло отъ механическаго насилія. Воспаленіе, происшедшее отъ простуды или внутренняго, особливо ревматическаго недуга, пребудетъ теплыхъ примочекъ и смягчающихъ, болеутолятельныхъ припарокъ. Впрочемъ нерѣдко, касательно температуры примочекъ, нужно руководствоваться чувствованіемъ больного. Членъ при этомъ долженъ находиться въ совершенномъ покоѣ, что и при леченіи хроническаго воспаленія чрезвычайно важно.

Хроническое воспаленіе разрѣшается медленно. Здѣсь наипаче назначаются мѣстныя испражненія крови; по мнѣнію *Броди*, кровососныя банки здѣсь дѣйствуютъ лучше пиявицъ. Сіе испражненіе крови вообще нужно повсюрюать два и три раза, а смотря по об-

спояпельснвямъ, и болѣе, и въ слѣдъ за нимъ прикладывають теплыя либо холодныя примочки. По ослабленіи жеспокоенія воспаленія прикладывася близъ соснава шпанская мушка, которая въ упорнѣйшихъ случаяхъ повпоряется нѣсколько разъ въ различныхъ мѣстахъ, что гораздо полезнѣе, нежели подерживаніе одной мушки раздражающими мазями. При спраданіи глуболежащихъ соснавовъ мушки прикладываются какъ можно ближе къ онимъ; въ противномъ случаѣ ихъ лучше прикладывать въ нѣкоторомъ разстояніи, наприим: при воспаленіи въ бедренномъ соснавѣ надлежитъ прикладывать мушку въ паху или позади большаго вертела, а при воспаленіи ручнаго соснава къ плечу передняго плеча. Правило сіе нужно соблюдать для того, дабы раздраженіе, произведенное мушкою, не увеличило воспаленія неглуболежащаго соснава. Тоже правило должно соблюдать и при опкрытіи гноепочниковъ ѣдкими средснвами, прижиганіи моксою или раскаленнымъ желѣзомъ: послѣдныя и въ таковыхъ случаяхъ могутъ воспослѣдовать сильное и глубоко проникающее воспаленіе. При таковомъ леченіи боль обыкновенно скоро облегчается

и опухоль, поколику она зависить отъ болезненнаго отдѣленія членосоставной влаги, въ нѣсколько дней значительно уменьшается. Шпанскія мушки болѣе полезны для разрѣшенія опухоли, нежели какія либо другія средства, но ихъ надлежитъ употреблять не прежде надлежащаго испражненія крови.

Вшираніе рпушной мази и прикладываніе теплыхъ смягчающихъ примочекъ и припарокъ также весьма полезны для разрѣшенія оспятковъ воспаленія и для споспѣшествованія всасыванію скопившейся жидкости и пластической пасоки.

Если опухоль мягка и воспаленіе незначительно, то легкое сжатіе оной и обвиваніе члена чрезвычайно полезны.

Когда воспаленіе почти совсѣмъ уничтожено, то для оповращенія неподвижности члена нужно дѣлать онымъ умѣренное движеніе. Въ сіе время, а не прежде, полезны раздражающія и производящія красную кожу вширанія, наприм.: *linimenti ammon. cum tinctura lillae vesicator., spiritus saponis, spiritus camphorati, opodeldoc, balsami vitae externi, olei pineo laricini* и подобныя. Броди въ особенності одобряетъ слѣдующую мазь:

Rp. Olei oleae europeae ̄ss. acidi sulphurici ̄ss. m. f. linimentum. Мазь сія производитъ красноту кожи, кожа дѣлается бурою и сходитъ въ видѣ широкихъ и полстыхъ чешуй. Для людей, имѣющихъ мѣжную кожу, количество масла нужно брать бѣльшее; иначе мазь будетъ сильно раздражать. Сюда же принадлежатъ втираніе Авценриповой мази (tartar. stib. et potassae 3j-ss. axungiae porci 3j). Другія мѣстные средства, кажется, не приносятъ особенной пользы.

Пластыри ex gummi ammoniaco cum acet. scillae, cicutae, galbani, mercuriale и проч. во время воспаленія мало дѣйствительны; но послѣ можно употребить ихъ для защищенія состава отъ пропуды и возвраща болѣзни.

Гноепочки и заволоки, также прижиганіе моксою и раскаленнымъ желѣзомъ слѣдуетъ употреблять только въ нѣхъ случаяхъ, въ коихъ можно предполагать уже воспослѣдовавшее изъязвленіе хрящей и концовъ костей.

Оспающаяся неподвижность членосоединенія (anchylosis) разсмотрѣна будетъ ниже.

Образующійся нарывъ нужно приводить къ скорѣйшему созрѣнію теплыми, смягчаю-

щими наркотическими примочками и припарками, и когда появится явственно зѣбленіе, вскрыть его малымъ отперстіемъ, дабы воздухъ не могъ войти чрезъ оное въ полость соснава и возбудить рожистое воспаленіе членосоставной перепонки. По испражненіи гноя отперстіе закрывается липкимъ пластыремъ и корпією, сверхъ коихъ, смолѣя по обстоупельствамъ, прикладывается теплая припарка, либо легко сжимающая повязка, и больной долженъ находиться въ совершенномъ покое. Присемъ надлежитъ смолѣвъ на общее состояніе больного, которое обыкновенно бываетъ нехорошее, а часто и опасное. Для успокоенія раздраженнаго состоянія внутри сперва употребляются легкія охлаждающія средства, которыя однако скоро нужно замѣнять подкрѣпляющими, въ числѣ коихъ хина и опій доспойны занимать первое мѣсто, при легкой пипапельной діелѣ. Иногда по закрытіи перваго отперстія нужно повторить вскрытіе нарыва, дабы доставить выходъ скопившемуся гною. При опасности изнуренія больного назначается опіятіе члена.

Касапельно вскрытія сихъ нарывовъ весьма важно время, въ которое оно предприни-

мається. Въ особенності нужно осперегається вскрывають ихъ рано. Зыбленіе опухоли не должно почипати признакомъ нагноенія: поелику оное обыкновенно находится и во время воспаления сустава, а перѣдко бываетъ только кажущееся. Если по вскрытіи сустава и выйдеть изъ него жидкость, то это еще не служишь доказательствомъ, что споль смѣлое леченіе предпринято ксисти (см. водяныя членосоединеній). Даже когда дѣйствительно находится нагноеніе, то *А. Куперъ* и другіе знаменитые Хирурги совѣтують не спорошиться ихъ вскрывають, но обождають, пока нарывъ болѣе приближился къ поверхности. Чрезъ сіе уменьшається опасність подвергнути полость сустава по вскрытіи нарыва вліянню наружнаго воздуха: поелику *vis medicatrix naturae* и здѣсь оказываетъ благотворное свое дѣйствіе чрезъ отдѣленіе пластической лимфы, покрывающей внутреннюю поверхность членосуставной оболочки, при цѣлости хрящей и концовъ костей. Но и сіе правило имѣеть исключенія. Если общее состояніе больного въ слѣдствіе мѣстной болѣзни значительно повреждено, либо и самая жизнь подвергается опъ того опасності: то



никакой благоразумный Врачъ не спешитъ медлить подаіемъ хирургической помощи. Изъ сего правила равнымъ образомъ исключаются нарывы, образующіеся, въ рѣдкихъ впрочемъ случаяхъ, снаружи членосоставныхъ связокъ и несообщающіеся съ полостью сустава. Таковыя нарывы надлежитъ вскрывать заблаговременно.

2. *Водяная членосоединеній*, *hydrops articuli, hydrarthon*. Скопленіе сывороточной жидкости въ полости сустава есть слѣдствіе его воспаленія, иногда и вмѣстѣ съ онымъ продолжающагося. Посему сія болѣзнь много имѣетъ общаго съ воспаленіемъ сустава и потому мы рассмотримъ только то, что ей свойственно въ особенностяхъ, не описывая ее отдѣльно, какъ это находимъ въ прежнихъ Хирургіяхъ.

Воспаленіе членосоединенія всегда сопровождается выпотѣніемъ членосоставной влаги, которая, если скопится въ большомъ количествѣ и воспаленіе сдѣлается маловажнымъ либо и совсѣмъ прекратится, то составляетъ болѣзненное состояніе, называемое водяною суставомъ. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ сочинителей описываютъ сію болѣзнь вмѣстѣ

съ воспаленіемъ сосава. Сии замѣчанія почти-  
паю я нужными для того, дабы почтѣе по-  
казатъ читателю свойство болѣзни и проще  
представить измѣненія леченія оной, сходнаго  
съ леченіемъ хроническаго воспаленія.

Хроническое воспаление сосава, представ-  
ляющееся подъ видомъ водяной, наичаще слу-  
чается въ коленномъ сосавѣ, иногда въ со-  
савѣ плечевомъ, ручномъ и ножномъ.

Водяная сосава появляется въ видѣ опу-  
холи неболящей, или только и прижатіи  
нѣсколько чувствительной, оказывающей зыб-  
леніе и ограниченной сумочною связкою;  
покровы въ цвѣтѣ не измѣнены. Отъ опѣка  
она отличается тѣмъ, что отъ вдавленія  
перста въ ней не остается ямочки. Опухоль  
и зыбленіе бывають болѣе явственны въ тѣхъ  
мѣстахъ, въ коихъ сумочная связка лежитъ  
ближе къ поверхности, наприм.: на коленѣ  
съ боковъ надколенной кости и сверху, на  
плечѣ спереди между большою грудною и де-  
ловидною мышцами. На коленѣ опухоль  
иногда увеличивается до того, что прости-  
рается на бедро. Движеніе члена присесть  
вообще мало затрудняется; при согнутіи  
члена опухоль дѣлается больше, шире и крѣпче,

а по выправленіи мягче, и зыбленіе явственнѣе.

Сими признаками водяная состава опличается отъ гриба онаго (*fungus articuli*), мышечныхъ, лимфатическихъ и другихъ опухолей, случающихся въ суставахъ.

Причины суть пѣже, что и воспаленіе сустава: ибо сія болѣзнь есть слѣдствіе воспаления.

Предсказаніе благоприятно, пока болѣзнь незначительна, не застарѣла и больной впрочемъ здоровъ; но гдѣ она давно уже существуетъ, опухоль очень велика и больной въ худосочномъ состояніи, припомъ связки и членосоставная перепонка ополстѣли, тамъ мало надежды къ совершенному излеченію болѣзни.

Леченіе состоитъ въ преодоленіи хроническаго воспаления, если оное еще продолжается, помощію пиявокъ или кровососныхъ банокъ. Для способствованія всасыванію жидкости нужно прикладывать испанскія мушки, по способу, упомянутому при воспаленіи (*vesicatoria volantia*), переть теплою фланелью просую, либо окуренною уксусомъ, втирать ртутную либо депучую мазь, опо-

деслодокъ и подобную; припускать къ опухоли тары уксуса, уксуса съ нашатыремъ или жидкаго уксусокислаго амміака съ нашатыремъ, стягивать компрессами, намоченными растворомъ нашатыря въ извѣстковой водѣ. Прикладываніе компрессовъ, смоченныхъ стягивающимъ опиваромъ aqua vulneraria Thedeniana, растворомъ квасцовъ, и укрѣпленныхъ Теденовою повязкою составляетъ весьма дѣйствительное средство, равно какъ и обвиваніе опухоли пенькою (stupa lini), посыпанною порошкомъ сухой смолы и полипою виннымъ спиртомъ. Сюда же принадлежатъ стягиваніе полосками липкаго пластыря, прикладываемыми по слоямъ, сверху коихъ кладутся компрессы и обвивающія Теденовою повязкою. Полоски пластыря и повязка постепенно стягиваются сильнѣе. Таковое стягиваніе давленіемъ своимъ способствуетъ всасыванію скопившейся въ составъ жидкости.

Прободеніе водяной опухоли членосоединенія предпринимается только тогда, когда она очень велика и распуханіемъ частей причиняетъ боль и напряженіе. Оно производится малымъ ланцетомъ; опроверженіе надлежитъ дѣлать малое и поспѣшь по испражненію

жидкости закрыть. Кроме того проколы нужно дѣлать такъ, чтобы внутренній разрывъ сумочной овязки не соотвѣтствовалъ наружной ранѣ. Для сего предъ разрывомъ нужно покровы натянуть въ одну сторону. Операция сія не всегда безопасна, но послѣ оной иногда слѣдуетъ воспаленіе и нагноеніе, не только пребывающее опіятія члена, но опасное и для самой жизни. Посему прободенія не слѣдуетъ предпринимать, пока опухоль мала, недавняя и немного беспокоитъ больного, также когда она происходитъ отъ ревматизма или другой внутренней причины (Boyer) и у худосочныхъ. На послѣдокъ замѣтимъ, что операция сія есть только палліативное средство: ибо чрезъ нѣкоторое время жидкость снова накопится.

3. *Членосоставный грибокъ, fungus articulo-*  
*rum, tumor albus.* Сими именами прежде означали весьма различныя болѣзни членосоединеній. Какъ теперь сіи наименованія излишни и не имѣютъ болѣе никакой практической пользы, то я перейду объ нихъ молчаніемъ, а упомяну только о тѣхъ органическихъ измѣненіяхъ членосоединеній, которыя прежде

ими означались, такъ какъ дѣхъ въ новѣйшее время представилъ *Броди*.

Членососпавнымъ грибомъ называютъ хроническое воспаленіе соспава, продолженія котораго, связки и членососпавная перепонка ополстѣли и какъ бы окрѣпли опъ выполтѣвшей пластической лимфы. Сіе воспаленіе подвержено возврапамъ и тогда оно представляется въ видѣ оспраго воспаленія (*fungus articuli inflammatorius sive rheumaticus*); въ другихъ случаяхъ воспаленіе бываетъ пихос, единообразное (*f. artic. simplex*), которое опъ пренебреженія переходитъ въ нагноеніе и изъязвленіе мягкихъ частей, а потомъ и самыхъ хрящей и концовъ костей (*fungus suppurativus et exulceratus*); посему оканчивается разспроеніемъ соспава, опъ котораго больной худѣетъ, впадаетъ въ изнурипельную лихорадку и нерѣдко умираетъ, если членъ заблаговременно не будетъ опнятъ.

О всѣхъ сихъ измѣненіяхъ упомянуто уже при воспаленіи членосоединеній, куда они и опносятся.

Раздѣленіе гриба на мягкій и пвердый (*f. art. durus et mollis*) основывается только на одномъ припадкѣ воспаленія соспава.

Въ первомъ случаѣ опухоль сосиющъ въ ополстѣніи связокъ онъ выпоптѣвшей спвороживающей пасоки, а въ последнемъ болѣе онъ увеличеннаго опдѣленія и скопленія членососпавной влаги въ спраждающемъ соспавѣ.

Изъ сказаннаго явствуетъ, что касатель-но предсказанія и леченія членососпавнаго гриба надлежитъ разумѣть поже, что сказано при воспаленіи соспава.

4. *Воспаленіе и изъязвленіе хрящей и концовъ костей, inflammatio et exulceratio cartilaginum et extremitatum ossium.*

Разсмотрѣвъ воспаленіе членососпавной перепонки и связокъ, перейдемъ къ воспаленію и изъязвленію хрящей и концовъ костей, какъ первоначальной болѣзни, распротрапяющейя опшуда на другія частн соспава.

Нѣкоторыя почитаютъ невозможнымъ первоначальное спраданіе хрящей подвижныхъ соспавовъ, какъ чашей, непринимающихъ дѣятельнаго участія въ воспаленіи, нечувствительныхъ къ дѣйствию раздраженій и только онъ спраданія членососпавной перепонки и лежащихъ подъ ними костей распротрапяющихся и опдѣляющихся пластинками (*exfoliatio*). Броди однако показать чрезъ трѣтій-

тія анапоміко - патологіческія изслѣдованія ,  
 что хрящи иногда воспаляются и вмѣстѣ  
 съ тѣмъ размягчаются, превращаются въ во-  
 локнистое вещество и наконецъ всасываются,  
 причемъ представляются нѣкоторыя явленія  
 воспаленія, показывающія особенный видъ вос-  
 палительнаго состоянія сустава. Равнымъ  
 образомъ ноздреватое существо концовъ ко-  
 стей иногда составляетъ первоначальное  
 мѣстопребываніе болѣзни; въ немъ обнару-  
 жается воспалительный процессъ, сосуды  
 оного умножаются, наполняются кровію,  
 костное существо размягчается и рыхлѣетъ,  
 кляшечки наполняются красноватою пастою,  
 потомъ хрящи размягчаются, превращаются  
 въ волокнистое вещество и разрушаются чрезъ  
 нагноеніе, наконецъ распростирается членосо-  
 ставная перепонка и связки и полость сустава  
 наполняется худокачественнымъ гноемъ.

*Броди* (\*) различаетъ первоначальное  
 воспаленіе и изъязвленіе членосоставныхъ  
 хрящей отъ такою же спраданаія костей.  
 Надлежитъ однакожъ замѣнить, что призна-  
 ки обоихъ сихъ болѣзненныхъ состояній такъ

---

(\*) Прив. сочин. стр. 209 и слѣд.



сходны между собою, что даже внимательный и опытный наблюдатель едва ли различить их въ представившемся ему случаѣ; припомъ предсказаніе и леченіе обѣихъ болѣзней одинаково. Славный *Русъ* полагаетъ, что arthrosase первоначально всегда начинается въ ноздреватомъ существѣ концовъ костей и потомъ сообщается хрящамъ; *Броди* напротивъ того подтверждаетъ свое мнѣніе многими и точными анапомико-патологическими изслѣдованіями, въ слѣдствіе коихъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ процессъ воспаления и изъязвленія развивается преимущественно въ членососпавныхъ хрящахъ, а въ другихъ случаяхъ въ ноздреватомъ существѣ концовъ костей. При всемъ томъ мнѣ кажется, что сіи дальнѣйшія изслѣдованія хотя анапомически справедливы, однако въ практическомъ отношеніи по вышесказанной причинѣ маловажны, и попому я разсмаприваю воспаление и изъязвленіе хрящей и концовъ костей вмѣстѣ. Слѣдовательно все сказанное о воспаленіи и изъязвленіи хрящей надлежитъ разумѣть и о таковомъ же болѣзненномъ измѣненіи ноздреватаго существа концовъ костей.

Течение сего воспаления тихое и продолжительное, поему распознавание трудное, а между темъ весьма важно узнать болѣзнь заблаговременно, дабы опровергнуть значительное расстройство состава.

Воспаление и изъязвление хрящей случается во всякомъ возрастѣ, чаще однако у дѣтей и у взрослыхъ, недоросшихъ еще средняго возраста. По наблюденіямъ *Броди*, болѣзнь сія у взрослыхъ свинѣ 30-ти лѣтъ содержима какъ 1: 5. У молодыхъ людей хрящи мягче и имѣютъ болѣе сосудовъ, а изъ сего можно понять, почему они у нихъ чаще подвержены воспаленію. По той же причинѣ и течение болѣзни у нихъ быстрое. Какъ воспаление членосоставной перепонки чаще случается въ коленномъ составѣ, такъ бедренный составъ болѣе подверженъ изъязвленію хрящей. Иногда болѣзнь сія происходитъ отъ наружнаго наскія; чаще однако происхожденіе ея болѣе скрыто и зависить отъ внутреннихъ причинъ, а именно отъ худосочныхъ болѣзней; въ особенности ей подвержены золотушные дѣти.

Если воспаление членосоединенія начинается въ хрящахъ и концахъ костей, то

больной сперва чувствует только легкую и преходящую боль, усиливающуюся при движении члена, а облегчающуюся при спокойном положении онаго. Мало помалу боль становится постоянною и усиливается, особенно ночью, такъ что больной по причинѣ оной и по причинѣ внезапно появляющагося судорожнаго сокращенія члена не можетъ спокойно уснуть. Сперва боль ощущается только въ одномъ мѣстѣ глубоко, а послѣ того она распространяется на кости и часто болѣе чувствительна ниже сустава въ членѣ, впрочемъ здоровомъ, наприм.: при вертлужной боли (coxalgia) въ коленѣ, при воспаленіи въ плечевомъ суставѣ боль сильнѣе чувствуется въ суставѣ локтевомъ или ручномъ и проч. Кроме того сей видъ воспаленія сустава различается отъ другихъ болѣзней членосоединеній наипаче тѣмъ, что въ началѣ не примѣтно никакой опухоли, которая появляется не прежде 4-5 недѣль, либо и позже. Изъ сего однако не слѣдуетъ всякую боль въ суставѣ безъ опухоли принимать за изъязвленіе хрящей; она можетъ быть нервная, ревматическая, или зависѣть отъ легкаго воспаленія мягкихъ частей; объ изъязвленіи хрящей мы

можемъ заключить, только тогда, когда боль, постепенно увеличиваясь, сдѣлалась наконецъ сильною и постоянною, когда она опѣ движенія и даже опѣ одного давленія противоположныхъ соспавныхъ поверхностей увеличивается и напослѣдокъ когда спустя нѣсколько времени появляется опухоль. Сія опухоль отличается опѣ происходящей при воспаленіи членосспавной перепонки тѣмъ, что она не бываетъ значительна и представляется большою только опѣ истощенія мышцъ спраждающаго члена, что она имѣетъ видъ концовъ костей, составляющихъ членосоединеніе, крѣпче и не оказываетъ зыбленія при осязаніи, такъ что неопытный можетъ принять ее за расширение концовъ костей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ спраданию хрящей скоро присоединяется воспаленіе членосспавной перепонки и въ составъ скопляется жидкость, опѣ чего опухоль бываетъ мягкая. Въ послѣдствіи времени образуются нарывы, но вскрытіи своемъ сообщающіеся съ полостію состава, и на днѣ ихъ ощущается костью членосспавныхъ костей.

Это есть болѣзнь членосоединеній, которую описывали подъ названіемъ *fungus arti-*

culorum profundus sive scrophulosus, arthrocace Severini, и вообще смѣшивали съ членососпавнымъ грибомъ. *Русъ* первый хорошо и почно описалъ ее во всѣхъ соспавахъ (\*) и далъ ей названіе arthrocace, для отличенія ея отъ fungus articulorum, что дѣйствительно нужно было сдѣлать. Посему болѣзнь сія была извѣстна уже и прежде, только подъ другимъ названіемъ, и *Русъ* и *Броди*, сколько мнѣ извѣстно, первые обратили вниманіе на ея мѣстопребываніе, показали различіе ея отъ воспаления членососпавныхъ перепонокъ и связокъ; далѣе они первые сообщили намъ почное анапомиконашологическое описаніе оной и наконецъ предложили опредѣленный и надежный способъ леченія.

Всякому должно быть понятно, что воспаление членосоединенія, начинающееся въ хрящахъ и концахъ костей, въ началѣ прудитъ распознаенія, нежели когда оно сперва происходитъ въ частяхъ болѣе чувствительныхъ и лежащихъ ближе къ поверхности пѣла;

---

(\*) См. его классическое сочиненіе: Arthrocacologie, oder über die Verrenkungen durch innere Bedingungen. Mit 8 Kupfertafeln. Wien. 1817. 4.

даже, что цѣлостъ состава и самая жизнь больного болѣе подвергается опасности въ первомъ, нежели въ послѣднемъ случаѣ, и что наконецъ способъ леченія долженъ быть различный, какъ это увидимъ послѣ. Сихъ причинъ доспапочно для того, дабы съ точностию опредѣлить сіи болѣзненные состоянія, опредѣлить ихъ одно отъ другаго. Сіе необходимо наипаче въ сужденіи леченія. Легкія разрѣшающія средства при воспаленіи хрящей и концовъ костей можно употребить только въ самомъ началѣ и недолго, да и тогда они не приносятъ значительной пользы, а напротивъ того вредны нѣмъ, что чрезъ употребленіе ихъ теряется время, благоприятное къ совершенному излеченію. Для удаленія болѣзненного состоянія, такъ глубоко лежащаго, какъ воспаленіе хрящей и концовъ костей, потребны сильнѣйшія, глубже въ организацію проникающія средства. Я счелъ нужнымъ присоединить сіи замѣчанія для того, дабы нѣмъ болѣе обратитъ вниманіе читателя на сей предметъ и обратитъ его отъ принятаго, можетъ быть, имъ ложнаго мнѣнія касательно подробнаго и безполезнаго раздробленія

онаго. Я многократно удостовѣрился въ справедливости сего ученія на опытѣ и почтительно чрезвычайно важнымъ. Въ практикѣ конечно встрѣчающіяся случаи, въ коихъ воспаденіе мягкихъ чашей соспава соединено со вторичнымъ или послѣдственнымъ изъязвленіемъ хрящей и концовъ костей, въ коихъ посему сія степень болѣзни случается вмѣстѣ съ первоначальнымъ спраданіемъ хрящей и концовъ костей и послѣдственнымъ разспроеніемъ мягкихъ чашей; между тѣмъ вся важность состоятъ въ томъ, чтобы въ началѣ надлежаще опредѣлить болѣзнь и сообразно тому расположить способъ леченія. Когда болѣзнь пренебрежена или не уважена самимъ больнымъ или его ближними, то это достойно сожалѣнія; но ежели и сами Врачи погрѣшаютъ въ семъ отношеніи по недоспазку надлежащихъ свѣдѣній о семъ чрезвычайно занимательномъ и теперь такъ хорошо изложенномъ предметѣ, то сего извинить не льзя. Сіи обстоятельства, повторяю еще однажды, побудили меня помѣстить въ семъ Журналѣ нѣкоторые замѣчанія о болѣзняхъ членосоединеній. Всякъ видитъ, что я присею не стараюсь представить что либо оригинальное;

все мое намѣреніе состояло въ томъ, чтобы  
вѣрно сообщить чужія практическія наблю-  
денія, изслѣдованія и мнѣнія, принятыя  
ученымъ свѣтомъ; соединить по мѣрѣ силъ  
моихъ еще между собою несогласныя мнѣнія  
и такимъ образомъ представить предметъ  
сей въ такомъ видѣ, какой ему дали славные  
новѣйшіе наблюдатели.

---



---

### III.

#### НЕОБЫКНОВЕННОЕ БОЛѢЗНЕННОЕ СОСТОЯНІЕ.

---

Въ Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ ч. II. кн. I. напечатанъ рапортъ Г-ну Главному по арміи, Медицинскому Инспектору Шпабъ-Лекаря *Иванова*, заключающій въ себѣ описаніе болѣзненнаго состоянія такъ необыкновеннаго, что Редакція В. М. Ж. почитаетъ долгомъ сообщить оный рапортъ читателямъ сего Журнала.

»Во исполненіе предписанія Вашего Превосходительства отъ 20-го Февраля сего 1828 года за N. 63 имѣю честь донести, что 24-го числа того же мѣсяца въ 6 часовъ вечера прибылъ я на мѣсто, Олонскаго губерніи Лодьнопольскаго уѣзда въ погостъ Винницы, для освидѣтельствованія по Высочайшей Государя Императора волѣ больной женщины *Василисы Тихоновой*.

«На другой день, въ 10 часовъ утра, пришелъ я ее въ избѣ вѣнхой, на кровати, съ двухъ боковыхъ спороновъ обитой войлокомъ, задней и верхней досчатой, а передняя закрывалась нѣсколькими пологняными и одною войлочною занавѣскою, которая была поднята, а прочія опущены. Не сказавъ сначала о цѣли моего посѣщенія, подъ именемъ проѣзжающаго, слышавшаго о сѣ необыкновенномъ состояніи, просилъ я ее показати мнѣ себя. Она тотчасъ, раздвинувъ рукою занавѣсь, подзвала довольно внятнымъ голосомъ дряхлую спарушку, чтобы открытъ ее. Спарушка сія, родная ея мать, исполнила эпо; и я увидѣлъ голову, правою спороною лежащую на подушкахъ, съ лицомъ блѣднымъ, нѣсколько припухлымъ, и ногу съ подошвою къ лѣвой спороны головы съ открытою до половины тонкою голенью кверху, руку правую подъ правою спороною головы ладонью обращенную къ щекѣ; лѣвою поддерживала она занавѣсь; прочія части были закрыты пологнымъ замараннымъ пологномъ.

«Охотно начала она со мною говорить голосомъ тонкимъ, но выразительнымъ, предложивъ посмотришь и оцупашъ, гдѣ у ней

когда и другая нога. На вопрос мой, давно ли она въ такомъ положеніи и о чемъ это случилось, рассказала она мнѣ слѣдующее: До 13-ти лѣтъ ея возраста бывъ совершенно здоровою, выдана она была на семь году, въ Февралѣ мѣсяцѣ, за мужъ, и изъ церкви послѣ венчанія поѣхала съ мужемъ своимъ верстѣ за 40. На дорогѣ въ госпяхъ почувствовала дурношу, жаръ и боль подъ ложечкою. Чрезъ три дня возвратившись домой, слегла въ постель; чрезъ нѣсколько дней присоединились къ прежнимъ болямъ грызущія боли въ животѣ, который опухалъ клубками. Безъ пользы употребляя разныя суевѣрныя средства, напоследокъ оправила ее верстѣ за 80 къ деревенскому лекарю или знахарю, гдѣ обливали ее изъ ушатовъ холодною водою. Возвратившись домой, почувствовала боли въ поясницѣ, безъ облегченія прежняго состоянія, и вмѣстѣ съ симъ начало ее тянуть къзади. Пронзительный вопль оный болѣе навелъ не только въ домѣ, но и во всей деревнѣ ужасъ, а особливо когда начало ее свертывать въ клубъ, какъ она объяснялась. Оный сего спрдаванія нѣсколько разъ была она на короткое время какъ бы мертвою, и опять возвращалась къ жизни,

чтобы чувствовать мученія невыразимыя. Въ семь спрдадальческомъ состояніи жила она немалое время, котораго опредѣлить не могла, но не меньше однакожь 2-хъ мѣсяцовъ, доколѣ не приведена была въ теченіе почти года въ настоящее положеніе, въ которомъ находится уже 36-й годъ.

»Разскажь сей прерываемъ былъ часткою одышкою и оханьемъ, къ концу коего замѣтна была успалость въ голосъ и на лицѣ, на которомъ показался сильный потъ. Почему я ее потчасъ оспавилъ, пробывъ у нея не болѣе трехъ часовъ, дабы не привесть ее въ совершенное изнеможеніе, и общагъ вечеромъ навѣспилъ ее.

»Въ 5 часовъ вечера я нашелъ ее покойною и съ прежнею охотою говорить. Слушавъ ее со вниманіемъ около двухъ часовъ, я проспился съ нею до завтра, замѣтивъ изнеможеніе, какъ и упрямъ. Въ это посѣщеніе рассказывала она мнѣ о многихъ достопамятныхъ случаяхъ въ ея необыкновенной жизни, о знакомствѣ съ разными людьми, между коими упомянула о Г-жѣ Харлаиновой, попеченіемъ которой недавно устроена вышеописанная кровать съ мягкими подушками. Присемъ не

умолчала и о томъ, чего сполно ей перемѣненіе ся съ мѣста, на которомъ она прежде лежала; отъ мучительныхъ болей имѣла она обморокъ съ опухолью на всемъ тѣлѣ, а особливо на лицѣ, которая оставалась въ продолженіе двухъ недѣль. По испеченіи сего времени опухоль совершенно опала, и она чувствовала себя, какъ и прежде, по состоянію своему хорошо. При прощаніи взявъ ее за руку, нашелъ я пульсъ у ней правильнымъ, нѣсколько медленнымъ.

»Въ воскресенье, 26-го числа, въ 3 часа по полудни, пришедши къ ней, объявилъ я о себѣ и о цѣли моего посѣщенія. Сродная женскому полу спыдливость изобразилась на лицѣ ея и слезы показались на глазахъ. Успокоивъ ее, сколько было возможно, и снявъ всѣ переднія занавѣски, одну боковую войлочную спопону кровати и замаранное бѣлье, увидѣлъ ее въ слѣдующемъ положеніи: голова, какъ выше упомянуто, правою щекою лежала внизъ на подушкахъ, а лѣвою вверхъ. Лѣвое плечо находилось близъ лѣваго уха; на правомъ она лежала. Туловище, начиная съ груди, косвенно вверхъ поднимаясь отъ постели, оканчивалось вверхъ ногами; бедра между собою

разстояни, и тѣмъ болѣе, чѣмъ далѣе были  
 отъ пазла, такъ что разстояніе одного колѣна  
 отъ другого можно положить въ аршинъ.  
 Лѣвая нога съ плуовищемъ и головою пред-  
 ставляла неправильный острый треугольникъ,  
 за верхушку коста можно принять колѣно, за  
 одну сторону бедро, простирающееся въ пазъ,  
 а за другую голень, оканчивающуюся стопою,  
 подошва кѣей срединною находилась на бо-  
 ковой части лѣвой стороны головы, а пер-  
 естами упиралась о постель, въ семь мѣстъ  
 довольно твердую. Правая нога, простираясь  
 вверхъ кзади и нѣсколько въ противоположную сто-  
 рону лѣвой, согнута была въ колѣнѣ, такъ  
 что икра голени касалась задней части бедра,  
 а пятка задницы. Подошва лежала горизон-  
 тально къ голени на кругломъ корбѣ съ по-  
 душкой, отъ чего пазъ принималъ противополо-  
 ное натуральному направленіе въ стоячемъ поло-  
 женіи чловѣка; лѣвая рука лежала согнутою  
 въ локтѣ на лѣвомъ боку, а правая болѣе  
 согнутою въ локтѣ подъ правую сторону  
 головы ладонью къ щекѣ.

»Такое положеніе представляло необык-  
 новенное измѣненіе вообще всѣхъ составовъ,  
 въ особенности же позвоночнаго столба,

копорого самое большое искривленіе было въ шеѣ и поясницѣ, въ первой на одну сторону спорону, и именно, на лѣвую, въ послѣдней на сію же спорону и вмѣстѣ впередъ угломъ, такъ что ложныя ребра подошли опъ сего лодъ кость подвздошную. Вложивъ въ сію впадину руку, причемъ она закричала, нашелъ л мокрую нечистоту и опрьдѣсь. Положеніе сіе, при дальнѣйшемъ разсмаптриваніи, удостовѣрило, что вся тяжесть пѣла упиралась на лѣвое плечо, поддерживаема будучи нѣсколько шеєю, головою и перспами правой ноги. Голову могла она двигать взадъ и впередъ; въ такомъ случаѣ перспы лѣвой ноги замѣняли опору вмѣсто шеи и головы, причемъ подолва на нѣсколько линій опспавала опъ головы. Лѣвая спорона шеи при ощупываніи мягка и въ складкахъ; правая, очень выпянушая, напрошивъ гладка и довольно пверда. Ноги длинныя, понгіа, исключая членосоединенія и спопъ, кои довольно велики; живопъ весьма большой, выдавшійся впередъ; грудь казалась длиннѣе натуральнаго; голова обыкновенной величины. Мышцы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пѣла очень распяжены и пверды, а въ другихъ мягки и даже вялы, особливо на

ногахъ. Кожа пѣжная, гладкая, во многихъ мѣстахъ исцарапанная отъ чесанія при сильномъ зудѣ. На вопросъ, можно ли принять коробъ? »Если угодно вамъ, отвѣчала она, по я отъ сего должна терпѣть долго мучительныя боли.« Увѣривъ ее, что каплями могу избавить отъ нихъ, принялъ я оный, причемъ палочки обѣихъ ногъ плотно прижались, лѣвая къ головѣ, а правая къ задницѣ. Она сильно закричала; почему я поспѣхъ поспавилъ его на мѣсто и оставилъ дальнѣйшее изслѣдованіе до завтра, давъ ей для успокоенія 40 капель *tinct. opii*.

»27-го, въ понедѣльникъ, упрямъ въ 9 часовъ, встрѣпила она меня сильнымъ и частымъ оханьемъ, жалуясь на боли во всемъ тѣлѣ, а особливо въ поясницѣ и ребрахъ лѣваго бока; вмѣстѣ съ симъ спросила она, нѣтъ ли у меня какой нибудь мази. Я приказалъ принести *olei olivae cum camphora*, и согрѣвъ велѣлъ при мнѣ всю ее выпереть, причемъ боли, на которыя она жаловалась, не уменьшили охоты говорить. Въ это поведеніе рассказала она о различныхъ способахъ леченія и безчисленныхъ средствахъ, употребленныхъ ею, и что на претѣй годъ ее бо-



лѣзни былъ у ней 9 дней Городовой Лекаръ, дѣлалъ ей теплыя муравьиныя ванны, множество припарокъ и давалъ декокшъ, копорый она пила недѣль шесть, но безъ пользы.

«Между тѣмъ просила у меня вчерашнихъ капель; я далъ ей 60 капель *tinct. valerian. aeter, Phar. Castr.* Она узнала, что капли были не тѣ, и просила дать ей побольше капель, кои могли бы облегчать боли ея. »Ужь выадоровѣть я давно пошеряла надежду, прибавила она; но молю Бога, чтобы Онъ не оспавилъ меня безъ маперіи.» Присемъ замѣтно было изъ всего, что она желаетъ и надѣется еще жить. Около полудня я ее оспавилъ, а въ 6 часовъ вечера возвратился къ ней, и велѣвъ приготовить чай, пригласилъ ее пить со мною; она была къ сему очень признавательна. Приказавъ поднять занавѣски, я увидѣлъ, что она пьетъ безъ затрудненія, попирая присемъ переднюю часнь шеи правою рукою. »Пить, говорила она, я легко могу, но ѣсть кромѣ жидкаго не лѣзя. Все твердовавшее я должна, размочивъ, лишь сосать. Такъ пишаюсь я уже 36 лѣтъ, и когда много выпью или поѣмъ, то брюхо чрезвычайно заболитъ и опухнетъ. Въ такомъ случаѣ, равно и при

болѣхъ во всемъ мѣзѣ, которая больше чувствую при дурной погодѣ, избавляюсь отъ нихъ горчимъ ушюгомъ.

»28-го снѣлъ я съ нее видъ и оставилъ ей каши, давъ наставленіе, какъ принимать онныя и когда.

»1-го Марта я объявилъ ей милость Государя Императора и вручилъ Всемилостивѣйше пожалованные ей 500 рублей ассигнаціями, въ присутствіи Священно и Церковнослужителей и нѣкоторыхъ крестьянъ сей деревни.

»Нескоро опивчала она на поздравленіе съ Высочайшею милостию моею и нѣкоторыхъ изъ присутствовавшихъ, смотрѣла лишь неподвижными на меня глазами; наконецъ, при тяжеломъ вздохѣ, чувство глубочайшей признательности выразилось въ тихой и благоговѣйной молитвѣ о благоденствіи Государя Императора и Его Августѣйшаго Дома.

»2-го Марта она воспрѣпила меня со взоромъ полнымъ и радостнымъ, говорила много о настоящемъ счастьи, ея неожиданномъ, и напоследокъ простилась со мною въ слезахъ и

мольбѣ о благоденствіи всей Императорской Фамиліи.

Изъ всего вышеписаннаго явствуетъ, что болѣзнь ея есть оцѣпенѣніе или столбнякъ (tetanus), кончившійся необыкновеннымъ сведеніемъ (contractura). Причиною такого состоянія должно полагать, при слишкомъ чувствительномъ образованіи нервной системы, боязнь на счетъ замужства въ незрѣломъ возрастѣ (она и до сего времени оспалась въ дѣвственномъ состояніи), простуду, а особливо употребленіе при леченіи средствъ, сильно поправляющихъ нервную систему, какъ то: скупыя обливанія холодною водою: ибо вскоре послѣ оныхъ, какъ видно изъ исторіи болѣзни, начались судороги (spasmi tonici), кончившіяся сведеніемъ.

Исцѣленія сего недуга ожидать не слѣзи: ибо многія часны пѣла до него измѣнились въ своемъ положеніи и образованіи, что никакими силами человеческими въ первобытное естественное состояніе привести бытъ не могутъ, особливо если принять въ разсужденіе продолжительности ея болѣзни и мѣста жизни. Посему я и не употребилъ никакого

леченія, кромѣ средствъ вышеупомянутыхъ, кои могутъ ее успокаивать и ободрять.

»Святая Вѣра, до сего времени облегчавшая всѣ ея спраданія опъ болѣзни и бѣдности, съ неизреченною милосцію Государи Императора, будутъ лучшимъ и единственнымъ цѣлительнымъ для нея средствомъ въ теченіе остальной ея жизни, безъ сомнѣнія недолгой.»

---

#### IV.

НЕРВНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ГОРЯЧКА  
СЪ ОГНЕННЫМЪ ВЕРЕДОМЪ. КРОВО-  
ПУСКАНИЕ ПРИ КРАЙНЕМЪ, ПО ВИДИ-  
МОМУ, ИЗНЕМОЖЕНІИ СИЛЬ.

*Сообщилъ Профессоръ Терапевтической Клиники*  
*П. Чаруковскій.*

---

*Василій Киселевъ*, Государственнаго Кон-  
троля Временной Коммисіи для рѣшенія сче-  
повъ служилъ, 50-ти лѣтъ, крѣпкаго сло-  
женія, поступилъ въ Клинику 1-го Октября  
1829 года.

Кромѣ такъ называемыхъ болѣзней разви-  
тія, онъ многократно спрадалъ припадками  
груди и брюха, также печеніемъ изъ уха,  
поносомъ и ревматическими болями, по при-  
чинѣ копорыхъ въ различное время пускалъ  
кровь изъ руки до десяти разъ.

29-го Сентября по полудни, исправляя  
свою должность, *Киселевъ* почувствовалъ оз-

ночь съ послѣдующимъ жаромъ и малымъ по-  
помомъ, слабость во всемъ пѣтъ; послѣ того  
появилась головная боль, тошнота, рвога и  
небольшой кашель. На другой день поупру  
рвога, а по полудни пѣже лихорадочные при-  
падки въ сильнѣйшей степени, которые,  
равно какъ и рвога, возвращались на третій  
и четвертый день, когда больной опправленъ  
въ госпиталь, откуда послѣ обѣда присланъ  
въ Клинику.

Припадки: острая боль головы, особливо  
въ вискахъ и во лбу, глаза блестящіе, красно-  
вапые, лице также красное, тяжесть въ гру-  
ди, частый, короткій кашель, съ небольшимъ  
изверженіемъ харкопыны; тупая боль подъ  
ложечкою, при давленіи и дыханіи увеличи-  
вающаяся и распространяющаяся до пупка.  
Языкъ къ корню и на срединѣ покрытъ бѣ-  
лою слизью, по краямъ и на кончикѣ сухой,  
жесткій, цвѣта темнорозоваго; жажда, аппе-  
титъ пошерна, тошнота; испражненіе ни-  
зомъ частое, жидкое, вонючее, красноватое;  
кожа сухая, температура тѣла возвышенная,  
голова горячая; пульсъ частый, нѣсколько  
крѣпкій. По вечерамъ, какъ упомянуто, при-  
мѣтное ожесточеніе.

2-го Октября. Ночью грезы и бредъ, звонъ въ ушахъ, острая боль по всему брюху, увеличивающаяся опѣ прикосновенія; колючая боль въ передней части груди. Пуспимъ изъ руки крови фунтъ, къ брюху *cataplasmata narcotica emollientia, fomenta frigida* къ головѣ; внутрь *mixtura mucilaginoso cum succo spissato hyosciami nigri*.

3-го. Острыя боли брюха уничтожились, кашель и боль въ груди уменьшились; жидкія испражненія низомъ, бредъ и звонъ въ ушахъ продолжаются; кожа сухая, горячая, какъ бы жгучая. Холодная ванна (до 15-ти градусовъ), попомъ теплое питье; продолжаю микстуру.

4-го. Больной чувствуетъ себя гораздо лучше, кожа мягкая, глаза чище; ночной бредъ и звонъ въ ушахъ продолжаются, пульсъ чаще, нежели вчера; испражненіе низомъ жидкое, хотя не очень частое, брюхо полное. *Pulv. rad. rhei 3j, pro dosi*; также микстура, горчичники къ подошвамъ и якрамъ, холодныя примочки къ головѣ.

5-го. Языкъ мягкій, но значительно покрытый бѣлою слизью; пульсъ полнѣе, температура тела возвышенная, бредъ продолжи-

мельче, испражнение низомъ жидкое, брюхо полное. *Rp. Muriat. ammon. nitrat. potass. aa ʒij, decocturae orhidis morionis ʒvj, syrup. simpl. ʒj. M. d. s.* чрезъ два часа по столовой ложкѣ; *epispastica, fomentum commune* къ головѣ.

6-го. Сонливость, прерываемая бредомъ; пульсъ малый, твердоватый, языкъ жесткій, нечистый, испражнение низомъ по прежнему, брюхо чувствительное, бредъ сильный, такъ что больной ночью хотѣлъ бѣжать. *Synapismata* къ плечамъ и брюху, испанская мушка между лопатками, а внутрь еще микстура безъ *nitras potassae*, теплая ванна.

7-го. Бредъ тихій, сонливость, темно-красныя пятна по всему тѣлу, пульсъ неровный, малый и весьма частый, языкъ шероховатый, сухой, дрожащій, испражнение низомъ по прежнему, по временамъ сопряженіе всего тѣла. *Mixtura mucilaginosa cum vino stibato*, преніе всего тѣла теплымъ уксусомъ.

8-го. Совершенное безчувствіе, непрерывный тихій бредъ, судорожныя движенія въ конечностяхъ и во всемъ тѣлѣ, пульсъ весьма малый, слабый, чрезвычайно частый, неправильный, языкъ шероховатый, красный, дро-



жацій, температура тѣла, особливо конечностей, ниже естественной, все тѣло покрыто синеватыми пятнами. Кровопускание изъ руки до фунта, 15 пиявокъ въ головѣ, synapismata попеременно къ подошвамъ, икрамъ, бедрамъ и плечамъ; тѣло перепь почаше теплымъ укусомъ, мушку на запялокъ, внутрь: Rp. Infus. rad. valer.  $\text{ʒvj}$ , acetat. ammon. liquide  $\text{ʒi\beta}$ , mucil. g. arab. syrur aulant. aa  $\text{ʒj}$ ; m. d. s. Каждый часъ по споловой ложкѣ. — Вечеромъ: судорожныя движенія конечностей и всего тѣла, бредъ и безчувствіе уменьшились, языкъ не столь жесткій.

9-го. Пульсъ частый, малый, но правильное, поносъ остановился; больной болѣе въ памяти. Къ микспурѣ прибавить camphor gr.  $\text{vj}$ ; продолжая горчичники и преніе тѣла.

10-го. Болезненные явленія, п. е., бредъ, безчувствіе и судорожныя движенія уменьшились, пульсъ полнѣе, не столь частый, языкъ чистый, влажный, пятна краснѣе и рѣже, умственные оппавленія въ лучшемъ состояніи; вчера и сегодня на низъ не было. Clyster communis; таже микспура.

11-го. После клистира одно испражненіе низомъ жидкое и водянистое, моча восемь разъ, блѣдная; судорожныя движенія членовъ прекратились, бредъ только во время сна, пульсъ частый и полный, языкъ чистый; умственыя опправленія въ хорошемъ состояніи; опъ раздраженія мушки, произошло рожевое воспаленіе на лицѣ и верхней части груди. Продолжать прежнюю микстуру, оставивъ камфору; горчичники также оставить; продолжать преніе пѣла; для перевязанія мушекъ *emplastrum melliloti*.

12-го. Рожевое воспаленіе уменьшилось; бредъ, сонливость и звонъ въ ушахъ почти уничтожились, пульсъ полнѣе, нѣсколько неправильный, кожа мягкая, испражненіе низомъ задержано, молопица во рту. Продолжать прежнюю микстуру, преніе же оставить.

13-го. Сильная боль по всему пространству брюха, усиливающаяся опъ малѣйшаго прикосновенія, пульсъ сжатый, неправильный, конечности нѣсколько холодныя, дрожаніе. Оставить прежнюю микстуру, давать теплую *mixtura mucilaginosam*, Phar. Austr., *submur. hydrarg. cum succo spiss. hyosc.*

nigri. 15 пѣлокъ къ брюху, cataplas. narcotico-emollientia.

14-го. Боль въ брюхѣ уменьшилась, пульсъ полнѣе, болѣе правильный и немного скорѣе натуральнаго, конечности не столь холодны, какъ прежде, языкъ изъязвленный. Кромѣ прежняго леченія теплая ванна, *linctus ex subboratae sodae*.

15-го. Кожа мягче, температура тела натуральная, боль брюха уменьшилась, умственные способности въ хорошемъ состояніи. Тоже леченіе.

16 и 17-го. Боль въ брюхѣ уничтожилась и прочіе болезненные припадки едва замѣтны, языкъ однакожъ изъязвленный. Продолжалъ вышесказанное леченіе, кромѣ припарокъ.

18-го. Ночью тихій бредъ, пульсъ опять слабѣе. Микстура, предписанная въ 9-й день сего мѣсяца; *submur. hydrarg.* оставилъ.

19-го. Бредъ и сонливость продолжаются въ значительной степени, жаръ головы, пятна на кожѣ сдѣлались темнѣе, пульсъ малый, неправильный и медленнѣе натуральнаго, кожа сухая, вялая; на низѣ не было. Кромѣ вышесказанной микстуры порошокъ *ex subcarbonat.*

ammon. gr. jv, moschi gr. ij, sachar. albi 3j  
чрезъ при часа, clystma commune; послѣ  
того, если нужно, ввечеру olei ricini 3j.

20-го. Состояніе больного тоже. Оста-  
вить порошки, продолжать микстуру; свѣтъ  
къ головѣ.

21-го. Легче. Тоже леченіе.

22-го. Температура тѣла нѣсколько воз-  
вышена, пульсъ раздраженный, боль въ брюхѣ  
при маломъ давленіи увеличивается; нѣсколько  
небольшихъ вередовъ на пѣхъ мѣстахъ, гдѣ  
лежали мушки, п. е., на брюхѣ и спинѣ;  
между послѣдними одинъ величиною въ 1½  
дюйма въ діаметрѣ. Decoctura mucilag.  
cum succo spiss. hyosciam.; на брюхо и ве-  
реда смягчительныя припарки.

23-го. Боль въ брюхѣ уничтожилась,  
больной чувствуетъ себя лучше. Продолжать  
вышесказанное слизистое питье.

24-го. Пульсъ чаще и нѣсколько неправи-  
ленъ, температура тѣла возвышена. Кромѣ  
слизистаго питья mixtur. acetat. potassae.

25-го. Всѣ общіе воспалительныя при-  
падки уменьшились и больной чувствуетъ  
облегченіе. Большой вередъ имѣетъ видъ ог-  
ненного (carbunculus). Припарки къ вередамъ.

26-го. Больный примѣтно поправляется.

27-го. Сильная боль въ огненномъ вередѣ, находящемся между 4 и 5-мъ ребромъ на правой сторонѣ кзади, близъ нижняго угла лопатки. Пяшь пѣвокъ вокругъ сего вереда и cataplas. narcotico-emmollientia; внутрь употребляютъ ту же самую микстуру.

28-го. Боль въ огненномъ вередѣ уменьшилась, но въ ономъ обнаружилось помертвѣніе. Вередъ разрезанъ крестообразно до основанія и примачивается infuso species aromatic. cum solutione chlorureti calcis; на ночь прикладываютъ unguent. de stircacae, внутрь infus. cort. cinchon off. (\*).

29-го. Общее состояніе хорошее; боль вокругъ огненного вереда уменьшилась.

30-го. Descoctura cinchonaе off. Съ сего времени опасныя припадки болѣе не возвращались; огненный вередъ постепенно очищался, силы поправились, язва зажила и 3-го Декабря больной выписанъ совершенно здоровымъ (\*\*).

---

(\*) Будучи самъ нездоровъ съ 21-го по 28-е число, я не могъ посѣщать Клиники; огненный вередъ разрезанъ Профессоромъ Оперативной Хирургіи Саломономъ.

П. Ч.

(\*\*) Исторію болѣзни писалъ Студентъ 4-го класса Харлампій Иноевъ.

Случай сей, сколько онъ ни примѣчательнъ и въ другихъ отношеніяхъ, предсавилъ я только въ доказательство мною преждесказаннаго, что и въ ипрѣемъ періодъ горячки, не сморъ на слабый, неправильный пульсъ, холодныя конечности, иногда смѣло предпринятое кровопусканіе можетъ спасти больного (В. М. Ж. ч. XV. стр. 85). Въ такомъ или еще въ худшемъ состояніи находился нашъ больной 8-го Октябръ, и я рѣшился сдѣлать значительное кровопусканіе. Безъ сомнѣнія многіе, особливо оспорожные, практики называли бы такое леченіе дерзкимъ и неблагоприятнымъ, если бы счастливая перемѣна, въ состояніи больного непосредственно за тѣмъ восплѣдовавшая, онаго не оправдала. Въ самомъ дѣлѣ, въ Клиникѣ въ то время было нѣсколько иностранныхъ Врачей, оканчивавшихъ свой экзаменъ и они, какъ увѣряетъ державный сего больного Студентъ, еще прежде удивлялись, что мы не употребляемъ сильнѣйшихъ возбуждающихъ средствъ; а когда въ сказанный день велѣлъ я больному пустить кровь и поставилъ пиявицъ, то удивленіе ихъ достигло высочайшей степени, и они, по сло-

вамъ того же Студента; съ неперпѣніемъ ожидали послѣдствія сего леченія.

Вопль причины, побудившія меня къ кровопусканію. Я согласенъ, что путь крѣпость (energia) силъ организма, а особливо мозга, сердца и кровеносныхъ сосудовъ ослабѣла отъ продолженія жеспокой и сопряженной болѣзни; но опасность зависѣла не столько отъ сей слабости, сколько отъ неравновѣсія между силами, приводящими кровь въ движеніе и ея количествомъ, отъ чего движеніе ея ослабѣвало и она начала скопляться во внутренностяхъ, особливо въ головѣ и груди, и ихъ угнетать, а посему и ослаблять ихъ дѣятельность еще болѣе. Сильныя возбуждающія средства, часто даваемыя, конечно еще возбуждали бы ослабѣвшую дѣятельность указанныхъ органовъ и освѣжили бы больного или, лучше сказать, возбуждали бы его искусственно; но таковое вынужденное усиліе организма пѣтъ скорѣе истощило бы оспашокъ его силъ. Нужно было уменьшитъ количество крови въ организмъ и отвлечь ее отъ главныхъ органовъ, нѣсколько освободитъ ихъ отъ несоизмѣрной для нихъ пѣжести, дабы и слабыя силы съ мѣньшимъ напряженіемъ могли приво-

дипть ее въ движеніе. По уменьшеніи количества крови спарались мы, наипаче наружными раздраженіями, возбудишь дѣятельность окончаній сосудовъ съ тѣмъ же намѣреніемъ, п. с., дабы отвѣчать влаги опъ внутреннихъ органовъ.

Что кровопусканіе при наспоющемъ изнеможеніи силъ ускоритъ худой исходъ горячки, это явствуетъ само по себѣ. Но какъ различитъ слабосиь опъ угнетенія силъ я наспоющее ихъ изнеможеніе по совершенномъ развитіи пренсальго періода горячки? Вопросъ сей рѣшитъ весьма трудно. Я руководствуюсь въ семъ отношеніи наипаче слѣдующими особенностями:

1. У людей чувствительныхъ, худощавыхъ рѣдко можетъ случиться угнетеніе опъ скопленія крови; напротивъ того у полнокровныхъ, привыкшихъ къ кровопусканію, состояніе сіе чаще случается, нежели простое изнеможеніе силъ.

2. Настоящее изнеможеніе силъ въ горячкахъ нашего климата рѣдко можетъ случиться прежде двухъ недѣль опъ начала болѣзни, развѣ горячка будетъ весьма сильна, больной слабаго сложенія, либо оставленъ безъ всякой



помощи при самых неблагоприятных обстоятельствах, или потерял много крови либо других влагъ.

3. Наспоящее изнеможеніе силъ свойственно горячкѣ съ непостоянными признаками (*symptomata versatilia*), а угнетеніе силъ случается въ горячкѣ съ спускою чувствъ (*febris cum stupore*).

4. Наспоящее изнеможеніе силъ сопровождается по большей части бессонницею (*pervigilium*) или безпокойнымъ сномъ (*soma vigil*); безчувствіе наступаятъ только передъ смертію; при угнетеніи силъ безчувствіе наступаятъ безъ предшествовавшей бессонницы, исключая, когда горячка сопровождается воспаленіемъ мозговыхъ оболочекъ.

5. При наспоющемъ изнеможеніи силъ лице и все тѣло бывають блѣдныя, пощія, глаза впалыя, сухыя; при угнетеніи силъ хотя нѣсколько полное, синеватое или темновѣдшее, глаза болѣе или менѣе налитыя кровью, дыханіе со вздохами.

Впрочемъ всѣ сіи признаки нужно подтверждать дальнѣйшими наблюденіями.

Распознаііе *exjuvantibus* et *poscentibus*,  
сколько оно вообще ни предосудительно,  
въ подобныхъ весьма сомнительныхъ и опас-  
ныхъ случаяхъ извинительно.

## V.

### ПЕРЕЛИВАНІЕ КРОВИ.

---

При сильныхъ кровопеченіяхъ, когда уже появились всѣ признаки приближающейся смерти: лице блѣдное, дыханіе едва примѣтное, частое и поскливающее, пульсъ неощутимый, конечности холодныя, покрытыя клейкимъ попомъ, глотаніе прекращено и проч. нѣтъ другаго средства къ спасенію, кромѣ переливанія крови (transfusio).

Операція сія не есть новая; она испытана во Франціи уже за нѣсколько предъ симъ столѣтій; но Докторъ *Блонделль* (Blandell, въ Лондонѣ) производилъ ее совсѣмъ инымъ способомъ и при другихъ обстоятельствахъ. Во Франціи дѣлали переливаніе крови преимущественно для того, дабы снова оживить старыхъ и слабыхъ людей, вливая въ нихъ

жилы кровь молодых и крепких. Набожные признали его противнымъ намѣреніямъ Творца и поному оно было оспавлено.

Предирниятіе опытовъ надъ живопными въ новѣйшее время возобновило сію операцію во Франціи и Англіи. Докпюръ *Блонделль* произвелъ много паковыхъ опытовъ и доказалъ, что въ человѣческія жиы можно вливать человѣческую кровь не только безъ опасноспи, но и съ величайшею пользою, напримъ, когда опъ сильнаго кровоисеченія изъ мапки жиы женщины находися въ опасноспи.

Опъ дѣлалъ много опытовъ надъ собаками, коимъ пускатъ кровь до полусмерпи, и пономъ опяты ихъ оживлялъ чрезъ впрыскиваніе въ ихъ жиы крови того же рода живопныхъ. Присемъ опъ узналъ, что ежели собакъ впрыскиваютъ кровь человѣческую или другихъ живопныхъ, что хоня собака и оживаетъ, одлако вскорѣ пономъ онаѣвается. О семъ обстоятельстве упоминаетъ уже Докпюръ *Мококъ* въ своей диссертаціи, напечатанной за 9 лѣтъ предъ симъ въ Единбургѣ. Вообще кровь одного рода живопныхъ не можетъ замѣнить крови живопныхъ другого рода. *Блонделль*

также опытами доказалъ, что кровь человѣческая, прошедши чрезъ сифонъ (хотя и перелетѣ нѣсколько своей жизни), не смертоносна для другаго челоуѣка.

Операция переливанія въ Англіи производится слѣдующимъ образомъ: Берется мѣдный (messingper), внутри вылуженный сифонъ, нѣмалѣйше непронускающій воздуха, ёмкостью въ двѣ унціи. Его опиюдь не должно омачать масломъ, напроптивъ того онъ долженъ быть совершенно чистый. Боковая трубочка сифона притѣлывается такъ, какъ ее обыкновенно употребляютъ для впрыскиванія, а къ концу трубочки притѣлывается другая изъ слоновой кости, также совершенно чистая, на концѣ нѣсколько заостренная (abgeschärft). Надъ vena mediana больного дѣлается разрѣзъ и она отдѣляется отъ крововъ такъ, чтобы можно было подвесить подъ нее зондъ. Потомъ вену сію вскрываютъ линіи на полпальца ланцетомъ, совершенно чистымъ и оспрымъ, и пробуютъ вложить въ отверстіе трубочку изъ слоновой кости, дабы видѣть, легко ли и удобно она входитъ въ него. Послѣ сего, дабы кровь скоро не егуснилась, сифонъ согрѣвается теплою во-

дою, либо двиганіемъ въ немъ нѣсколько разъ поршня.

Приготовивъ все сіе, открываютъ вену у мужчины продолговатымъ разрезомъ и выпускаютъ немного крови въ сосудъ, откуда вытягиваютъ ее въ сифонъ, который держатъ къ сосуду вертикально. Кровь изъ сосуда вытягиваютъ въ сифонъ не всю, но нѣсколько оставляютъ ее въ ономъ, дабы вмѣстѣ съ нею не вошелъ въ сифонъ и воздухъ. Потомъ обрываютъ сифонъ вертикально такъ, чтобы рукоятка была внизу и выгоняютъ изъ него около ложки крови, дабы съ оною вышелъ и воздухъ. Послѣ сего запираютъ перстомъ опверстіе косяной трубочки, дабы не пропелъ въ нее воздухъ, приводятъ сифонъ въ горизонтальное положеніе и конецъ его приводятъ къ венѣ больного. Помощникъ долженъ прижимать вену зондомъ, дабы воспрепятствовать теченію крови, а въ случаѣ надобности опереть губкою всю кровь, вытекающую изъ открытой вены.

Наконецъ косяную трубочку вводятъ на поддѣлку въ опверстіе вены, въ направленіи къ сердцу и вырываютъ кровь въ вену тихо и равномерно: ибо чрезъ скорое выр-

скиваніе сердце будетъ обременено кровію и больной умретъ. Таковыя впрыскиванія продолжаятся тихо и медленно; приче́мъ нужно внимательно наблюдать лице больного, дабы, коль скоро покажется движеніе губъ или глазъ, впрыскиваніе поспѣшь прекратить; если же напротивъ того цѣпть лица поправляется, то впрыскиваніе продолжаютъ.

Если нужно остановиться на минушю или на двѣ, то сифонъ надлежитъ опорожнить и снова наполнить его кровію вышеописаннымъ способомъ. Впрыскиванія дѣлаются съ промежутками 6-8 минутъ, дабы вдругъ не влиять въ тѣло много крови, потерявшей нѣсколько своей жизни, что соблюдается и въ такихъ случаяхъ, въ коихъ операція соопвѣтствуетъ желанію. Всякой разъ сифонъ нужно вымоласкивать теплою водою; крови можно вливать постепенно до 16-ти унцій, хотя вообще 8 или 10 унцій бывають достаточны. *Блондель* утврждаетъ, что 4-6 унцій уже оказываютъ благоприятное вліяніе. Но если мы желаемъ придати больному болѣе силы, то нужно вливать большее количество. Коль скоро дыханіе прекратится, то вся надежда исчезла; если же оно продолжается и

дѣлается больше, что можно ожидать хорошаго успѣха.

Уже извѣстны десять случаевъ, въ коихъ переливаніе крови сдѣлано съ успѣхомъ; но если бы операція сія имѣла счастливый исходъ еще рѣже, нежели Цесарское сѣченіе или вскрытіе желудка, то и тогда надлежало бы къ ней прибѣгать: ибо она есть единственное средство къ спасенію больного.

Справедливо, что самое опасное кровотеченіе едва ли бываесть смертельно въ одномъ случаѣ изъ 20-ти; но не ужели можно опасивать сего двадцатаго больного, не употребивъ единственнаго средства къ его спасенію? Нѣтъ! Врачъ обязанъ употребить всевозможныя средства, хотя бы они были и сомнительны. Еще не лѣзя опредѣлять содержанія счастливыхъ случаевъ послѣ сей операціи къ несчастливымъ; сколько извѣстно, они содержатся какъ 10 къ 1. Самая большая опасность отъ переливанія, если оно слишкомъ послѣшю будетъ производимо, состоятъ въ пеноосредственной смерти либо въ воспаленіи вены, которое послѣ можетъ распространиться до сердца; но этого еще не случалось.

Notizen von Froriep. Bd XXIV. стр. 136.



## VI.

### КРОВЬ ЧЕЛОВѢКА И ДРУГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ МОЖНО РАСПО- ЗНАТЬ ПО ЗАПАХУ.

---

Химія уже за нѣсколько времени предъ-  
симъ опредѣлила, какъ различать кровавыя  
пятна на платьѣ отъ некровавыхъ; но рас-  
познаше сіе плѣтъ и кончилось. Микроскопи-  
ческое открытіе *Преве* и *Дюма*, касательно  
различія кровавыхъ шариковъ мужчины и  
женщины, для непривыкшихъ къ таковымъ  
ислѣдованіямъ затруднительно, а если кровь  
загустѣла, то и совершенно бесполезно. *Г.  
Баррюель* показалъ способъ къ разрѣшенію  
весьма важнаго вопроса Судебной Медицины,  
который понынѣ оставался неразрѣшеннымъ,  
черезъ что величайшіе преступники могли  
избѣгать наказанія.

»Уже нѣсколько тому лѣтъ, говоритъ  
*Г. Баррюель*, когда началъ я приготовлять

красящее начало крови по способу *Вокелена* (через варение свержка крови в умягченно-крепкой сырной кислоте) и брать для сего бычьую кровь, заметил я происходивший при этом сильный запах коровьего сенола (*bouvetie*). Замечание это однако оставалось без всяких последствий, пока особое, недавно случившееся происшествие подало мне случай сделать подобное наблюдение.

Один игрок, проигравши значительную сумму денег, решился лишиться себя жизни и на сей конец проглотил большое количество опиума. Это было потом же частью открыто, и Г. *Орфила*, призванный на помощь, успел его спасти. Как между прочими средствами сделано было значительное кровопускание, то Г. *Орфила* воспользовался сим случаем, дабы узнать, не содержит ли кровь людей, принимавших большое количество опиума, сколько нибудь морфина. С паковым намерением принесть он ко мне сказанную кровь и просил меня сделать нужное исследование.

Я сплел в воду кровь в водяной бане, дабы с удобней можно было распереть. Присем я не заметил никакого запаха.

Послѣ сего я разгорячилъ ее съ большимъ количествомъ разведенной сѣрной кислоты до кипѣнія, и изъ колбы, въ которой ее разогрѣвалъ, поспѣху распроспранился столь сильный запахъ человѣческаго по́па, что вся лабораторія имъ наполнилась, и я былъ принужденъ выйти изъ оной на нѣсколько минутъ. Случай сей привелъ мнѣ на память запахъ бычачьей крови, слышный при приговлѣніи изъ нея красящаго начала по способу *Вокелена*, и съ той минуты мнѣ показалось возможнымъ различать кровь другихъ животныхъ отъ человѣческой. Для сего намѣренія дѣлалъ я множество опытовъ, коихъ главные слѣдствія суть слѣдующія:

1. Кровь каждаго рода животныхъ имѣетъ особое начало.

2. Начало сіе есть летучее и имѣетъ запахъ по́па или испарины кожи, либо легкихъ того рода животныхъ, отъ котораго взята кровь.

3. Сіе летучее начало находится въ крови въ состояніи соединенія скрывымъ.

4. По уничтоженіи сего соединенія летучее оное начало улетаетъ, и тогда легко узнать, какого рода животного эта кровь.

5. Во всякомъ родѣ животныхъ сего начало слыжится въ крови самцовъ, нежели самокъ; у людей крѣпость его изменяется по цвѣту волосъ.

6. Пахучее начало остается въ соединеніи и во время разрѣшенія крови; посему его можно освободить не только изъ свѣжей крови, но также изъ крови, потерявшей свое волокнистое вещество и изъ ся сыворотки.

7. Наконецъ крѣпкая сѣрная кислота есть наилучшее средство для освобожденія изъ крови сего пахучаго начала.

Нужно только взять каплю крови или сыворотки крови; впустить въ стеклянку, прилить къ ней крѣпкой сѣрной кислоты, претью или половиною болѣе противъ количества крови и мѣшать стекляною палочкою; тогда пахучее начало обнаружится почтичасъ. Сямъ способомъ могу я удобно различить слѣдующіе роды крови, коихъ вмѣстѣ представляю и особенные запахи.

1. Кровь мужчины издаетъ крѣпкій запахъ поппа мужчины, котораго не возможно смѣшать съ запахомъ другаго рода.

2. Кровь женщины издаетъ такой же запахъ, т. е., подобный запаху женскаго по́па, только гораздо слабѣе.

3. Бычачья кровь издаетъ крѣпкій запахъ коровьяго спойла или навоза.

4. Лошадиная кровь издаетъ крѣпкій запахъ лошадиного по́па или сухаго лошадиного навоза.

5. Овечья кровь издаетъ сильный запахъ сырой, еще невываренной овечьей шерсти.

6. Ягнячей крови запахъ подобенъ запаху крови овечьей, только смѣшанный съ сильнымъ козьимъ запахомъ.

7. Собачья кровь издаетъ запахъ испарины сихъ животныхъ.

8. Свиная кровь имѣетъ непріятный запахъ свиного хлѣва.

9. Кровь крысъ издаетъ непріятный запахъ, свойственный крысамъ.

Равнымъ образомъ кровь разныхъ птицъ: куръ, индѣекъ, утокъ и голубей имѣетъ особый запахъ. Недавно дѣлать я опыты надъ кровью лягушекъ и замѣтилъ весьма чувствительный, запахъ болотнаго проспѣника (jongs stagsegeux); а кровь карпа изда-

нала запахъ, подобный запаху слизи, покрывающей плѣю рѣчныхъ рыбъ.

Нужно было изслѣдовать, можно ли открыть пахучее начало крови въ кровавыхъ пятнахъ, оставшихся на бѣлѣ и высохшихъ, и я увѣрился чрезъ непосредственные опыты, что даже послѣ двухъ недѣль можно узнать, какою кровію сдѣлано пятно, только бы оно было достающій величины. Для сего нужно вырѣзать кусочекъ бѣлы, замазанный кровью, положить его въ часовое стекло, налить на него немного воды и оставить на короткое время въ покой; когда пятно довольно размокнетъ, то налить на него крѣпкой сѣрной кислоты, мѣшать стекляною палочкою и нюхать исходящій изъ него запахъ. Но можно ли опредѣлить родъ крови позже сказаннаго времени, я не знаю. Посему въ сомнительныхъ случаяхъ, при обвиненіи въ убійствѣ, совѣшую я изслѣдывать сказаннымъ способомъ кровавые пятна, находящіяся на платкѣ. Можетъ быть чрезъ еіе удастся открыть родъ крови.

По моему мнѣнію, для Врачей и Аптекарей, какъ людей, занимающихся Судбно-Медицинскими изслѣдованіями, весьма важно воспользоваться моимъ опытомъ, дабы познакомиться

съ разными запахами крови; ибо хотя пахучее начало крови споль сильно, что, однажды понюхавъ его, не лѣзя уже забыть, а запаха человеческой крови, кажется, невозможно смѣшавъ съ запахомъ крови другихъ животныхъ, — однако нужно чрезъ предварительные опыты научиться различать сіи запахи. Таковыя изслѣдованія часно могутъ быть весьма полезны при обвиненіи въ убійствѣ, въ случаѣ дѣйствительнаго или подозрѣваемаго Nothzucht, а особливо при ложномъ обвиненіи въ лишеніи дѣвства.

Notizen von Frierer. Bd XXIV. стр. 177.

Вышепредложенный способъ различанья человеческую кровь отъ крови другихъ животныхъ употребленъ уже въ Парижѣ при одномъ Судебно - Медицинскомъ изслѣдованіи. Одинъ мясникъ, по имени *Белланъ*, обвиняемъ былъ въ убійствѣ своей жены. Въ числѣ доказательствъ была окровавленная мужская рубашка, найденная въ дѣшской поспелѣ. *Белланъ* показалъ, что это кровь свиньи, убитой имъ за двѣ предъ шѣмъ недѣли. Рубашка сія была отдана для изслѣдованія

Коммисія, составленной изъ Химиковъ. Г. Бар-  
рюель объявилъ, что это была кровь не  
свиньи, а человѣка, и Коммисія единогласно  
подтвердила его мнѣніе; только не рѣшила,  
была ли это кровь мужчины или женщины.

Тамъ же, стр. 320.





## VII.

### О ПОСОВІИ МНИМОУМЕРЩИМЪ.

Г. *Лероа д'Этоаль* представилъ Парижской Королевской Академіи сочиненіе касательно опасности вдвухъ воздухъ въ легкія утопшихъ или обмершихъ. Гг. *Мажанди* и *Дюжериль*, разсматривавшіе сіе сочиненіе, въ началѣ замѣчаютъ, что они по причинѣ большой важности предмета сами повѣряли опыты Г-на *д'Этоаля* съ величайшею точностію.

Мы сперва упомянемъ объ опытахъ Г-на *Лероа д'Этоаля*. У многихъ животныхъ, напри: у овецъ, кроликовъ, козъ, лисицъ и проч. нѣсколько сильное вдуханіе воздуха въ легкія можетъ мгновенно причинить смерть. Другія животныя, напри: собаки, переносятъ пакое сильное надуханіе легкихъ; однако у нихъ нѣсколько времени послѣ того оспасающа одышка и они бываютъ нѣсколько

дней болѣе или менѣе нездоровы, но наконецъ совсѣмъ поправляются. Сіи показанія совершенно справедливы и сказанные Члены Академіи сами видѣли всѣ явленія, описанныя сочинителемъ.

Человѣкъ, касательно вдуванія воздуха въ легкія, находится ли въ одномъ отдѣленіи съ овцами, кроликами и проч. или съ собаками, т. е., что вдуваніе сіе менѣе для него опасно? Вопроса сего аргументы рѣшить нельзя, а Комисія, какъ удобополучно, не могла дѣлать опытовъ для сего намѣренія; только одно, никакому сомнѣнію неподверженное обстоятельство, по видимому, доказываетъ опасность вдуванія воздуха. Одинъ мужъ, шунія съ своею женою, вздумалъ вдувать ей въ ротъ воздухъ, закрывъ прищипомъ ей носъ. Мгновенно воспослѣдовало болѣзненное чувство задушенія, которое продолжалось нѣсколько дней и привело виновника онаго, который увѣрялъ, что сдѣлалъ это совершенно безъ всякаго умысла, въ большое безпокойство.

Не имѣя случая сдѣлать таковыя опыты надъ живыми людьми, Комисія старалась узнать, не можно ли произвести въ трутѣ человеческомъ нѣхъ явленій, какія примѣча-

ющися въ живошныхъ. И въ самомъ дѣлѣ, она нѣсколько разъ нашла, что если, вскрывъ дышапельное горло, вдувать воздухъ посредствомъ вложенной въ оное трубки, то въ шрупахъ взрослыхъ и пожилыхъ людей оказывается разрывъ существа легкихъ и выступленіе воздуха между оболочкою легкихъ и подреберною плевою. Посему вѣролпно, что вдуваніе воздуха живому челоуку мгновенно можетъ причинить смерть.

Для возбужденія дыханія у младенцовъ, рожденныхъ въ состояніи омертвѣнія, совѣшуютъ вдувать имъ въ легкія воздухъ, для чего изобрѣшены разныя трубки. Само собою явствуетъ, сколь важно опредѣлить прежде, какое вліяніе на младенца имѣетъ вдуваніе воздуха въ его легкія. Посему Члены Коммисіи дѣлами шакowymi опыты надъ шѣлами младенцовъ мертворожденныхъ и шакыхъ, копорые жили нѣсколько часовъ, и нашли, что воздухъ, вдуваемый въ ихъ легкія съ большою силою, не выпускаетъ въ полосны подреберной плевы. Только мѣстами выступало нѣсколько пузырьковъ подъ оболочкою легкихъ. Сіе различіе слѣдствій, кажется, можно объяснить тѣмъ, что

легкія младенца, подобно легкимъ собакамъ, окаязываютъ доспапочное сопротивленіе и не разрываются отъ вдуванія воздуха.

Изъ того однако, что иногда подъ оболочкою легкихъ находится скопленіе воздуха, не лзя еще заключать, что вдуваніе воздуха новорожденнымъ младенцамъ совершенно безопасно.

Что касается до взрослыхъ, то опыты надъ трупами и живошными, также наблюденія надъ живымъ человекомъ, кажутся, показывающъ, что вдуваніе воздуха безъ надлежащей оспорожности можетъ причинить смерть.

Коммисія однако не почиаетъ вдуванія воздуха бесполезнымъ при оживленіи минимюмершихъ. Средство сіе съ самыхъ давнихъ временъ унопреляемо было съ величайшимъ успѣхомъ; только спрашивается, какимъ способомъ его унопрелятъ? Если вдуваніе производилъ шихо, посредствомъ рта или искусною рукою помощію инструмента, то безъ сомнѣнія оно есть одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ, унопреляемыхъ для оживленія обмершихъ; но если воздухъ вдувають въ легкія съ большою силою, какъ то

предписываютъ *Дегранжъ*, *Монро* и *Джон-  
сонъ*, что сіе само по себѣ превосходное сред-  
ство можетъ имѣть худыя послѣдствія. Для  
оправленія сего нужно знать опасности, со-  
пряженныя съ сильнымъ вдуваніемъ. Въ семъ  
отношеніи находишься уже большая разность  
между вдуваніемъ посредствомъ рпа и посред-  
ствомъ трубочки, вкладываемой въ дыхатель-  
ное горло и соединенной съ раздувательнымъ  
мѣхомъ или сгущающимъ насосомъ. Въ по-  
слѣднемъ случаѣ, какъ undoubtedly, легко  
могутъ разорваться легкія и мнимая смерть  
превратиться въ истинную.

Между тѣмъ всѣ совѣтуютъ и дѣлаютъ  
вдуваніе посредствомъ раздувательнаго мѣха.  
Большая часть писателей, дающихъ такую  
совѣтъ, не знаютъ опасности, съ тѣмъ со-  
пряженной, а только имѣютъ въ виду выгоды,  
зависящія отъ чистаго воздуха. Посему раз-  
дувательные мѣхи находятся теперь въ числѣ  
инструментовъ, хранящихся въ заведеніяхъ  
для оживленія обмершихъ. Но съ тѣхъ поръ,  
какъ принято сіе средство, старанія объ  
оживленіи утопшихъ, кажется, гораздо рѣже  
бываютъ успѣшны. По крайней мѣрѣ въ Па-  
рижѣ это замѣчено. Изъ представленнаго

Полицією извѣстія видно, что съ 1820-го по 1826-й годъ въ Парижѣ выпущено изъ воды 1,835 человекъ, изъ коихъ только 368-ми подана была врачебная помощь, и изъ нихъ оживлено только 283. Напрошивъ того съ 1772-го по 1778-й годъ Парижскій Schöppe Nia, который не только учредилъ въ Парижѣ заведенія для спасенія утопшихъ, но и самъ заведывалъ ими, изъ 934 утопшихъ и обмершихъ, коимъ подана была помощь, 813 возвращены къ жизни, посему спасено  $\frac{3}{4}$ ; а теперь, какъ видно изъ оффеціальныхъ извѣстій, спасаютъ только  $\frac{2}{3}$ , помощь же подають только восьмой часни.

Представленные извѣстія показываютъ, что вдуханіе воздуха въ легкія такимъ образомъ, какъ то производился съ нѣкопорого времени, не увеличило дѣйствительности средствъ, употребляемыхъ для оживленія обмершихъ; даже не безъ основательности можно подозрѣвать, что оно произвело противоположное дѣйствіе.

Для положительнаго опредѣленія сравнительной пользы пособій, употребляемыхъ для оживленія обмершихъ, нужно съ одной стороны, чтобы Полиція собирала подробныя свѣдѣнія о состояніи утопшихъ или обмершихъ,

и припомъ въ то время, когда имъ подають помощь, а съ другой спороны, чпобы лица, подающія помощь, представляли опченъ о средспвахъ, ими употребленныхъ и объ успѣхъ оныхъ. Когда таковыя опчены, по примѣру обзорнѣй Nia, будупъ печатаемы и публикуемы, то по испеченіи нѣсколькихъ лѣтъ можно будетъ судить о пользѣ разныхъ средспвъ, употребляемыхъ для оживленія обмершихъ.

Послѣ сего Коммисія разсмаприваетъ средства, помощію коихъ Г. Лероа д'Этоаль жслаетъ отвратить опасность, сопряженную со вдуваніемъ воздуха. Онъ почитаетъ нужнымъ употреблять мѣхи съ клапанами (souffrete de hauteur), которые неблагоразумно оставлены, опредѣляетъ количествъ воздуха для вдуванія, соопвѣтствующее пространству груди, и наконецъ онъ присоединилъ къ своему мѣху посредспвомъ особливаго механизма приборъ для согрѣванія.

Принявъ въ уваженіе, что при жизни грудь и легкія находяпся въ дѣятельности, Г. Лероа д'Этоаль вздумалъ возбудить движенія грудобрюшной прѣграды посредспвомъ гальванизма, направляемаго къ ней иглами.

Успѣхъ соотвѣтствовалъ его желанію, и Члены Комисіи сами видѣли дыханіе, симъ способомъ возбужденное у живошныхъ упопленныхъ, были ли они только мнимо или совершенно мерпвы. Если живошное оспавалось подѣ водою недолго, напрім: минутъ пять, то Часно оно опашь оживало.

Слѣдуетъ ли это приписать дѣйствию галванизма? Коммисія утверждаеть сего не смѣетъ: поелику по испеченіи такого же времени и при такихъ же обсподельспвахъ упопленные живошныя оживали и безѣ упопребленія какихъ бы то ни было средствъ.

Какъ бы ни было дѣспвиительно вліаніе галванизма на грудобрюшную преграду, однако средство сіе не можетъ принадлежать къ тѣмъ, копорыя можно упопребить въ обыкновенныхъ случаяхъ: поелику приготовленіе сего прибора сопряжено съ поперею времени. Посему сочинитель предлагаеть спспѣшествованъ входенію воздуха въ легкія проспѣйшимъ способомъ, а именно, чрезѣ перемѣнное сжатіе брюха и груди.

Что такое давленіе дѣспвиительно спспѣшествоуетъ входенію воздуха въ легкія и выходенію изѣ оныхъ, въ помѣ можно



удостовериться слѣдующимъ опытомъ. Нужно вложить въ дыхательное горло прута согнутую стеклянную трубку, коюрой наружный конецъ опущенъ въ сосудъ съ водою и укрѣпить. Жидкость въ трубкѣ поднимается и опускается въ слѣдствіе движеній груди и брюха, производимыхъ сжиманіемъ ихъ съ перемежками. Способъ сей давно уже предложенъ и былъ употребленъ съ пользою, но послѣ совсѣмъ оставленъ.

Notizen von Froriep. Bd. XXIV. стр. 235.

---

## VIII.

ОФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1<sup>го</sup>  
МАІЯ ПО 1<sup>е</sup> Іюля 1830<sup>го</sup> ГОДА.

---

### 1. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ на высшія мѣста.*

*Дивизионными Докторами:* въ 4-й резервный Кавалерійскій Корпусъ Старшій Медикъ 1-й Драгунской Дивизіи Докторъ Надворный Совѣтникъ Фауспманъ, и въ 6-ю пѣхотную Дивизію состоящій при Генералъ - Штабъ Докторъ 2-й арміи Докторъ Медицины Надворный Совѣтникъ Гелингъ. *Старшими Медиками:* во 2-ю Гусарскую Дивизію Ординапоръ Херсонскаго военнаго госпиталѣ Штабъ-Лекаръ Надворный Совѣтникъ Шафрановскій, въ 1-ю Драгунскую Дивизію Штабъ-Лекаръ Конно - Артиллерійской N 3-го роты Коллежскій Ассесоръ Сорокинъ и въ 1-ю Конно-Егерскую Дивизію Старшій Лекаръ 11-й Артиллерійской Бригады Штабъ-Лекаръ Надвор-

ный Совѣтникъ Лазаревичъ. *Старшими Лекарями*: въ Тифлисскій пѣхотный полкъ Ординапоръ Ереванскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Ростопоровскій, въ Омскій военный госпиталь Шпабъ - Лекаръ Тобольскихъ Эшапныхъ командъ Воскресенскій, въ Ахалцыхскій военновременный госпиталь Шпабъ - Лекаръ Спародубовскаго Кирасирскаго полка Надежный, въ Гумринскій военновременный госпиталь состоящій въ Отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ сверхъ комплекта Шпабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Свишко, въ Спарошемахинское госпитальное отдѣленіе Шпабъ - Лекаръ Апшеронскаго пѣхотнаго полка Соловьевъ, въ Елисаветпольское госпитальное отдѣленіе состоящій при Карскомъ военновременномъ госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Рейнваль, въ Спрѣльнинскій военный лазаретъ Младшій Лекаръ Лейбъ-Гвардіи Кирасирскаго полка Шпабъ - Лекаръ Бобриковъ, въ Московскій пѣхотный полкъ Ординапоръ Купайскаго военнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Барыщевъ, въ пѣхотный Фельдмаршала Графа фонъ-деръ-Оспенъ-Сакена полкъ Шпабъ - Лекаръ Конно - Артиллерійской № 29-го роты Негодяевъ, въ 18-й Егерскій

полкъ соспояцій во 2-й арміи сверхъ комплекта Штабъ - Лекаръ Беръ, въ Муромскій пѣхотный полкъ опредѣленный во 2-ю армію сверхъ комплекта Штабъ - Лекаръ Ягодинскій, въ Нижегородскій пѣхотный полкъ соспояцій во 2-й арміи сверхъ комплекта Докторъ Медицины Белоусовичъ, въ Казанскій пѣхотный полкъ Младшій Лекаръ 51-го Егерскаго полка Трухановъ, въ Днѣпровскій пѣхотный полкъ Докторъ Медицины онаго же полка Чайковскій, въ 38-й Егерскій полкъ Младшій Лекаръ Днѣпровскаго пѣхотнаго полка Штабъ - Лекаръ Поповъ, въ Украинскій пѣхотный полкъ Штабъ - Лекаръ онаго же полка Погорельцовъ, въ Александровскій Кадетскій Корпусъ Ординаторъ Ораніенбаумскаго военного госпиталя Штабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Циммерманъ, въ пѣхотный Герцога Веллингтона полкъ Ахтырскаго Гусарскаго полка Докторъ Медицины Пеперсенъ, въ Ахтырскій Гусарскій полкъ Младшій Лекаръ Александрійскаго Гусарскаго полка Штабъ - Лекаръ Гриневичъ, въ 17-й Егерскій полкъ Штабъ - Лекаръ онаго полка Шаровъ, въ Полшавскій пѣхотный полкъ Штабъ - Лекаръ пѣхотнаго Графа Дибича-Забалканскаго полка Ханенко, въ Алексопольскій

пѣхотный полкъ опредѣленный во 2-ю армію  
сверхъ комплекта Докторъ Медицины Томасть,  
въ 22-й Егерскій полкъ Штабъ-Лекаръ 9-й  
Артиллерійской Бригады Томашевскій, въ 4-й  
Саперный баталіонъ Штабъ-Лекаръ онаго ба-  
таліона Христіановъ и въ 11-ю Артиллерій-  
скую Бригаду опредѣленный во 2-ю армію  
сверхъ комплекта Штабъ-Лекаръ Садовскій.

## 2. *Вновь поступившіе въ службу.*

*Изъ Императорской Медико-Хи-  
рургической Академіи* Лекаръ Пелехинъ въ Ар-  
тиллерійскій госпиталь Ординапоромъ. *Изъ*  
*Гражданскаго вѣдомства* Докторъ Медицины  
Анпонтъ Пыцулевичъ во 2-й Кадетскій Корпусъ.  
*Изъ отставныхъ* Штабъ-Лекаръ Эдуардъ Финке  
въ 1-й Учебный Карабинерный полкъ Стар-  
шимъ Лекаремъ. *Изъ вольнопрактикующихъ*  
Лекари: Ипполитъ Шимборскій въ Казанскій  
Драгунскій полкъ Младшимъ Лекаремъ и  
Іоганъ Гофманъ въ С. Петербургскій военно-  
окупоупный госпиталь Ординапоромъ.

## 3. *Увольненіе отъ службы.*

Ординапоръ Московскаго военнаго госпи-  
таля Дѣйствиельный Спасскій Совѣтникъ

Зубовъ съ мундиромъ и пенсіономъ по 1500 руб. въ годъ, Докпоръ 2-го Кадетскаго Корпуса Спашскій Совѣтникъ Мерцъ съ мундиромъ и пенсіономъ по 750 руб. въ годъ, Дивизионный Докпоръ 4-го резервнаго Кавалерійскаго Корпуса Шпабъ-Лекаръ Коллежскій Совѣтникъ Римаревскій и Спаршій Лекаръ Глуховскаго Кирасирскаго полка Шпабъ-Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Вейзбахъ съ мундирами, Спаршій Лекаръ пѣхотнаго Генераль-Фельдмаршала Графа фонъ деръ Остенъ-Сакена полка Шпабъ-Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Георгіевскій, Спаршій Ветеринарный Лекаръ 3-й Кирасирской поселенной Дивизіи Мержевишиновъ и Шпабъ-Лекаръ 3-го баталіона 17-го Егерскаго полка Волченецкій. *Перемѣщенъ въ Гражданское вѣдомство* Шпабъ-Лекаръ Орденскаго Кирасирскаго полка Дыздаревъ.

#### 4. Производство въ чины.

За выслугу лѣтъ произведены въ *Надворные Совѣтники* Коллежскіе Ассесоры: Корпусный Докпоръ 3-го резервнаго поселеннаго Кавалерійскаго Корпуса Шпабъ-Лекаръ Пропоповъ, Спаршій Лекаръ 2-го Учебнаго Карабинернаго полка Шпабъ-Лекаръ Бирпъ,

Дивизионный Докторъ 2-й Уланской Дивизіи  
 Штабъ - Лекаръ Плевещій, Старшій Лекаръ  
 Чугуевского военного госпиталя Штабъ - Лекаръ  
 Корицкій, Ординапоръ Выборгскаго военного  
 госпиталя Штабъ - Лекаръ Ждановъ, Ордина-  
 поръ Артиллерійскаго госпиталя Штабъ - Ле-  
 каръ Рачинскій. *Въ Коллежскіе Ассесоры*  
 Штабъ - Лекари: 2-го Бугскаго Уланскаго полка  
 Андрущенко, Кіевскаго Гренадерскаго полка  
 Мадяревскій, Старшій Лекаръ 3-го Бугскаго  
 Уланскаго полка Пешрушевскій, Старшій Ле-  
 каръ Бѣлгородскаго Уланскаго полка Черняв-  
 скій, Старшій Лекаръ 45-го Егерьскаго полка  
 Ярошевскій, Старшій Лекаръ Нашебургскаго  
 пѣхотнаго полка Миргородскій, Старшій Ле-  
 каръ Тифлисскаго пѣхотнаго полка Ростопо-  
 ровскій, Старшій Лекаръ Херсонскаго Грена-  
 дерскаго полка Явленскій, Старшій Лекаръ  
 13-й Артиллерійской Бригады Сербія, 24-го  
 Егерьскаго полка Робертъ, Старшій Лекаръ,  
 Полоцкаго пѣхотнаго полка Якоповичъ, Ор-  
 динапоръ Херсонскаго военного госпиталя  
 Миллеръ, Ординапоръ Ревельскаго военного  
 госпиталя Штробель и Ординапоръ Москов-  
 скаго военного госпиталя Обошинскій. *Въ 9-й*  
*классъ:* Ветеринарный Лекаръ Новоалександров-

скаго военно-конскаго завода 10-го класса Дьяковъ. Въ 10-й классъ: Ветеринарные Помощники 1-го отдѣленія Губернскіе Секретари: Починковскаго военно-конскаго завода Соболевъ и Варзинъ, а состоящій во 2-й арміи сверхъ комплекта Докторъ Медицины Тихоновичъ за выслугу имъ въ семь званій 5-пи лѣтъ утвержденъ Правительствующимъ Сенатомъ въ чинъ *Надворнаго Совѣтника*.

##### 5. Н а г р а д ы.

За отличную-усердную службу Всѣмъ нижеслѣдующимъ награждены *чинами Статскаго Совѣтника*: Дивизионный Докторъ 5-го резервнаго Кавалерійскаго Корпуса Коллежскій Совѣтникъ Шольцъ, Старшій Докторъ Динабургскаго военнаго госпиталя Штабъ-Лекаръ Коллежскій Совѣтникъ Адамовичъ, Дивизионный Докторъ 9-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Совѣтникъ Баомановъ; - *Коллежскаго Совѣтника* Старшій Докторъ Гвардейской пѣхоты Докторъ Медицины Надворный Совѣтникъ Нагумовичъ; *Надворнаго Совѣтника*: Ординарторъ Артиллерійскаго госпиталя Штабъ-Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Косовичъ, Старшій Медикъ 4-й Гусарской Дивизіи Штабъ-Лекаръ



Коллежскій Ассесоръ Наумовъ , Главный Хи-  
 рургъ 2-й арміи Коллежскій Ассесоръ Анерптъ;  
*Коллежскаго Ассесора Шпабъ* - Лекари : Стар-  
 шій Лекарь Арзамасскаго Конно - Егерьскаго  
 полка Чикаревскій, Артиллерійскихъ Бригадъ:  
 1-й Дагаевъ и 2-й Совѣшовъ, Конно-Артилле-  
 рійской N 15-го роты Бапаровскій, Старшій  
 Лекарь Тамбовскаго пѣхотнаго полка Черно-  
 баевъ, Старшій Лекарь Московскаго Драгу-  
 нскаго полка Ананскій, Младшій Лекарь 34-го  
 Егерьскаго полка Пальцевъ, 3-го резервнаго  
 Салернаго баталіона Мерцаловъ, Старшій Ле-  
 карь Волынскаго Уланскаго полка Сѣпинскій;  
 Конно - Артиллерійской N 32-го роты Мала-  
 ревскій, Старшій Лекарь 48-го Егерьскаго  
 полка Коопровъ, Минскаго пѣхотнаго полка  
 Гакенъ, Ординапоръ Виленскаго военнаго гос-  
 питаля Докпоръ Медицины Симони, Шпабъ-  
 Лекари Ординапоры госпиталей: С. Петер-  
 бургскаго Чарный, округа военнаго поселенія  
 Глуховскаго Кирасирскаго полка Клевановъ,  
 Бѣгородскаго Уланскаго полка Никипинъ,  
 Архангельскаго военнаго госпиталя Тихоми-  
 ровъ, пѣхотнаго Графа Дибича-Забалканскаго  
 полка Никольскій, Троицкаго пѣхотнаго полка  
 Ордынскій, Кременчугскаго пѣхотнаго полка

Скрыпчинскій, Старшій Лекаръ 36-го Егерскаго полка Вельяминовскій, 10-й Артиллерійской Бригады Ефибовскій, Бѣлозерскаго пѣхотнаго полка Воскресенскій и Исправляющій должностъ Дивизионнаго Доктора 6-й пѣхотной Дивизіи Болховскій; *званіемъ Штабъ-Лекаря* Младшій Лекаръ Павлоградскаго Гусарскаго полка Григорьевъ. *Кавалерами орденовъ: Св. Владимира 4-й степени:* полковый Штабъ-Лекаръ Лейбъ - Гвардіи Гусарскаго полка Коллежскій Ассесоръ Ведринскій, Старшій Лекаръ Каварискаго военновременнаго госпиталя Штабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Наврошскій, Ординаторъ онаго госпиталя Штабъ-Лекаръ Теласковъ, Старшій Лекаръ Бабадагскаго военновременнаго госпиталя Штабъ-Лекаръ Пошоржинскій, Старшій Лекаръ Гирсовскаго военновременнаго госпиталя Штабъ-Лекаръ Надворный Совѣтникъ Шпрольманъ, состоящій при Полевомъ Генералъ-Штабъ-Докторъ 2-й арміи Докторъ Медицины Надворный Совѣтникъ Геллингъ, Младшій Лекаръ Сапернаго баталіона Намайловскій, Старшій Лекаръ Елисаветградскаго Гусарскаго полка Штабъ - Лекаръ Агафоновъ, Лекаръ Варнскаго военновременнаго госпиталя N 2-го Штабъ - Лекаръ Корсакъ,

Шпабъ - Лекаръ 5-й Артиллерійской Бригады Коллежскій Ассесоръ Сергіевскій, Ординапоръ Московскаго военнаго госпиталя Шпабъ-Лекаръ Обоининскій, Старшій Лекаръ Ораніенбаумскаго военнаго госпиталя Шпабъ - Лекаръ Спапскій. Совѣшникъ Алеръ и Старшій Лекаръ Павловскаго Кадетскаго Корпуса Шпабъ - Лекаръ Надворный Совѣшникъ Принцъ; *Св. Анны 2-й степени, Императорскою Короною украшеннымъ*: Старшій Докпоръ Гвардейской Кавалеріи Коллежскій Совѣшникъ Погоржанскій, Старшій Медицинскій Чиновникъ Пажескаго Корпуса Спапскій Совѣшникъ Бурмейсперъ, полковые Шпабъ-Лекари Лейбъ-Гвардіи полковъ: Коннаго Коллежскій Совѣшникъ Габберзангъ, Козачьяго Коллежскій Совѣшникъ Александровъ, Преображенскаго Надворный Совѣшникъ Менцъ и Семеновскаго Шпабъ - Лекаръ Надворный Совѣшникъ Гулькевичъ; *Св. Анны 2-й степени*: Дивизионный Докпоръ 8-й пѣхотной Дивизіи Шпабъ - Лекаръ Надворный Совѣшникъ Фирсовъ, Ординапоръ Херсонскаго военнаго госпиталя Шпабъ - Лекаръ Слеблинскій, Шпабъ-Лекаръ 7-й Артиллерійской Бригады Надворный Совѣшникъ Гласовъ; *того же ордена 3-й степени*: баталіонные Лекари Лейбъ-

Гвардіи полковъ: Преображенскаго Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Дьяконенко, Павловскаго Шпабъ - Лекарь Похвалинскій, Семёновскаго Шпабъ - Лекарь Нечаевскій, Московскаго Лекарь Кіиновскій, Ординашоры Тульчинскаго военнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекари Гильдебрандтъ и Поповъ, Лейбъ - Гвардіи Конно - Піонернаго Эскадрона Шпабъ - Лекарь Торяниковъ, Ординашоры Варнскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекари Адамовъ, Прокофьевъ и Лекарь Запворницкій, Ординашоры Каварнскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Веніаминовъ и Шульцъ, Ординашоръ Бабадагскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Панскій, Ординашоры Бальчикскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Александровъ и Коршъ, Ординашоръ Гирсовскаго военновременнаго госпиталѣ Лекарь Дорошевичъ, состоящій при лазаретѣ Софійскаго пѣхотнаго полка Лекарь Стефановскій, Ординашоръ Проводскаго военновременнаго госпиталѣ Лекарь Лидке, Ординашоръ Кюспенджійскаго военновременнаго госпиталѣ Лекарь Шрейберъ, Ординашоръ Каменецъ - Подольскаго военнаго госпиталѣ Шпабъ - Лекарь Коллежскій Ассесоръ Навропскій, Стѣвскаго

пѣхотнаго полка Шпабъ-Лекаръ Михайловскій,  
 Шпабъ-Лекаръ 19-й Артиллерійской Бригады  
 Серединскій, Лекаръ 3-го Сапернаго баталіона  
 Миклашевскій, пѣхотнаго Графа Дибича-За-  
 балканскаго полка Шпабъ-Лекаръ Ханенко,  
 Младшій Лекаръ Нарвскаго пѣхотнаго полка  
 прикомандированный къ Шпабу 3-го пѣхот-  
 наго Корпуса Крейцеръ, Тамбовскаго пѣхот-  
 наго полка Лекаръ Лоскушовъ, Шпабъ-Лекаръ  
 17-го Егерскаго полка Шаровъ, Шпабъ-Лекаръ  
 9-й Артиллерійской Бригады Тимошевскій,  
 Шпабъ-Лекаръ 6-й Артиллерійской Бригады  
 Боровскій, Гусарскаго Эрцъ-Герцога Фердинан-  
 да полка Шпабъ-Лекаръ Лебедевичъ-Дравскій,  
 Шпабъ-Лекаръ Шлиесельбургскаго пѣхотнаго  
 полка Маевскій, Медико-Хирургъ Коспромскаго  
 пѣхотнаго полка Гржималла, Старшій Лекаръ  
 Олонецкаго пѣхотнаго полка Рудневъ, Шпабъ-  
 Лекаръ Полоцкаго пѣхотнаго полка Коллежскій  
 Ассесоръ Якоповичъ, Старшій Лекаръ 20-го  
 Егерскаго полка Шпабъ-Лекаръ Оспромыс-  
 ленскій, Дивизионный Докторъ 9-й пѣхотной  
 Дивизіи Шпабъ-Лекаръ Коллежскій Ассесоръ  
 Булгаковъ, Лекари Варнскаго военновременнаго  
 госпиталя N 1-го Крапъ и Фолкмаръ, Шпабъ-  
 Лекаръ Варнскаго военновременнаго госпиталя

№ 2-го Миллеръ, Младшій Лекаръ 6-й Артил-  
 лерійской Бригады Карловичъ, Младшій Лекаръ  
 1-го Кадетскаго Корпуса Шшабъ - Лекаръ На-  
 дворный Совѣтникъ Тукмачевъ. *Денежныя*  
*награжденіемъ* единовременно : Ординапоры  
 С. Петербургскаго военносухопутнаго госпи-  
 тала Шшабъ - Лекаръ Спальскій, Совѣтникъ  
 Албрехтъ 750 руб. и Шшабъ - Лекаръ Зауеръ  
 350 руб., Шшабъ-Лекаръ Школы Гвардейскихъ  
 Подпрапорщиковъ и Юнкеровъ Коллежскій  
 Ассесоръ Гассовскій 800 руб., Ординапоры  
 Артиллерійскаго госпиталя : Шшабъ - Лекаръ  
 Коллежскій Ассесоръ Богушевичъ 800 руб.,  
 Шшабъ - Лекаръ Бурмейстеръ 350 руб. и  
 Шшабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Орловъ  
 300 руб., Лейбъ - Гвардіи Преображенскаго  
 полка Лекаръ Булахъ, Лейбъ - Гвардіи Семе-  
 новскаго полка Лекаръ Кондроповъ, Лейбъ-  
 Гвардіи Измайловскаго полка Лекаръ Дворжакъ,  
 Лейбъ-Гвардіи Егерьскаго полка Лекаръ Дубля-  
 нскій и Лейбъ - Гвардіи Финляндскаго полка  
 Лекаръ Руфиновъ, каждый по 300 руб., Лейбъ-  
 Гвардіи Павловскаго полка Докпоръ Медицины  
 8-го класса Тихомировъ 400 руб., Лейбъ-Гвар-  
 діи Коннаго полка Лекаръ Кабанъ 300 руб.,  
 Лейбъ - Гвардіи Гренадерскаго полка Лекаръ

Яроцкій 400 руб., Кіевскаго Гусарскаго полка  
 Шпабъ-Лекаръ Бобровницкій 700 руб., полко-  
 вый Шпабъ-Лекаръ Лейбъ-Гвардіи Драгунскаго  
 полка Докторъ Медицины и Хирургіи 7-го  
 класса Грумма 750 руб., онаго же полка Вете-  
 ринарный Лекаръ Мозель 500 руб., Ордина-  
 торъ Тульчинскаго военного госпиталѣ Лекаръ  
 Поцолоевскій 500 руб., Лейбъ - Гвардіи Гусар-  
 скаго полка Лекаръ Спиралковскій 600 руб.,  
 Шпабъ-Лекаръ 3-й Гренадерской Армиленерій-  
 ской Бригады Арпюховскій 700 руб., Младшій  
 Лекаръ Липовскаго Уланскаго полка Докторъ  
 Медицины Опшо 700 руб., Ветеринарный  
 Лекаръ Волинскаго Уланскаго полка Христіа-  
 ниновъ 600 руб., Дивизионный Докторъ 24-й  
 пѣхотной Дивизіи Шпабъ - Лекаръ Сталпскій  
 Совѣтникъ Дроссардъ 1500 руб., Бѣлоспок-  
 скаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лекаръ Коллеж-  
 скій Ассесоръ Нельговскій 800 руб., онаго же  
 полка Шпабъ - Лекаръ Беніевскій 700 руб.,  
 Младшіе Лекари Липовскаго пѣхотнаго полка  
 Шпабъ-Лекаръ Дзвонковскій 700 руб., Лекаръ  
 Квяшковскій 600 руб., Младшій Лекаръ 47-го  
 Егерьскаго полка Докторъ Медицины Ходоров-  
 скій 700 руб., Ординаторъ Гродненскаго воен-  
 наго госпиталѣ Лекаръ Савицкій 600 руб.,

Старшій Лekarь Вольнскаго пѣхотнаго полка  
 Штабъ - Лekarь Коллежскій Ассесоръ Лавровъ  
 800 руб., , Ординапоръ Олыкского военного  
 госпиталя Штабъ - Лekarь Герасимовичъ 700  
 руб., 11-го Егерскаго полка Лekarь Никишинъ  
 600 руб., Ординапоръ Артиллерійскаго госпи-  
 таля Штабъ - Лekarь Коллежскій Ассесоръ  
 Рачинскій, Старшій Лekarь Кишиневскаго  
 военновременнаго госпиталя Штабъ - Лekarь  
 Коллежскій Ассесоръ Неждановъ, Старшій  
 Лekarь Динабургскаго военного госпиталя  
 Штабъ - Лekarь Коллежскій Ассесоръ Лосіев-  
 скій, Ординапоръ Ораніенбаумскаго военного  
 госпиталя Штабъ - Лekarь Коллежскій Ассесоръ  
 Циммерманъ, Ординапоръ Кіевскаго военного  
 госпиталя Штабъ - Лekarь Коллежскій Ассесоръ  
 Беллертъ, 800 руб. каждый, Старшій Докпоръ  
 Ораніенбаумскаго военного госпиталя Надвор-  
 ный Совѣтникъ Шерингъ, Старшій Лekarь  
 Бобрыйскаго военного госпиталя Надворный  
 Совѣтникъ Заровный и Ординапоръ Ораніен-  
 баумскаго военного госпиталя Штабъ - Лekarь  
 Надворный Совѣтникъ Апельсиновъ, 900 руб.  
 каждый, Ординапоръ Рижскаго военного гос-  
 питаля Штабъ - Лekarь Спашскій Совѣтникъ  
 Крейцеръ 1500 руб., Ординапоръ Динабургскаго



военнаго госпиталѣ Штабъ-Лекаръ Симковскій, Ординапоръ онаго же госпиталѣ Докпоръ Медицины Война-Куринскій, Ординапоръ Московскаго военнаго госпиталѣ Штабъ - Лекаръ Ловцовъ и Ординапоръ Артиллерійскаго госпиталѣ Штабъ - Лекаръ Присняковъ, 700 руб. каждый, Ординапоръ Севастопольскаго военнаго госпиталѣ Штабъ-Лекаръ Филиповъ 600 руб., Старшій Докпоръ Бобруйскаго военнаго госпиталѣ Штабъ-Лекаръ Коллежскій Совѣтникъ Глинскій 1200 руб., Младшій Лекаръ 1-го Кадетскаго Корпуса Коллежскій Ассесоръ Адлунгъ 800 руб., Младшій Лекаръ Павловскаго Кадетскаго Корпуса Штабъ - Лекаръ Вороновъ 350 руб., Старшій Лекаръ Московскаго Кадетскаго Корпуса Коллежскій Совѣтникъ Дубецкій 1200 руб. *Подарками:* Старшій Лекаръ Спирьлинскаго военнаго лазарета Штабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Друзьякинъ, Штабъ - Лекаръ Новоингерманландскаго пѣхотнаго полка Ивановъ, 1-го Егерьскаго полка Штабъ-Лекаръ Спреха, 5-го Егерьскаго полка Штабъ-Лекаръ Рожественскій, Дивизионный Докпоръ 15-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Ассесоръ Свобода, Штабъ-Лекари: Суздальскаго пѣхотнаго полка Голицинскій, Рязанскаго пѣхотнаго полка

Ливинцовъ, Ординапоры Варнскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари: Аксеновъ, Снѣсаревъ, Голубевъ, Беръ, Михайловъ, Логиновъ и Кипкевичъ, Ординапоры Каварискаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Снарскій и Ковальскій, Ординапоры Бабадагскаго военновременнаго госпиталѣ Лекари: Куцевичъ, Ордынецъ, Дзиповецкій, Ординапоры Базарджискаго военновременнаго госпиталѣ Лекари Кандидовъ и Дебрскій, Ординапоръ Гирсовскаго военновременнаго госпиталѣ Лекаръ Гележинскій, Старшій Ветеринарный Лекаръ Нѣжинскаго Конно-Егерскаго полка Хохряковъ, Полковый Шпабъ - Лекаръ Луцкаго Гренадерскаго полка Надворный Совѣтникъ Любимовъ, Младшій Лекаръ Подольскаго пѣхотнаго полка Лекаръ Магурскій, Медико-Хирургъ 24-й Артиллерійской Бригады Спанкевичъ, Старшій Лекаръ Омскаго военного госпиталѣ Шпабъ - Лекаръ Коллежскій Ассесоръ Спавропольскій и Старшій Врачъ 1-го Кадетскаго Корпуса Коллежскій Ассесоръ Сольскій; а Дивизионному Доктору 7-й пѣхотной Дивизіи Спавскому Совѣтнику Лучинскому и Исправляющему должность Корпуснаго Шпабъ - Доктора 2-го пѣхотнаго Корпуса Спавскому Совѣтнику

Никольскому повелѣно производить сверхъ получаемого содержанія прибавочнаго жалованья по 1500 руб. въ годъ. За выслугу лѣтъ Всемилостивѣйше пожалованы пенсіоны: Ординапору С. Петербургскаго военносуднаго госпиталя Шпабъ-Лекарю Спашскому Совѣснику Гурбанцу по 750 руб., Ординапору Кіевскаго военнаго госпиталя Шпабъ-Лекарю Коллежскому Совѣснику Серафимовичу и сослѣдующему при Шоспенскомъ пороховомъ заводѣ Шпабъ-Лекарю Коллежскому Совѣснику Поскребышеву по 600 руб. каждому въ годъ, Полевому Генералъ-Шпабъ-Доктору 1-й арміи Дѣйствительному Спашскому Совѣснику Башалину и Шпабъ-Доктору 3-го пѣхотнаго Корпуса Дѣйствительному Спашскому Совѣснику Успенскому по 750 руб. въ годъ каждому.

#### 6. *У м е р ш і е.*

Числившіеся въ резервныхъ войскахъ 2-й арміи сверхъ комплекта Лекари: Лабушинъ, Чучеловъ, Соловьевъ и Ординапоръ Варискаго военновременнаго госпиталя Лекаръ Беръ.

7. *Ш т р а ф ы.*

Ветеринарный Лекарь Астраханскаго Кирасирскаго полка Вороновъ и Ординаторъ Впленскаго военнаго госпиталя Штабъ-Лекарь Добрецовъ за непрезвое поведеніе отпсавлены отъ службы.

---



